



**TÜRKİYE'DE YETİŞEN *Achillea* L. (ASTERACEAE)  
TÜRLERİNİN MOLEKÜLER FILOGENETİK ANALİZİ**

**Gizem UZAY**

**FARMASÖTİK BOTANİK  
ANABİLİM DALI**

**Tez Danışmanı  
Doç. Dr. Turan ARABACI  
Yüksek lisans Tezi – 2017**

T.C.  
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

**TÜRKİYE'DE YETİŞEN *Achillea* L. (ASTERACEAE)  
TÜRKLERİNİN MOLEKÜLER FILOGENETİK ANALİZİ**

**Gizem UZAY**

**Farmasötik Botanik Anabilim Dalı**  
**Yüksek Lisans Tezi**

**Tez Danışmanı**  
**Doç. Dr. Turan ARABACI**

Bu Araştırma TÜBİTAK Tarafından  
115Z022 Proje numarası ile desteklenmiştir.

**MALATYA**  
**2017**

## KABUL VE ONAY SAYFASI

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı çerçevesinde yürütülmüş olan; **Gizem UZAY'ın “Türkiye'de Yetişen Achillea L. (Asteraceae) Türlerinin Moleküler Filogenetik Analizi”** konulu bu çalışması, aşağıdaki jüri tarafından Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

Tez Savunma Tarihi: 24/05/2017

Doç. Dr. Turan ARABACI  
İnönü Üniversitesi  
Tez Danışmanı  
Jüri Başkanı

Prof. Dr. Şemsettin CİVELEK  
Fırat Üniversitesi  
Üye

Doç. Dr. Birol MUTLU  
İnönü Üniversitesi  
Üye

### ONAY

Bu tez, İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca yukarıdaki jüri üyeleri tarafından kabul edilmiş ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun ..../..../2017 tarih ve 2017/..... sayılı Kararıyla da uygun görülmüştür.

Prof. Dr. Yusuf TÜRKÖZ  
Enstitü Müdürü

## İÇİNDEKİLER

ÖZET .....	vi
ABSTRACT .....	vii
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ .....	viii
ŞEKİLLER DİZİNİ .....	ix
TABLOLAR DİZİNİ .....	x
1. GİRİŞ .....	1
2. GENEL BİLGİLER.....	3
2.1. Asteraceae Familyası ile İlgili Genel Bilgiler .....	3
2.1.1. Asteraceae Familyasının Betimi .....	3
2.1.2. Asteraceae Familyasının Ülkemizdeki Durumu .....	5
2.2. <i>Achillea</i> Cinsinin Betimi .....	5
2.3. <i>Achillea</i> Cinsinin Ülkemizdeki Durumu .....	5
2.4. <i>Achillea</i> Cinsinin Moleküler Filogenisi ile İlgili Yapılmış Çalışmalar .....	8
3. MATERYAL VE METOT .....	9
3.1. Literatür Taraması .....	9
3.2. Materyal .....	9
3.2.1. <i>Achillea</i> Cinsine Ait Bitki Materyallerinin Temini .....	9
3.2.2. Dış Gruplara Ait Bitki Materyalinin Temini .....	13
3.2.3. Cam ve Plastik Malzeme .....	13
3.2.4. DNA İzolasyonunda Kullanılan Kimyasallar .....	14
3.2.5. Polimeraz Zincir Reaksiyonlarında (PCR) Kullanılan Kimyasallar .....	15
3.2.6. Agaroz Jel Elektroforezinde Kullanılan Kimyasallar .....	16
3.3. Metot .....	16
3.3.1. Bitkilerden nrDNA İzolasyonu .....	16
3.3.2. PCR Uygulamaları .....	17
3.3.3. Agaroz Jel Elektroforezi .....	18
3.3.4. Dizileme ve Dizilerin Hizalanması .....	19
3.3.5. Filogenetik Analizlerin Yapılması.....	19
4. BULGULAR .....	20

4.1. Bitkilerden nrDNA İzolasyonu Sonucu Elde Edilen Bulgular .....	20
4.2. PCR Uygulamaları Sonucu Elde Edilen Bulgular .....	22
4.3. Filogenetik Analiz .....	28
5. TARTIŞMA .....	35
6. SONUÇ VE ÖNERİLER .....	42
KAYNAKLAR .....	44
EKLER .....	48
EK.1. ÖZGEÇMİŞ .....	48
EK.2. ITS nrDNA Dizisinin Veri Matrisi.....	49
EK.3. Etik Kurul Onayı Gerekmediğine Dair Yazı.....	58



## **TEŞEKKÜR**

Bu araştırmanın başlangıcından bitimine kadar her aşamasında çok değerli bilgi ve tecrübelerini benden esirgemeyen danışman hocam Sayın Doç. Dr. Turan ARABACI'ya,

Çalışma boyunca laboratuarlarını kullanıma açan Eczacılık Fakültesinin değerli Öğretim üyelerine,

Bitki moleküler çalışmaları ile ilgili değerli birikimlerini benimle paylaşan Sayın Dr. Serkan KÖSTEKİ'ye,

Çalışma esnasında herbaryumunun imkanlarından yararlanmamı sağlayan INU herbaryumu sorumlusu ile materyal örneği gönderen EGE ve ISTE herbaryumu sorumlularına,

Çalışmaya maddi yönden kaynak sağlayan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK-Proje No: 115Z022),

Ayrıca benden desteklerini esirgemeyen değerli AİLEM'e

Teşekkürlerimi sunarım.

## ÖZET

### Türkiye'de Yetişen *Achillea* L. (Asteraceae) Türlerinin Moleküler Filogenetik Analizi

**Amaç:** Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de yayılış gösteren *Achillea* L. cinsine ait taksonların çekirdek DNA'sının (nrDNA) ITS bölgelerinin filogenetik bakımdan analiz edilerek, taksonların akrabalık ilişkilerinin belirlenmesidir.

**Materyal ve Metot:** Bu çalışmada kullanılan bitki materyalinin büyük bir bölümü İnönü Üniversitesi Herbaryumunda (INU) mevcut herbaryum ve silika-jelde kurutulmuş örneklerden temin edilmiştir. Bununla beraber, yapılan arazi çalışmaları ile de bazı örnekler toplanmıştır. Bitkilerin nrDNA'ları izole edilmiş, ITS bölgeleri ITS5A ve ITS4 primerleri kullanılarak PCR ile çoğaltılmıştır. ITS bölgelerinin DNA dizileri belirlenmiştir. Elde edilen veriler ile analizler yapılmış ve türlerin filogenetik ilişkilerini gösteren ağaçlar elde edilmiştir.

**Bulgular:** Bu çalışmada, Türkiye'de yayılış gösteren *Achillea* cinsine ait 49 türü ait 61 örnek çalışılmıştır. Türlerin taksonomisi morfolojik ve moleküler filogenetik açıdan değerlendirilmiştir. *Achillea*'nın cins, seksiyon ve tür düzeyinde taksonomik durumu tartışılmıştır. Cins düzeyinde *A. maritima* (L.) Ehrend.& Y.P.Guo subsp. *maritima* türünün tekrar *Otanthus* cinsi altında *O. maritimus* (L.) Hoffmanns. & Link şeklinde yer alması gereği görülmüştür. Seksiyon düzeyinde ülkemiz *Achillea* türlerinin 4 seksiyon (*A. sect Achillea*, *A. sect. Babounya* (DC.) O. Hoffm., *A. sect. Anthemoideae* (DC.) Heimerl. ve *A. sect. Ptarmica* (Mill.) W. D. J. Koch) altında sınıflandırılması gereği saptanmıştır. Tür düzeyinde ise *A. sivasica* Çelik & Akpulat türünün, *A. gypsicola* Hub.-Mor. subsp. *sivasica* (Çelik & Akpulat) Arabacı & G.Uzay comb. et stat. nova olarak *A. gypsicola* Hub.-Mor. türünün bir alt türü olarak düzenlenmesi gereği belirlenmiştir.

**Sonuç:** Sonuç olarak, ülkemizde yayılış gösteren *Achillea* cinsinin 4 seksiyona ait 48 tür ve 54 takson olduğu saptanmıştır.

**Anahtar Kelimeler:** Compositae, ITS, nrDNA, revizyon, taksonomi.

## ABSTRACT

### Molecular Phylogenetic Analysis of *Achillea* L. (Asteraceae) Species Grown in Turkey

**Aim:** The aim of this study is determine the relationship of the *Achillea* L. taxa distributed in Turkey by phylogenetical analyzing of the ITS regions of the nuclear DNA (nrDNA)

**Material and Method:** The main plant materials used in this study were obtained from herbarium and silica-gel dried samples deposited in Herbarium of İnönü University (INU). In addition, some examples were collected from the field studies. The nrDNA of the plant specimens were isolated, and amplified ITS regions with ITS5A and ITS4 primers by using PCR. DNA sequences of ITS regions have been determined. The analyzes were made with the obtained data and trees showing phylogenetic relationships of the species were made.

**Results:** In this study, 61 samples belonging to 49 species of genus *Achillea* growing in Turkey were studied. The taxonomy of species are evaluated in terms of morphology and molecular phylogenetic. The taxonomy of *Achillea* at the genus, section and species level is discussed. In genus level, the species *A. maritima* is replaced under the genus *Otanthus* as *O. maritimus* (L.) Hoffmanns. & Link. The Turkish *Achillea* species should be classified under 4 sections (*A. sect Achillea*, *A. sect. Babounya* (DC.) O. Hoffm., *A. sect. Anthemoideae* (DC.) Heimerl. and *A. sect. Ptarmica* (Mill.) W. D. J. Koch) at the section level. In species level, the species *A. sivasica* Çelik & Akpulat should be given in subspecies level under *A. gypsicola* Hub.-Mor. as *A. gypsicola* Hub.-Mor. subsp. *sivasica* (Çelik & Akpulat) Arabacı & G.Uzay *comb. et stat. nova*.

**Conclusion:** As a result, the genus of *Achillea* is represented by 48 species (54 taxa) belonging to 4 sections in Turkey.

**Key Words:** Compositae, ITS, nrDNA, revision, taxonomy.

## **SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ**

BM: Birol Mutlu

BY: Bayram Yıldız

CTAB (Cetyltrimethylammonium bromide)

DNA: Deoksiribonükleik Asit

EGE: Ege Üniversitesi Herbaryumu

INU: İnönü Üniversitesi Herbaryumu

ISTE: İstanbul Üniversitesi Herbaryumu

ITS: Internal Transcribed Spacer

K: Timin veya Guanin

M: Sitozin veya Adenin

NCBI: National Center for Biotechnology Information

NJ: Neighbor Joining

nrDNA: Nuclear Ribosomal DNA

PAUP: Phylogenetic Analysis Using Parsimony

PCR : Polimeraz zincir reaksiyonu

R: Adenin veya Guanin

S: Guanin veya Sitozin

subsp.: Subspecies

TA: Turan Arabacı

UPGMA: Unweighted Pair Group Method Using Arithmetic Average

W: Adenin veya Timin

Y: Sitozin veya Timin

## ŞEKİLLER DİZİNİ

<u>Sekil No</u>	<u>Sayfa No</u>
-----------------	-----------------

- Şekil 4.1.** *Achillea* taksonlarının nrDNA izolasyonuna ait jel fotoğrafı (M: Marker).
- 1- *A. hamzaoglu* TA 2954, 2- *A. gypsicola* TA 2221, 3- *A. teretifolia* BY 8035,  
4- *A. sivasica* TA 1755, 5- *A. sivasica* TA 2208, 6- *A. aleppica zederbaueri*  
TA 2620, 7- *A. aleppica* subsp. *aleppica* TA 1388, 8- *A. millefolium* TA 1429,  
9- *A. cappadocica* TA 1567, 10- *A setaceae* TA 2133, 11- *A. gonocephala*  
TA 2957, 12- *A. coarctata* TA 2671.....20
- Şekil 4.2.** *Achillea* taksonlarının nrDNA izolasyonuna ait jel fotoğrafı (M: Marker).
- 1- *A. schischkinii* TA 2959a, 2- *A. lycaonica* TA 1377, 3- *A. membranacea*  
TA 1385, 4- *A. filipendulina* TA 1625, 5- *A. boissieri* TA 2594,  
6- *A. cucullata* TA 2083, 7- *A. siehenana* TA 1527,  
8- *A. nobilis* subsp. *kurdica* TA 1409, 9- *A. membranacea* TA 2951,  
10- *A. brachyphylla* BY 15136, 11- *A. nobilis* subsp. *neilreichii* TA 2129,  
12- *A. maritima* subsp. *maritima* EGE 396.....20
- Şekil 4.3.** *Achillea* taksonlarının nrDNA izolasyonuna ait jel fotoğrafı (M: Marker).
- 1- *A. santolinoides* subsp. *wilhelmsii* TA 2231, 2- *A. magnifica* TA 2958,  
3- *A. oligocephala* TA 1635, 4- *A. cretica* BY 15634, 5- *A. clypeolata* TA 1546,  
6- *A. tenuifolia* TA 1427, 7- *A. sivasica* TA 2964, 8- *A. ketenoglu* TA 2219,  
9- *A. milliana* TA 1600, 10- *A. pseudoallepica* TA 2244,  
11- *A. formosa* subsp. *amanica* TA 2253, 12- *A. armenorum* TA 1968.....21
- Şekil 4.4.** *Achillea* taksonlarının ve *Anacyclus clavatus* türünün nrDNA izolasyonuna  
ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *Achillea grandifolia* TA 2254, 2- *A. nobilis*  
subsp. *denissima* TA 2062, 3- *A. cretica* BY 15634, 4- *A. falcata* TA 2558,  
5- *A. oligocephala* TA 1635, 6- *A. spinulifolia* TA 2189, 7- *A. fraasii* TA 2525,  
8- *A. multifida* BM 5003, 9- *A. phrygia* TA 2962, 10- *A. nobilis*  
subsp. *sypilea* BY 15750, 11- *Anacyclus clavatus* EGE 24127,  
12- *Achillea vermicularis* TA 2559, 13- *A. sipikorensis* TA 2206,  
14- *A. kotschyii* subsp. *canescens* TA 2627.....21
- Şekil 4.5.** *Achillea* taksonlarının nrDNA izolasyonuna ait jel fotoğrafı (M: Marker).
- 1- *A. salicifolia* subsp. *salicifolia* TA 2092, 2- *A. monocephala* TA 1584,

3- *A. crithmifolia* TA 1552, 4- *A.sintenisii* TA 2080, 5- *A. biserrata* BY 16676,  
6- *A. formosa* subsp.*formosa* TA 2991, 7- *A. sivasica* TA 2208, 8- *A. arabica*  
TA 1440, 9- *A. latiloba* TA 1614, 10- *A. pannonica* TA 2131, 11- *A. maritima*  
TA 1947, 12- *A. gypsicola* TA 1560.....21

**Şekil 4.6.** *Achillea* taksonlarının ve *Anacyclus clavatus* türünün nrDNA izolasyonuna  
ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *Achillea formosa* subsp. *amanica* TA 2253,  
2- *A. cretica* BY 15634, 3- *A. multifida* BY 15889, 4- *Anacyclus clavatus*  
ISTE 73889.....22

**Şekil 4.7.** *Achillea* taksonlarının ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel  
fotoğrafi (M: Marker). 1- *A. aleppica* subsp. *aleppica* TA 1388,  
2- *A. aleppica zederbaueri* TA 2620, 3- *A. brachyphylla* BY 15136,  
4- *A. formosa* subsp.*formosa* TA 2991, 5- *A. hamzaoglu* TA 2954,  
6- *A. cappadocica* TA 1567, 7- *A setaceae* TA 2133, 8- *A. goniocephala*  
TA 2957 (K: Kontrol).....22

**Şekil 4.8.** *Achillea* taksonlarının ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel  
fotoğrafi (M: Marker). 1- *A. latiloba* TA 1614, 2- *A. siehenana* TA 1527,  
3- *A. membranacea* TA 2951, 4- *Anacyclus clavatus* EGE 24127, 5- *A. biserrata*  
BY 16676, 6- *A. maritima* subsp. *maritima* EGE 396, 7- *A. filipendulina* TA 1625,  
8- *A. oligocephala* TA 1635, 9- *A. schischkinii* TA 2959a, 10- *A. nobilis*  
subsp. *kurdica* TA 1409, 11- *A. maritima* TA 1947, 12- *A. grandifolia* TA 2254,  
13- *A. millefolium* TA 1429 (K: Kontrol).....23

**Şekil 4.9.** *Achillea* taksonlarının ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel  
fotoğrafi (M: Marker). 1- *A. latiloba* TA 1614, 2- *A. sivasica* TA 1755,  
3- *A. nobilis* subsp. *denissima* TA 2062, 4- *A. sivasica* TA 2208, 5- *A. gypsicola*  
TA 2221 (K: Kontrol).....23

**Şekil 4.10.** *Achillea* taksonlarının ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel  
fotoğrafi (M: Marker). 1- *A. nobilis* subsp. *kurdica* TA 1409, 2- *A. maritima*  
TA 1947, 3- *A. grandifolia* TA 2254, 4- *A. millefolium* TA 1429, 5- *A. aleppica*  
subsp. *aleppica* TA 1388, 6- *A. coarctata* TA 2671, 7- *A. teretifolia* BY 8035,  
8- *A.sintenisii* TA 2080, 9- *A. formosa* subsp. *amanica* TA 2253, 10- *A. cretica*  
BY 15634, 11- *A. brachyphylla* BY 15136, 12- *A. multifida* BM 5003,  
13- *A. siehenana* TA 1527 (K: Kontrol).....23

**Şekil 4.11.** *Achillea* taksonlarının ve *Anacyclus clavatus* türünün ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *Achillea siehenana* TA 1527, 2- *A. latiloba* TA 1614, 3- *A. siehenana* TA 1527, 4- *A. membranacea* TA 2951, 5- *Anacyclus clavatus* EGE 24127, 6- *A. biserrata* BY 16676, 7- *A. maritima* subsp. *maritima* EGE 396, 8- *A. santolinoides* subsp. *wilhelmsii* TA 2231, 9- *A. oligocephala* TA 1635, 10- *A. schischkinii* TA 2959a (K: Kontrol).....24

**Şekil 4.12.** *Achillea* taksonlarının ve *Anacyclus clavatus* türünün ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *Achillea sintenisii* TA 2080, 2- *A. biserrata* BY 16676, 3- *Anacyclus clavatus* EGE 24127, 4-5- *A. multifida* BM 5003, 6- *A. formosa* subsp. *amanica* TA 2253, 7- *A. aleppica zederbaueri* TA 2620, 8- *Anacyclus clavatus* EGE 24127 (K: Kontrol).....24

**Şekil 4.13.** *Achillea* taksonlarının ve *Anacyclus clavatus* türünün ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *Anacyclus clavatus* EGE 24127, 2- *Achillea cretica* BY 15634, 3- *A. multifida* BM 5003, 4- *Anacyclus clavatus* EGE 24127, 5- *Achillea formosa* subsp. *amanica* TA 2253, 6- *A. cretica* BY 15634 (K: Kontrol).....24

**Şekil 4.14.** *Achillea* taksonlarının ve *Anacyclus clavatus* türünün ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *Achillea grandifolia* TA 2254, 2- *A. nobilis* subsp. *denissima* TA 2062, 3- *A. cretica* BY 15634, 4- *A. falcata* TA 2558, 5- *A. oligocephala* TA 1635, 6- *A. spinulifolia* TA 2189, 7- *A. fraasii* TA 2525, 8- *A. multifida* BM 5003, 9- *A. phrygia* TA 2962, 10- *A. nobilis* subsp. *sypilea* BY 15750, 11- *Anacyclus clavatus* EGE 24127, 12- *Achillea vermicularis* TA 2559 (K: Kontrol).....25

**Şekil 4.15.** *Achillea* taksonlarının ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *A. sipikorensis* TA 2206, 2- *A. kotschyii* subsp. *canescens* TA 2627, 3- *A. salicifolia* subsp. *salicifolia* TA 2092, 4- *A. monocephala* TA 1584, 5- *A. crithmifolia* TA 1552, 6- *A. sintenisii* TA 2080, 7- *A. biserrata* BY 16676, 8- *A. formosa* subsp. *formosa* TA 2991, 9- *A. sivasica* TA 2208, 10- *A. arabica* TA 1440, 11- *A. latiloba* TA 1614, 12- *A. pannonica* TA 2131 (K: Kontrol Şekil 16'da verilmiştir).....25

**Şekil 4.16.** *Achillea* taksonlarının ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *A. pannonica* TA 2131, 2- *A. maritima* TA 1947, 3- *A. gypsicola* TA 1560, 4- *A. santolinoides* subsp. *wilhelmsii* TA 2231, 5- *A. magnifica* TA 2958, 6- *A. clypeolata* TA 1546, 7- *A. tenuifolia* TA 1427,

8- <i>A. sivasica</i> TA 2964, 9- <i>A. ketenoglui</i> TA 2219, 10- <i>A. milliana</i> TA 1600, 11- <i>A. pseudoallepica</i> TA 2244, 12- <i>A. formosa</i> subsp. <i>amanica</i> TA 2253 (K: kontrol).....	26
---	----

<b>Şekil 4.17.</b> <i>Achillea</i> taksonlarının ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- <i>A. armenorum</i> TA 1968, 2- <i>A. schischkinii</i> TA 2959a, 3- <i>A. lycaonica</i> TA 1377, 4- <i>A. membranacea</i> TA 1385, 5- <i>A. filipendulina</i> TA 1625, 6- <i>A. boissieri</i> TA 2594, 7- <i>A. cucullata</i> TA 2083, 8- <i>A. siehenana</i> TA 1527, 9- <i>A. nobilis</i> subsp. <i>kurdica</i> TA 1409, 10- <i>A. membranacea</i> TA 2951, 11- <i>A. brachyphylla</i> BY 15136, 12- <i>A. nobilis</i> subsp. <i>neilreichii</i> TA 2129 (K: Kontrol Şekil 16'da verilmiştir).....	26
---	----

<b>Şekil 4.18.</b> <i>Achillea</i> taksonlarının ve <i>Anacyclus clavatus</i> türünün ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1-3- <i>Achillea formosa</i> subsp. <i>amanica</i> TA 2253, 4-6- <i>A. cretica</i> BY 15634, 7-9- <i>A. multifida</i> BM 5003, 10-12- <i>Anacyclus clavatus</i> ISTE 73889 (K: Kontrol).....	26
---	----

<b>Şekil 4.19.</b> <i>Achillea</i> taksonlarının ve <i>Anacyclus clavatus</i> türünün ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1-2- <i>Achillea kotschyii</i> subsp. <i>kotschyii</i> TA 1734, 3-4- <i>A. formosa</i> subsp. <i>amanica</i> TA 2253, 5-6- <i>A. multifida</i> BM 5003, 7-8- <i>Anacyclus clavatus</i> ISTE 73889 (K: Kontro.....	27
--	----

<b>Şekil 4.20.</b> <i>Achillea</i> taksonlarının ve <i>Anacyclus clavatus</i> türünün ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- <i>Achillea multifida</i> BM 5003, 2- <i>Anacyclus clavatus</i> ISTE 73889, 3-4- <i>Achillea kotschyii</i> subsp. <i>kotschyii</i> TA 1734 (K: Kontrol).....	27
--	----

<b>Şekil 4.21.</b> <i>Achillea multifida</i> ve <i>Anacyclus clavatus</i> türünün ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- <i>Achillea multifida</i> BM 5003, 2- <i>Anacyclus clavatus</i> ISTE 73889 (K: Kontrol).....	27
---	----

<b>Şekil 4.22.</b> <i>Achillea</i> cinsinin ülkemizde yayılış gösteren 48 türü ve 7 adet dış grubun ITS bölgesinin Maksimum Parsimoni ile elde edilen Strict Konsensus ağacı (I: sect. <i>Othantus</i> , II: sect. <i>Babounya</i> , III: sect. <i>Ptarmica</i> , IV: <i>Anthemoideae</i> , V: sect. <i>Achillea</i> ).....	28
--	----

<b>Şekil 4.23.</b> <i>Achillea</i> cinsinin ülkemizde yayılış gösteren 48 türü ve 7 adet dış grubun ITS bölgelerinin Bootstrap analizi sonucu oluşan ağacı (I: sect. <i>Othantus</i> , II: sect. <i>Babounya</i> , III: sect. <i>Ptarmica</i> , IV: <i>Anthemoideae</i> , V: sect. <i>Achillea</i> ).....	29
---	----

<b>Şekil 4.24.</b> <i>Achillea</i> cinsinin ülkemizde yayılış gösteren 48 türü, 18 yurt dışı türü ve 7 adet dış grubun ITS bölgelerinin Bootstrap analizi sonucu oluşan ağacı (I: sect. <i>Othantus</i> , II: sect. <i>Babounya</i> , III: sect. <i>Ptarmica</i> , IV: <i>Anthemoideae</i> , V: sect. <i>Achillea</i> ).....	30
<b>Şekil 4.25.</b> <i>Achillea</i> cinsinin ülkemizde yayılış gösteren 48 türü ve 7 adet dış grubun ITS bölgelerinin UPGMA analizi sonucu oluşan ağacı (I: sect. <i>Othantus</i> , II: sect. <i>Babounya</i> , III: sect. <i>Ptarmica</i> , IV: <i>Anthemoideae</i> , V: sect. <i>Achillea</i> ).....	31
<b>Şekil 4.26.</b> <i>Achillea</i> cinsinin ülkemizde yayılış gösteren 48 türü, 18 yurt dışı türü ve 7 adet dış grubun ITS bölgelerinin UPGMA analizi sonucu oluşan ağacı (I: sect. <i>Othantus</i> , II: sect. <i>Babounya</i> , III: sect. <i>Ptarmica</i> , IV: <i>Anthemoideae</i> , V: sect. <i>Achillea</i> ).....	32
<b>Şekil 4.27.</b> <i>Achillea</i> cinsinin ülkemizde yayılış gösteren 48 türü ve 7 adet dış grubun ITS bölgelerinin NJ (Neighbor Joining) analizi sonucu oluşan ağacı (I: sect. <i>Othantus</i> , II: sect. <i>Babounya</i> , III: sect. <i>Ptarmica</i> , IV: <i>Anthemoideae</i> , V: sect. <i>Achillea</i> ).....	33
<b>Şekil 4.28.</b> <i>Achillea</i> cinsinin ülkemizde yayılış gösteren 48 türü, 18 yurt dışı türü ve 7 adet dış grubun ITS bölgelerinin NJ (Neighbor Joining) analizi sonucu oluşan ağacı (I: sect. <i>Othantus</i> , II: sect. <i>Babounya</i> , III: sect. <i>Ptarmica</i> , IV: <i>Anthemoideae</i> , V: sect. <i>Achillea</i> ).....	34
<b>Şekil 5.1.</b> <i>A. falcata</i> (A) ve <i>A. spinulifolia</i> (B)'nın çiçek durumları.....	38
<b>Şekil 5.2.</b> <i>A. membranacea</i> (A) ve <i>A. oligocephala</i> (B)'nın capitulumları.....	39
<b>Şekil 5.3.</b> <i>A. gypsicola</i> (A), <i>A. sivasica</i> (B) ve <i>A. phrygia</i> (C)'nın capitulumları.....	41

## TABLOLAR DİZİNİ

<u>Tablo No</u>	<u>Sayfa No</u>
<b>Tablo 2.1.</b> Türkiye Florası'nda yer alan seksiyonlar ve içerdikleri tür sayıları.....	7
<b>Tablo 2.2.</b> Ülkemizde yayılış gösteren 50 türün, moleküller veriler sonucu düzenlenen seksiyonlar düzeyindeki dağılımı.....	7
<b>Tablo 3.1.</b> Tez kapsamında çalışılan taksonlar, toplayıcı numaraları, herbaryum demirbaş numaraları ve lokaliteleri.....	9
<b>Tablo 3.2.</b> Fenol-Kloroform-İzoamilalkol yönteminde kullanılan kimyasallar.....	14
<b>Tablo 3.3.</b> Macherey Nagel Kitinde kullanılan solüsyonlar.....	14
<b>Tablo 3.4.</b> PCR'da ( Polimeraz Zincir Reaksiyonu) kullanılan kimyasallar.....	15
<b>Tablo 3.5.</b> 2X Master Mix ile kullanılan kimyasallar.....	15
<b>Tablo 3.6.</b> PCR' de kullanılan ITS Primerlerinin dizilimi.....	16
<b>Tablo 3.7.</b> ITS Primerleri için kullanılan PCR programı.....	18
<b>Tablo 5.1.</b> <i>Achillea</i> , <i>Otanthus</i> ve <i>Leucocyclus</i> cinsine ait türlerin seksiyon düzeyindeki dağılımları.....	36
<b>Tablo 6.1.</b> Türkiye'de yayılış gösteren <i>Achillea</i> seksiyonları ve içerdikleri türler.....	42

## 1. GİRİŞ

Ülkemiz, dünyasında 3 farklı floristik bölgenin hüküm sürdüğü ve o bölgelere ait iklimlerin gözlendiği bir yer olması nedeniyle, ılıman iklim kuşağında biyolojik çeşitlilik bakımından en zengin ülkelerden biridir (1). Son yapılan çalışmalara göre ülkemizdeki doğal tür sayısı 9753 olarak kaydedilmiştir (2). Son zamanlarda yayınlanan yeni türlerle bu sayı artmaya devam etmektedir.

Ülkemiz florası ile ilgili yazılmış olan en kapsamlı eser ilk cildi 1965'te basılan ve 1988'de tamamlanan ve eki ile birlikte 10 cilt olan "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" adlı eserdir. (3, 4). Ülkemizde floristik çalışmalar ve botanikçi sayısı yakın dönemde hızla artmıştır ve yoğun olarak yapılan bölgesel floristik çalışmalarla bol miktarda materyal toplanmış ve yeni taksonlar tanımlanmıştır. Türkiye Florası ile ilgili çalışmaların artması sonucu 2000 yılında Türk botanikçiler tarafından ikinci ek cilt (11. cilt) yayınlanmıştır (5). Geçen 15 yılı aşkın bir süre içerisinde pek çok yeni ya da sinonim taksonların yayınlanması ile Türkiye Florası'nın tam listesini oluşturmaya yönelik "Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)" hazırlanmıştır (2). Ülkemiz Florasını bir bütün halinde ortaya koyabilmek için Resimli Türkiye Florası adlı eserin yazılmasına başlanılmış ve ilk cildi Güner ve Ekim editörlüğünde yazılmıştır (1). Resimli Türkiye Florası'nın hazırlanması sürecinde ülkemizde yayılış gösteren çok sayıda cinsin revizyonunun tamamlanıp bu eserde yer alması amaçlanmaktadır. Cinslerin yeniden gözden geçirilmesi sırasında sadece morfolojik açıdan değil, karyolojik, kimyasal, palinolojik ve moleküller filogenetik bakımından da incelenerek cinsin bir bütün halinde ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla çok sayıda botanikçi ülkemiz cinslerinin revizyonunu tamamlamak için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda ülkemizin floristik biyoçeşitliliği bir bütün halinde ortaya konulması planlanmaktadır.

*Achillea* türleri eczacılıkta iştah açıcı, yaralar üzerinde iyileştirici, diüretik, karın ağrısı ve menstrasyon düzenleyici olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kozmetik ve parfümeri sanayinde de kullanım alanlarına sahiptir. Yaygın olarak "civanperçemi" ismi ile bilinmesine karşın, değişik yörelerde "akbaşlı", "barsamotu", "binbiryaprakotu", "marsamaotu", "kandilçiçeği" ve "baytaran" isimleri ile de bilinirler. *A. millefolium* L. dünya'nın birçok yerinde kültürü yapılan ve bitkisel çay olarak oldukça yaygın kullanılan bir türdür. Çay olarak

içilmesinin yanı sıra merhem, bitki tendürü ya da oturma banyoları şeklinde de kullanılmaktadır. *Achillea*, ekonomik öneme sahip bir cinstir. Bazı türlerinin ticareti yapılmakta, bazıları ise halk arasında kullanılmaktadır (6-9).

Bu tez, ülkemizde yayılış gösteren *Achillea* L. türlerinin kapsamlı revizyonuna önemli bir katkı yapacaktır. Çalışma konusunu oluşturan türlerin mevcut morfolojik özelliklerine moleküler düzeyde yapılacak bu katkı ile türlerin akrabalık derecelerinin belirlenmesinde bir bütünlük sağlanacaktır. *Achillea* ve ona yakın olan cinslerin (*Leucocyclus* ve *Otanthus*) taksonomik durumu aydınlatılmaya çalışılacaktır. Bu tez kapsamında yapılacak moleküler çalışmalar ve mevcut Morfolojik, Palinolojik, Karyolojik ve Kimyasal çalışmalarla birlikte Türkiye'nin *Achillea* türlerinin kapsamlı Revizyonuna önemli bir katkı sağlanacaktır.

Bu tez ile ulaşılması planlanan hedefler şunlardır;

1. *Achillea* cinsinin geleneksel sınıflandırması ile nrDNA'sının ITS bölgelerinin moleküler filogenisini karşılaştırmak,
3. *Leucocyclus* ve *Otanthus* cinslerinin *Achillea* cinsine aktarılıp aktarılmaması durumunu aydınlatmak,
2. Seksyonlara ait türlerin dağılımlarını belirlemek ve seksyonların mevcut problemlerini çözmek,
4. Yapılacak bu çalışma ile morfolojik verileri karşılaştırmak ve taksonların statülerinin netleşmesine katkıda bulunmak, morfolojik olarak benzerlik gösteren türlerin taksonomik durumlarını açığa çıkarmak,
5. Edilen bilimsel sonuçları değerlendirerek uluslararası saygın dergilerde nitelikli yayınlar yapmak temel hedeflerimizdir.

## 2. GENEL BİLGİLER

### 2.1. Asteraceae Familyası ile İlgili Genel Bilgiler

Asteraceae familyası tek yıllık ya da çok yıllık, otsu, çalımsı ya da odunsu 1911 cins ve 32913 tür ile tohumlu bitkilerin yeryüzündeki en büyük familyasıdır. Familya kozmopolit bir yayılışa sahiptir. Yeryüzünde Antartika hariç hemen hemen her bölgede familyayı temsil eden üyelerine rastlamak mümkündür. Filogenetik olarak Güney Amerika'dan kökenlendiğine dair çalışmalar mevcuttur (10-11).

#### 2.1.1. Asteraceae Familyasının Betimi

Tek yıllık otsu, iki yıllık (monokarpik ya da çok yıllık ve polikarpik ya da bazen monokarpik) ya da çok yıllık, yarı çalımsı, çalımsı ya da nadiren ağaç, ince gövdeli ya da bazen kalın gövdeli, sıklıkla özellikle otsu ya da yarı çalımsı olduğu zaman yumru köklü ya da rizomlu ya da odunsu yumrulu rizomlu, bazen tırmanıcı, genellikle karasal, nadiren epifitik ya da sucul, bazen sukkulent, genellikle bir veya çok çeşitli tipte salgılı ve salgısız tüylü, çoğunlukla salgılı olanlar iki sıralı ve salgısız olanlar tek sıralı; dokularda şizogen salgı kanallı (reçine kanallı) ve/veya eklemli latisiferler bulunur; nodlar (1-)3-'ten çok laklınlüye kadar. **Yapraklar** alternat veya karşılıklı, nadiren dairesel, genellikle basit ama sıklıkla loblu veya parçalanmış, stipülsüz; stomalar anizositik veya anomositik. Birleşik çiçek durumundan oluşan capitulum (baş), çok az istisna dışında bir veya daha çok sıralı koruyucu brakteler topluluğundan (fillarilerden) oluşan involukrum tarafından çevrelenmiş, capitulum bazen az çok yapraksız gövdelerin (skapus) ucunda tek fakat genellikle değişik tiplerdeki korimbus şeklinde simöz birleşik bir çiçek durumunda birkaç tane veya daha fazla sayıda, bazen ikinci hatta üçüncü derecede involukrat capitulum şeklinde birleşik başlar halinde kümelenmişlerdir. Çiçek tabası çiçekçiklerin tümünü ya da bazlarını çevreleyen, kalıcı ya da düşüçü damarlı pullu paleali, çiçeklerin tabanını çevreleyen damarsız saçaklardan oluşan saçaksi ya da pula benzer yapıdan oluşmuş, çiçeklerin bağlılığı noktası setalı, tüylü ya da çıplak ve sonradan düz, çok köşeli alancıklı ya da bal peteği gibi çukurcuklu. **Çiçekler** (çiçekçikler) küçük, her capitulumda 1-500 adet ya da daha çok, sapsız veya kısmen sapsız; ovarium alt durumlu, 2 (nadiren 3) birleşik karpelli, tek gözlü 1 adet dik bazal ovüllü; ovül anatrop, tenuinucellate, tek integumentli; kaliks bir ya da daha fazla sıralı, (1-)2'den çok sayıya kadar kılçıklı, pulsu, setamsı ya da tüysüpapustan oluşur, homomorfik veya heteromorfik ya da az çok taç şeklinde veya kulakçıklı yapıda ya da tamamen yok, asla yeşil ve otsu değil; korolla (3-)5(-6) birleşik

petalli, az çok düzenli (aktinomorf) ve eşit ya da eşit olmayan (3-)5(-6) loblu ya da dişli, loblar ya da dişler birbirine değer durumda veya indirgenmiş loblarda oluşan ipliksi ya da yok ya da küçük kollu ya da çeşitli şekillerde zigomorf, içte iki loblu dudaklı ve dışta 3 loblu dudaklı bilabiat, içte lobsuz dudaklı ve dışta 4 loblu dudaklı yalancı bilabiat, üç kısımda 5 dişli dilsiz ligulat, ya da dışta 0-3(-4) kollu radiate, çiçekçikler ya hepsi birbirine benzer (homomorfik, izomorfik, homogam capitulum) ve hepsi düzenli (diskoid capitulum), hepsi ligulat (ligulat capitulum), ya da hepsi bilabiat, ya da birden fazla tipte (heteromorfik, anizomorfik, heterogam capitulum), içerisinde düzenli (disk çiçekçikler ya da nadiren bilabiat) ve tam (iki eşeyli, hermafrodit) ya da fonksiyonel olarak staminat (erkek) ve dışında (dilsiz çiçek) radiat, sıklıkla pistillat (dişi) ya da bazen steril (nötr), bir ya da çok sıralı (radiat capitulum), ya da dıştakiler ipliksi pistilli, genellikle çok sayıda sıralı ve içtekiler düzenli, tam ya da fonksiyonel staminat (diskiform capitulum), nadiren pistillatçıçekçiklerde korolla yok, zaman zaman tüm çiçekçikler pistillat ya da staminat ve bitkiler dioik ya da monoik, nadiren çiçekçikler başka değişik şekillerde düzenlenmiştir. Stamenlerfilamentlerle birlikte korolla tüpünün içinde, sayıca korolla loblarına eşit; korolla loblarına bağlı; filamentler genellikle serbest, nadiren birleşik, filamentin üst kısmı genellikle kalınlaşmış çeperli hücreli, parçalı silindirik ya da parmaklık şeklinde anter halkasından oluşmuş; anterler stilusu çevreleyen tüp şeklinde, çok nadiren serbest, iki tekâlî, 4 sporangiyumlu ya da nadiren iki sporangiyumlu, iç yüzeyden açılır, boyuna yarıklarla açılır, genellikle ucu apendageli, tabanda yuvarlak, sagitat ya da kuyruklu; polenler çoğunlukla trikolporat, genellikle ekinat (dikenli), bazen ekinolobat, ya da lobat (kabarık çizgili şekilli) ya da spinülat (mikroekinat, dikencikli), sıklıkla kaveat; nektaryum stilusu tabanda saran bir kalınlaşmış pul ya da çanak şeklinde; stilus tek, anter tüpü boyunca uzamış, uç kısmı iç yüzeyinde stigma bölgesini bulunduran 2 (veya nadiren 3) kısıdan uzuna kadar kollara bölünmüş (stilus kolları), stilus kollarının ucu akuttan yuvarlağa kadar, trunkat ya da çeşitli şekillerde apendageli; stigma kuru, papillalı. **Meyve** tek lokuluslu, 1 tohumlu, açılmaz, genellikle sipsela, çok nadir drupa, tepesinde taç şeklinde kalıcı bir papuslu ya da papuslar düşücü veya yok; absisyon izi bir karpopodyum tarafından çevrelenmiştir, yüzeyi ile hücre yapısı ve tekstürü farklılık gösterir, 1'den çok sıralıya kadar hücrelerden oluşur, belirsizden çok belircine kadar, bazen görünüşte yoktur; embriyo dik; endosperm çok az miktarda ve embriyonun etrafında ince bir tabaka şeklindedir (11).

## **2.1.2. Asteraceae Familyasının Ülkemizdeki Durumu**

*Asteraceae*, ülkemizde yayılış gösteren familyalar arasında en büyüğüdür. Türkiye Florası'nda 133 cins ve 1195 tür ile temsil edilmektedir. Familyanın en büyük cinsleri arasında *Centaurea* L. (180 tür), *Hieracium* L. (103 tür) ve *Cirsium* Mill. (57 tür) gelmektedir. Aynı zamanda, 446 endemik tür ile en çok endemik türü sahip familyadır (3-5). "Türkiye Bitkileri Listesi" adlı eserde familyanın 1365 türü sahip olduğu belirtilmiştir (2).

## **2.2. *Achillea* Cinsinin Betimi**

Çok yıllık otsu ya da yarı çalımsı bitki, kalın ya da ince odunsu rizomlu, rizomlar bazen sürüngücü. Gövde dik ya da yükseliçi, silindirik ya da köşeli, düz, boyuna çizgili ya da derin oluklu. Yapraklar tamdan 3-4 pinnatipartite kadar, alternat. Kapitula heterogam, radiate, saplı ya da sapsızca, küçük ya da orta büyülükte, genellikle üç kısımda korimbus şeklinde düzenlenmiş, çok nadiren tek, bazen basit şemsisiye. İnvolutum oblong-silindirik, ovoid, yarı küremsi ya da genişçe yarı küremsi. Fillariler 3-4 sıralı, dıştakiler içtekilere göre daha küçük, dar ya da genişçe şeffaf kenarlı. Çiçekler beyaz ya da sarı, bazen pembe; dilsiz çiçekler dişi, tek bir daire halinde, laminanın üç kısmı ± loblu; tüpsü çiçekler hermafrodit, düzenli 5-dişli, korolla tüpü ± basık, tabanı akenin tepesini saran bir torba şeklinde. Receptakulum ± düz ya da konveks, palealı, palea lanseolat ya da oblong, zarsi, paleanın ucuna kadar uzamayan orta damarlı. Aken oblong, oblanseolat ya da oblong-obovat, tüysüz, lineolat, lineat ya da sukrobikulat, sırttan basık, kanatsız, ucu nispeten daha geniş, bazen kalın dudak şeklinde kanatlı, kahverengimsi-beyaz. Papus bulunmaz (8).

## **2.3. *Achillea* Cinsinin Ülkemizdeki Durumu**

*Achillea* cinsinin dünyada yaklaşık 110-140 türü bulunmaktadır (12). Ülkemizde, Türkiye Florası adlı eserde ve ekinde toplam 42 türü (47 takson) yer almaktadır (13, 14). Son yapılan çalışmalarla 6 tür (*A. sivasica* Çelik & Akpulat, *A. hamzaoglu* Arabacı & Budak, *A. adenii* Aytaç & M.Ekici ve *A. baltae* H.Duman & Aytaç, *A. pannonica* Scheele, *Achillea salicifolia* Besser subsp. *salicifolia*) daha ülkemiz florasına eklenmiştir. *Achillea* ve yakın cinslerle ile ilgili yapılan moleküler çalışmalar sonucu *Leucocyclus* Boiss. (1 tür, 2 takson) ve *Otanthus* Hoffm. & Link (1 tür) cinsleri de *Achillea* cinsine dahil edilmiştir. Sonuç olarak *Achillea* cinsi ülkemizde 50 tür (56 takson) ile temsil edilmektedir (12, 15-20).

Türkiye Flora'sında *Achillea* cinsi 6 seksiyon altında incelenmiştir. Bu seksiyonlar ve betimleri şöyledir (13):

I. Seksiyon: *Ptarmica* (DC.) W.Koch.

Ligulalar beyaz, (5-)6-25, yapraklar bölünmemiş ya da segmentler ne enine nede kiremit dizilişli.

II. Seksiyon: *Arthrolepis* Boiss.

Ligulalar 8-15, sarı ya da beyaz, 4-12 mm, fillariler tabanda eklemli, sonradan düşücü, yapraklar lineer, pinnatisekt, küçük, enine kiremit dizilişli segmentli.

III. Seksiyon: *Babounya* Boiss.

Kapitula diskoid yada 4-9 sarı ligulalı, yapraklar parçalanmamış, lineer-oblon'dan ovata kadar, tarağa benzer şekilde parçalı testere dişli, dişler nasırlı.

IV. Seksiyon: *Santolinoidae* DC.

Yapraklar çoğunlukla lineer, pinnatisekt, küçük, enine, kiremit dizilişli ya da aralıklı dizilişli, fillariler kalıcı, tabanda eklemli değil.

V. Seksiyon: *Millefolium* (DC.) W.Koch.

Ligulalar 4-6, fildiği-beyaz ya da üst kısımlarında soluk sarı (kısmen *A. nobilis* ve *A. crithmifolia*), yaprak segmentleri ne enine ne de kiremit dizilişli.

VI. Seksiyon: *Filipendulinae* (DC.) Boiss.

Ligulalar (2-)4-6, her iki yüzünde de sarı, yaprak segmentleri ne enine ne de kiremit dizilişli.

Türkiye Florası'nda yer alan seksiyonlar ve içerdikleri tür sayıları Tablo 2.1'de verilmiştir (13, 14).

Tablo 2.1. Türkiye Florası'nda yer alan seksiyonlar ve içerdikleri tür sayıları.

Seksiyon	Tür sayısı
sect. <i>Ptarmica</i> (DC.) W.Koch.	3
sect. <i>Arthrolepis</i> Boiss.	4
sect. <i>Babounya</i> Boiss.	1
sect. <i>Santolinoidea</i> DC.	24
sect. <i>Millefolium</i> (DC.) W.Koch.	7
sect. <i>Filipendulinae</i> (DC.) Boiss.	5
Toplam	42

Son çalışmalarla birlikte ülkemizde yayılış gösteren 50 türün, moleküler veriler sonucu düzenlenen seksiyonlar düzeyindeki dağılımı Tablo 2.2'de verilmiştir (12, 15-20).

Tablo 2.2. Ülkemizde yayılış gösteren 50 türün, moleküler veriler sonucu düzenlenen seksiyonlar düzeyindeki dağılımı.

Seksiyon	Tür sayısı
<b>sect. <i>Ptarmica</i> (DC.) W.Koch.</b> ( <i>A. salicifolia</i> buraya dahil edilmiştir)	2
<b>sect. <i>Anthemoideae</i> (DC.) Heimerl</b> ( <i>A. fraasii</i> ve <i>A. multifida</i> buraya dahil edilmiştir)	2
<b>sect. <i>Babounya</i> Boiss.</b> (sect. <i>Arthrolepis</i> , sect. <i>Santolinoidea</i> ile <i>A. adenii</i> , <i>A. baltae</i> , <i>A. hamzaoglu</i> , <i>A. sivasica</i> , ve <i>Leucocyclus formosus</i> buraya dahil edilmiştir)	32
<b>sect. <i>Achillea</i></b> (sect. <i>Millefolium</i> (DC.) W.Koch., sect. <i>Filipendulinae</i> (DC.) Boiss. buraya dahil edilmiş, <i>A. millefolium</i> subsp. <i>pannonica</i> tür düzeyine yükseltilmiştir)	13
<b>sect. <i>Otanthus</i>(Hoffmanns. &amp; Link) Ehrend. &amp; Y.-P.Guo</b> (yeni tanımlanan seksiyon, <i>Otanthus maritimus</i> buraya dahil edilmiştir)	1
Toplam	50

Türkiye'nin *Achillea* türlerinin morfolojik revizyonu Arabacı tarafından 2006 yılında doktora tezi olarak yapılmıştır (8). Cinsin palinolojik özellikleri Tübitak projesi olarak çalışılmış ve konu ile ilgili yayınlanmış çalışmalar bulunmaktadır (21-23). Bunlara ilaveten 26 taksonun kromozom özellikleri belirlenmiştir (24-28). Cinsin kimyasal özelliklerine ait çok sayıda çalışma da bulunmaktadır (29-33).

#### **2.4.*Achillea* Cinsinin Moleküler Filogenisi ile İlgili Yapılmış Çalışmalar**

Cinsin dünyada yayılış gösteren türleri üzerinde son zamanlarda yapılan moleküler çalışmalar sonucunda *Achillea* cinsinin taksonomisi ile ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. *Leucocyclus* ve *Otanthus* cinsleri *Achillea*'ya dahil edilmiş, ayrıca seksiyon düzeyinde önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir (12, 16, 34-35).

Ehrendorfer ve Guo (2006), *Achillea* altında yeni bir seksiyon düzenlenmiş (sect. *Otanthus* (Hoffmanns. ve Link) Ehrend. ve Y.-P.Guo) ve *Otanthus* cinsinin tek türü *Achillea maritima* (L.) Ehrend. ve Y.-P.Guo olarak burada yer almıştır (12). Yine bu çalışma da *Achillea*'nın *Arthrolepis* Boiss. ve *Santolinoideae* DC. seksiyonları *Babounya* (DC.) O.Hoffm seksiyonu altında birleştirilmiş ve *Leucocyclus* cinsi *Babounya* seksiyonunun altında *Achillea formosa* (Boiss.) Sch.Bip. olarak yer almıştır. Ülkemizde yayılış gösteren *A. fraasii* Sch.Bip. ve *A. multifida* (DC.) Griseb. türleri *A. sect. Anthemoideae* altında verilmiştir. Ayrıca *Achillea*'nın *Filipendulinae* (DC.) Boiss. ve *Millefolium* (DC.) W.Koch. seksiyonları da *Achillea* sect. *Achillea* altında birleştirilmiştir. Bu çalışmalarda kullanılan türlerden 20'si ülkemizde de yayılış göstermektedir (12).

Türkiye'de yayılış gösteren bazı *Achillea* taksonlarının moleküler karakterizasyonu adlı çalışmada 19 tür moleküler olarak çalışılmıştır (36). Diğer Türkiye türleri üzerinde kapsamlı bir moleküler araştırma bulunmamaktadır.

*Achillea* cinsinin (*Leucocyclus* ve *Otanthus* dahil) Türkiye'de toplam 50 türü (56 takson) vardır. Bu türlerden 26'sı endemiktir. *Santolinoidea* DC. seksiyonunun gen merkezi Anadolu'dur (12, 15-20). Türlerin moleküler analizi cinsin filogenetik sınıflandırması hakkında önemli bir veri oluşturacaktır. Bu türlerin moleküler filogenisinin bu tez kapsamında yapılması planlanmıştır.

### **3. MATERİYAL VE METOT**

#### **3.1. Literatür Taraması**

Tezin başlangıç aşamasında konu ile ilgili literatürler basılı ve elektronik veri tabanlarından taramıştır. Tez süresince en son güncel literatürler elde edilmiş ve tezin gerçekleştirileşirmesinde bu kaynaklardan faydalانılmıştır. Kaynaklar ilgili kısımlarda verilmiştir.

#### **3.2. Materyal**

##### **3.2.1. *Achillea* Cinsine Ait Bitki Materyallerinin Temini**

Çalışmalarda kullanılan bitki materyalinin büyük bir bölümü İnönü Üniversitesi Herbaryumunda (INU) mevcut herbaryum ve silika-jelde kurutulmuş örneklerden temin edilmiştir. Bazı örneklerden taze materyal elde edebilmek için arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Şanlıurfa, Sivas, Kahramanmaraş ve Kırşehir illerine tez kapsamında, Antalya iline ise başka bir çalışma kapsamında arazi çalışması yapılmış ve bitkilere ait herbaryum ve silika-jelde kurutulmuş örnekler toplanmıştır. Dış grup olarak çalışılan *Anacyclus clavatus* türüne ait örnekler ise EGE ve ISTE herbaryumlarından, herbaryum materyallerine ait örneklerden temin edilmiştir. Tez kapsamında çalışılan taksonlar, bu taksonların toplayıcı numaraları, herbaryum demirbaş numaraları ve lokaliteleri Tablo 3.1'de verilmiştir.

Tablo 3.1.Tez kapsamında çalışılan taksonlar, toplayıcı numaraları, herbaryum demirbaş numaraları ve lokaliteleri

No	Takson	Toplayıcı numarası	Demirbaş no	Lokalite
1	<i>Anacyclus clavatus</i> Pers.	-	ISTE 73889	Balıkesir: Ayvalık, Çiplak Ada, 20m, 27 iv 1997.
2	<i>Anacyclus clavatus</i> Pers.	-	EGE 24127	İzmir: Bornova, Ege Üniversitesi kampüsü, viii 1975.
3	<i>Achillea salicifolia</i> Besser subsp. <i>salicifolia</i>	TA 2092	INU 5926	Ardahan-Posof arası, 4. km, Sazara Gölü, su içi ve ıslak alanlar, 1903 m, 11 vii 2005.
4	<i>A. biserrata</i> M.Bieb.	BY 16676	INU 5855	Artvin: Borçka, Maçahel yolu, 29. km, orman açıklığı, 1700 m, 16 ix 2007.

5	<i>A. fraasii</i> Sch.Bip.	TD 2525	INU 10688	Balikesir: Edremit, Kaz Da., Sarıkız tepe, 1700 m, kalker, 26 vi 2002.
6	<i>A. multifida</i> (DC.) Griseb.	BM 5003	INU 9102	Bursa: Uludağ, Volfram Madeni karşısı, 2100 m, 24 vi 1999.
7	<i>A. formosa</i> (Boiss.) Sch.Bip. subsp. <i>formosa</i>	TA 2991	-	Antalya: Alanya-Hadim arası, Gökböl yaylası yol ayrılmından sonra 6. km, 1500 m, 22 viii 2015.
8	<i>A. formosa</i> (Boiss.) Sch.Bip. subsp. <i>amanica</i> (Rch.f.) Ehrener. & Y.P.Guo	TA 2253	INU 10135	Osmaniye: Yarpuz-Yağlıpınar arası 7. km, 1400 m, 03 vii 2007.
9	<i>A. membranacea</i> (Labill.) DC.	TA 1385	INU 10685	Şanlıurfa: Birecik, Kelaynak Üretim Çiftliği çevresi, kireçtaşı, 300 m, 06 vi 2002.
10	<i>A. membranacea</i> (Labill.) DC.	TA 2951		Şanlıurfa: Birecik, Kelaynak Üretim Çiftliği çevresi, kireçtaşı, 300 m, 27 v 2015.
11	<i>A. brachyphylla</i> Boiss.& Hausskn.	BY 15136	INU 10681	Şanlıurfa: Viranşehir-Şanlıurfa arası, 43. km, kalker kayalıklar, 600 m, 07 vi 2002.
12	<i>A. oligocephala</i> DC.	TA 1635	INU 10762	Ceylanpınar-Akçakale arası, 22. km, DTÜ Çiftliği, 300 m, 23 iv 2004.
13	<i>A. sipikorensis</i> Hausskn.& Bornm.	TA 2206	INU 5841	Sivas: Alacahan'ın 2 km güneyi, 1600 m, çayırlık alanlar, 04 vi 2007.
14	<i>A. maritima</i> (L.) Ehrend.& Y.P.Guo subsp. <i>maritima</i>	BM 1947	INU 4379	Muğla: Dalaman, kıyı kumulu, 29 iv 1998.
15	<i>A. maritima</i> (L.) Ehrend.& Y.P.Guo subsp. <i>maritima</i>		EGE 396	İzmir: Çeşme, İlîca plajı, kumullar, Regel.
16	<i>A. sieheana</i> Stapf	TA 1527	INU 10700	Konya: Cihanbeyli, Eslik çevresi, tuz stepi, 900 m, 16 vi 2003.
17	<i>A. santolinoides</i> Lag. subsp. <i>wilhelmsii</i> (K.Koch) Greuter	TA 2231	INU 5803	Kayseri: Kayseri-Pınarbaşı arası, 1500 m, 06 vi 2007.
18	<i>A. falcata</i> L.	TA 2558	INU 5825	Niğde: Bolkar Dağı, Arslanköy, 1850 m, 04 vii 2007.
19	<i>A. cucullata</i> Bornm.	TA 2083	INU 9937	Sivas: Ulaş, Akkaya köyünün 1 km batısı, Tecer yolu, tarla kenarları, 1300 m, 03 vii 2005
20	<i>A. vermicularis</i> Trin.	TA 2559	INU 10133	Bingöl: Karlıova yolu, Hacılar köyüne 1 km kala, 14 vii 2007.
21	<i>A. monocephala</i> Boiss.& Balansa	TA 1584	INU 10168	Adana: Pozanti, Eski Anahsa Kalesi batısındaki zirve, 1250 m, 04 vii 2003.
22	<i>A. boissieri</i> Hausskn.ex Boiss.	TA 2594	INU 9947	Kahramanmaraş: Elbistan, Kabaktepe-Sarıgüzel arası, 8. km, 1600 m, 08 viii 2007.
23	<i>A. schischkinii</i> Sosn.	TA 2959a	-	Malatya: Hekimhan-Hasançelebi arası, 1200 m, kalker kayalıklar, 17 vi 2015.
24	<i>A. lycaonica</i>	TA 1377a	INU 3252	Antalya: Korkuteli-Fethiye arası, 29. km,

	Boiss.&Heldr.			1300 m, 01 vi 2002.
25	<i>A. magnifica</i> Heimerl ex Hub.-Mor.	TA 2958	-	Malatya: Yazihan-Arguvan yol ayrımı, 790 m, tarla kenarları, 17.vi.2015.
26	<i>A. tenuifolia</i> Lam.	TA 1427	INU 9328	Kars: Digor-Tuzluca arası, 38. km, 1200 m, 09.vi.2002.
27	<i>A. phrygia</i> Boiss.&Balansa	TA 2962	-	Sivas: Kangal-Ulaş arası 3-5. km, 1550 m, 17.06.2015.
28	<i>A. sivasica</i> Çelik & Akpulat	TA 1755	INU3219	Sivas: Gürün-Kangal arası Kuşkayası yol ayrımı, marn, 1600 m, 09 vi 2004.
29	<i>A. sivasica</i> Çelik & Akpulat	TA 2208	INU 5840	Sivas: Gürün-Kangal arası Kuşkayası yol ayrımı, marn, 1600 m, 04 vi 2007.
30	<i>A. sivasica</i> Çelik & Akpulat	TA 2964	-	Sivas: Gürün-Kangal arası Kuşkayası yol ayrımı, marn, 1600 m, 17.06.2015.
31	<i>A. gypsicola</i> Hub.-Mor.	TA 1560	INU 3227	Çankırı: Çankırı-Kalecik arası, 3.km, jipsli alanlar, 850 m, 20 vi 2003.
32	<i>A. gypsicola</i> Hub.-Mor.	TA 2221	INU 5849	Yozgat: Keskin-Çerikli, 5. km, 1100 m, step, 05 vi 2007.
33	<i>A. aleppica</i> DC. subsp. <i>aleppica</i>	TA 1388	INU 5929	Şanlıurfa-Viranşehir arası, 49. km, Çobanboğazı geçiti, 600 m, kayalıklar 07 vi 2002.
34	<i>A. aleppica</i> DC.subsp. <i>zederbaueri</i> (Hayek) Hub.-Mor.	TA 2620	INU 9472	Niğde: Kayseri-Adana yolu, Avanos yol ayrımı, 950 m, 04 vi 2008.
35	<i>A. pseudoaleppica</i> Hausskn. ex Hub.-Mor.	TA 2244	INU 5865	Erzincan: Arapgir-Kemaliye arası, 30. km, 850 m, Fırat nehri kenarı, kayalıklar, 09 vi 2007.
36	<i>A. teretifolia</i> Willd.	BY 8035	INU 5865	Sivas: Zara, Deredam köyü çevresi, 1400 m, 07 vii 1986.
37	<i>A. cretica</i> L.	BY 15634	INU 10147	Muğla: Datça, Knidos, 0-520 m, 19 vi 2004.
38	<i>A. armenorum</i> Boiss.& Hausskn.	TA 1968	INU 10699	Kahramanmaraş: Göksun, Berit Dağı, Yedigardalar, kayalıklar, 2800-3000 m, 24 vii 2004.
39	<i>A. sintenisii</i> Hub.-Mor.	TA 2080	INU 10176	Sivas: Ulaş, Akkaya köyü çevresi, jipsli alanlar, 03 vii 2005.
40	<i>A. milliana</i> H.Duman	TA 1600	INU 10144	<b>C6</b> Osmaniye: Düziçi, Düldül Dağı, zirve, 2200 m, 28 vii 2003.
41	<i>A. ketenoglui</i> H.Duman	TA 2219	INU 5853	Kırıkkale: Delice, vericinin olduğu tepe, jipsli alanlar, 700-800 m, 05 vi 2007.
42	<i>A. hamzaoglu</i> Arabacı & Budak	TA 2954	-	Kırşehir: Kırşehir Mucur arası, Bahçecik yol ayrımdan sonra 4. km, kalkerli step, 09 vi 2015.
43	<i>A. goniocephala</i> Boiss.& Balansa	TA 2957	-	Kahramanmaraş: Göksun-Pınarbaşı arası, Keklikoluk yol ayrımı, step, 09 vi 2015.
44	<i>A. spinulifolia</i> Fenzl ex Boiss.	TA 2189	-	Niğde: Pozantı-Çiftehan arası, 19. km, 27 vi 2006.
45	<i>A. latiloba</i> Ledeb.	TA 1614	-	Trabzon: İkizdere-ispir arası, 30. km, Ovidik

				Da. , 2200 m, 01 viii2003
46	<i>A. grandifolia</i> Friv.	TA 2254	INU 5801	Osmaniye: Yarpuz-Yağlıpınar arası 7. km, 1400 m, 03 vii 2007.
47	<i>A .millefolium</i> L. subsp. <i>millefolium</i>	TA 1429	INU 5799	Iğdır: İğdır-Tuzluca arası, 10. km, 900 m, 13 vi 2002.
48	<i>A. pannonica</i> Scheele	TA 2131	-	Kırklareli: Kırklareli-Dereköy arası, 10. km, 200 m, 18 vii 2005.
49	<i>A. setacea</i> Waldst.&Kit.	TA 2133	-	Kırklareli: Kırklareli-Dereköy arası, 10. km, 200 m, 18 vii 2005.
50	<i>A. crithmifolia</i> Waldst.&Kit.	TA 1552	INU 9966	Edirne: Pınarhisar-Vize arası, Sergen yol ayrimından sonra 1. km, tarla kenarları, 270 m, 19 vi 2003.
51	<i>A. kotschyi</i> Boiss. subsp. <i>kotschyi</i>	TA 1734	INU 9349	Kahramanmaraş: Andırın, Çokak-Geben arası 2. km, 29 v 2004.
52	<i>A. kotschyi</i> Boiss. subsp. <i>canescens</i> Bassler	TA 2627	-	Isparta: Dedegöl Dağı, Pınargözü mevkii üzeri, 1650-1700 m, 05 vi 2008.
53	<i>A. nobilis</i> L. subsp. <i>neilreichii</i> (A.Kern) Velen.	TA 2129	INU 4312	Kırklareli: Kırklareli-Dereköy arası, 10. km, 200 m, 18 vii 2005.
54	<i>A. nobilis</i> L. subsp. <i>densissima</i> (O.Schwarz ex Bassler)	TA 2062	INU 5904	Denizli/Muğla:Çal Dağı, Fethiye-Çameli arası, 35. km, Kırkpınar mevkii, serpantin, 1600 m, 13 vii 2005.
55	<i>A. nobilis</i> L. subsp. <i>sipylea</i> (O.Schwarz) Bassler	BY 15750	INU 5906	Manisa: Sipil Dağı, Aatalanı mevki, <i>Pinus nigra</i> orman açıklıkları, 1200 m, 5 vii 2004.
56	<i>A. nobilis</i> L. subsp. <i>kurdica</i> Hub.-Mor.	TA 1409	INU 5925	Hakkari: Yüksekova Şemdinli arası, 31. km, step, 1700 m, 09 vi 2002.
57	<i>A. filipendulina</i> Lam.	TA 1625	INU 3245	Muş: Güloymak-Muş arası, 2. km, tarla kenarları, 1600 m, 02 viii 2003.
58	<i>A. clypeolata</i> Sibth.&Sm.	TA 1546	INU 3230	Kırklareli-Dereköy arası, 21.km, orman açıklıkları, 480 m, 19 vi 2003.
59	<i>A. coarctata</i> Poir.	TA 2671	INU 9677	Erzurum: İspir-İkizdere arası, 10 km, 1600 m, 27 vi 2008.
60	<i>A. arabica</i> Kotschy	TA 1440	INU 5800	Malatya: Malatya-Darende arası, 35. km, 950 m, 17 vi 2002.
61	<i>A. cappadocica</i> Hausskn.&Bornm.	TA 1567	INU 3211	Karaman: Gülnar-Ermenek arası, Bereketliköyü çevresi, 1100 m, 03 vii 2003.

Yaptığımız laboratuar çalışmalarında *Anacyclus clavatus* türünün nrDNA'sı başarılı bir şekilde izole edilmesine rağmen, bu DNA'nın ITS bölgesi PCR ile elde edilememiş, elde edilen ürünlerden de başarılı bir dizileme elde edilememiştir. Bununla birlikte yapılan

*Achillea* türlerinden *A. multifida* türü ile *A. kotschyii* subsp. *kotschyii* taksonundan da benzer şekilde net başarılı diziler elde edilememiştir. Bu üç taksondan *Anacyclus clavatus* ve *Achillea multifida* türüne ait diziler Gen Bankasından (NCBI) temin edilerek filogenetik analizlere dahil edilmiştir. *A. kotschyii* türünün ise diğer alt türü subsp. *canescens* taksonundan gen dizilimi başarılı bir şekilde elde edildiği için bu türü temsilen *canescens* alt türü kullanılmış ve sonuçların eksiksiz olarak elde edilmesi sağlanmıştır.

Filogenetik ağaçlar oluşturulken, ülkemizde yayılış göstermeyen 18 yurtdışı *Achillea* türü de analizlere dahil edilmiştir. Bu türlere ait gen dizileri Gen Bankasından (NCBI) temin edilmiştir. Bu türler: *Achillea impatiens* L., *A. pyrenaica* Sibth. ex Godr., *A. abrotanoides* (Vis.) Vis., *A. erbarotta* All., *A. moschata* Wulfen, *A. ligustica* All., *A. nana* L., *A. pindicola* Hausskn. subsp. *integrifolia* (Halász) R. Franzén, *A. schurii* Sch. Bip., *A. ceratanica* Sennen, *A. wilsoniana* (Heimerl) Heimerl ex Hand.-Mazz., *A. asiatica* Serg., *A. atrata* L., *A. oxyloba* (DC.) Sch. Bip., *A. clusiana* Tausch, *A. clavennae* L., *A. fragrantissima* (Forssk.) Sch. Bip. ve *A. pseudoaleppica* Hausskn. ex Hub.-Mor'dır.

### **3.2.2. Dış Grplara Ait Bitki Materyalinin Temini**

Filogenetik analizlerde dış grup olarak *Achillea* cinsine en yakın cinslere ait 7 farklı takson kullanılmıştır. Bu taksonlar *Chamaemelum nobile* All., *Santolina oblongifolia* Boiss., *Chrysanthemum lavandulifolium* Makino var. *lavandulifolium*, *Leucanthemum vulgare* Lam. *Anacyclus clavatus* Pers., *Anthemis arvensis* L. ve *Tanacetum millefolium* Aitch.'dur. Bu dış grupların dizileri Gen Bankasından (NCBI) alınmıştır. Ayrıca ülkemizde yayılışı olmayan 18 *Achillea* türüne ait diziler de gen bankasından alınarak ağaçlar oluşturulmuş ve sonuçları tartışılmıştır.

### **3.2.3. Cam ve Plastik Malzeme**

Tez çalışmalarında kullanılan pipet uçları, mikropipetler, ependorf tüpleri, PCR tüpleri, çözeltiler, cam malzemeler ve ısıya dayanıklı diğer malzemeler 121 °C de 20 dakika süreyle 1 atmosfer basınçta otoklavlanaraksterilize edilmiştir.

### **3.2.4. DNA İzolasyonunda Kullanılan Kimyasallar**

Tez çalışmalarında bitki materyallerinin bir kısmının çekirdek DNA'sı (nrDNA) Fenol- Kloroform-İzoamilalkol yöntemiyle izole edilmiştir (37). Bu yöntemde kullanılan kimyasallar Tablo 3.2'de verilmiştir.

Tablo3.2.Fenol-Kloroform-İzoamilalkol yönteminde kullanılan kimyasallar

Solüsyonlar	Kompozisyonu
Ekstraksiyon tamponu (1L)	33,6 gr. Üre, 0,5 M EDTA (pH: 8), 1 M. Tris-HCl (pH:8), 5 M NaCl%10 SDS
Fenol/Kloroform/İzoamil alkol	25 : 24 : 1
NaAc	3 M pH : 5,2
İzopropil alkol	%100
TE	10mM
RNaz A	10 mg/mL
EtOH	% 70, % 99

Bitki materyallerinin büyük çoğunluğunun nrDNA'sı Macherey Nagel Kiti (Ref:740770.50) ile izole edilmiştir. Bu kitte yer alan CTAB (Cetyltrimethylammonium bromide) metodu kullanılmıştır. Kitte yer alan solüsyonlar Tablo 3.3'de verilmiştir.

Tablo3.3.Macherey Nagel Kitinde kullanılan solüsyonlar

Solüsyonlar	Miktari (50 örnek için)
Lysis Buffer PL1	25 ml
Precipitation Buffer PL3	5 ml
Binding Buffer PC	30 ml
Wash Buffer PW1	30 ml
Wash Buffer PW2	25 ml
Elution BufferPE	15 ml
RNase A	6 mg
Nucleo Spin Filters (violettrings)	50 adet
Nucleo Spin Plant II Columns (greenrings)	50 adet
Collection Tubes (2ml)	100 adet

### **3.2.5. Polimeraz Zincir Reaksiyonlarında (PCR) Kullanılan Kimyasallar**

İzolasyon sonucu elde edilen nrDNA'nın PCR'da çoğaltıması için kullanılan kimyasallar Tablo 3.4'de verilmiştir. Ayrıca PCR kiti olarak 2X Master Mix (One Taq 2X Master Mix with Standart Buffer 100rxn/50 µl) kullanılmıştır. Bu kit ile yapılan çalışmalarda kullanılan kimyasallar ve miktarı Tablo 3.5'de verilmiştir.

Tablo 3.4. PCR'da ( Polimeraz Zincir Reaksiyonu) kullanılan kimyasallar

<b>Kimyasal Adı</b>	<b>Miktarı</b>	<b>Konsantrasyon</b>
Buffer	2.5 µl	10 X
MgCl <sub>2</sub>	1.5 µl	25 mM
DMSO	2.5 µl	-
ITS4	2.5 µl	1 pmol / ml
ITS5A	2.5 µl	1 pmol / ml
dNTP	0.4 µl	10 mM
Taq DNA Polimeraz	0.3 µl	5 ünite
nrDNA	2 µl	
dH <sub>2</sub> O	10.8 µl	
<b>Toplam</b>	<b>25 µl</b>	

Tablo 3.5. 2X Master Mix ile kullanılan kimyasallar

<b>Kimyasal Adı</b>	<b>Miktarı</b>	<b>Konsantrasyon</b>
Buffer	12.5 µl	1 X
ITS4	0.5 µl	1 pmol / ml
ITS5A	0.5 µl	1 pmol / ml
nrDNA	2 µl	
dH <sub>2</sub> O	9.5 µl	
<b>Toplam</b>	<b>25 µl</b>	

ITS bölgelerinin PCR amplifikasyonu için daha önce başarılı sonuçlar vermiş primerlerden ITS5A (Forward) ve ITS4 (Reverse) kullanılmıştır (38). Bu Primerlere ait diziler Tablo 3.6 da verilmiştir.

Tablo 3.6. PCR’ de kullanılan ITS Primerlerinin dizilimi

Kullanılan Primerler	Nükleotid dizisi	Erime sıcaklığı Tm (°C)	Uzunluk (bç)
ITS5A	5'- GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG -3'	62	22
ITS4	5' - TCCTCCGCTTATTGATATGC -3'	58	20

### 3.2.6. Agaroz Jel Elektroforezinde Kullanılan Kimyasallar

Agaroz jel hazırlanmasında 0.5X TBE, 1µl Etidium Bromür ve %0,8’lik Agaroz kullanılmıştır.

## 3.3. Metot

### 3.3.1. Bitkilerden nrDNA İzolasyonu

DNA izolasyonunda Fenol-Kloroform-İzoamilalkol protokolü veya Macherey Nagel Kit protokolü uygulanmıştır. Her iki protokolde de toz halindeki bitki materyalleri kullanılmıştır. Bunun için, slika jel içerisinde bulunan yada herbaryum materyaline ait bitkilerin yapraklarından 20-100 mg alınarak sıvı azotla havanda toz haline getirilmiştir.

**Fenol-Kloroform-İzoamilalkol Protokolü:** Bitki örnekleri havandan ependorf tüplere aktarılırak üzerine 600 µl izolasyon tamponu eklenip vorteks ile karıştırılmıştır. Tüpe 500 µL fenol kloroform-izoamil alkol eklenmiş, 5 dakika alt-üst edildikten sonra 5dk 12000 rpm’de santrifüjedilmiştir. Tüpeli süpernatant alınarak temiz bir tüpe aktarılmıştır. Süpernatant hacminin %10’u kadar (50 µl) 3M NaAc (pH: 5.2) eklenmiş ve alt-üst edilmiştir. Süpernatant hacmi kadar (500 µl civarında) izopropanol eklenmiş ve bu işlem sonucunda DNA çıplak gözle görülmüştür. DNA 2 dk 12000 rpm’de santrifüj yapılarak çöktürülmüş ve DNA peletinin oluşması sağlanmıştır. Üst kısımdaki çözelti mikro pipetle çekilerek atılmıştır. Oluşan pellete 500 µL TE (10mM, pH: 8) eklenmiş, pellete dokunmadan pipetaj yaparak pelletin çözülmesi sağlanmıştır. 5 µl RNaz A (10mg/ml) pipetaj yapılarak eklenmiş ve

RNazA'nın homojen dağılması için tüp alt-üst edilmiştir. 30 dk 37°C'de inkübasyon yapılarak RNA'nın uzaklaştırılması sağlanmıştır. 50  $\mu$ l NaAc (3M) eklenip alt üst edilmiştir. Daha sonra 1 ml %90'luk ETOH eklenip alt üst edilmiştir. -80°C'de 10 dk bekletildikten sonra 10 dk 13000 rpm'de santrifüj edilerek DNA'nın çökmesi sağlanmıştır. Üstteki süpernatant uzaklaştırılmış, altta kalan pellet %70'lik ETOH ile pipetaj yapılarak ykanmıştır. 2 dk 12000 rpm'desantrifüje dildikten sonra oluşan çökeltiden etanol dikkatlice uzaklaştırıldıktan ve 20-30 sn 12000 rpm'de tekrar santrifüj yapılmıştır. Ependorf tüpler kâğıt üzerine yan yatırılarak etanol kalıntılarının uçması sağlanmıştır. Oluşan nrDNA çökeltisi, 50  $\mu$ l TE veya 200  $\mu$ l saf su eklenerek pellet kayboluncaya kadar çözülmüş ve DNA kullanıma hazır hale getirilmiştir (37).

**Macherey Nagel Kit Protokolü:** Toz halindeki bitki materyali tüpe aktarılmış ve üzerine 400  $\mu$ l Buffer PL1 eklenip vorteksle karıştırılmıştır. Üzerine 10  $\mu$ l RNase A solüsyonu eklenmiş ve örnek iyice karıştırıldıktan sonra 65°C de 10 dakika boyunca inkübe edilmiştir. Karışım NükleoSpinfilter (mor halka) tüpe eklenmiş, 2dk 11,000xg de satrifüj edildikten sonra içindeki filtre atılmış ve dipte kalan kısma 450  $\mu$ l Buffer PC eklenerek 5 kez aşağı yukarı pipetlenip iyice karışması sağlanmıştır. Elde edilen karışımından 700  $\mu$ l alınıp NükleoSpinPlant II Column'a (yeşil halka) eklenmiştir. Nükleo SpinPlant II Column'u sırasıyla; 11,000xg de 1 dk santrüf edilmiş ve dip kısmı dökülmüş, üzerine 400  $\mu$ l Buffer PW1 eklenip 11,000xg de 1 dk santrüf edilmiş ve dip kısmı dökülmüş, üzerine 700  $\mu$ l Buffer PW2 eklenip 11,000xg de 1 dk santrüf edilmiş ve dip kısmı dökülmüştür. Washbuffer'ı uzaklaştırmak ve tamamen kuru bir silika membranı elde etmek için NükleoSpinPlant II Column'a 200  $\mu$ l Buffer PW2 eklenip. 11,000xg de 2 dk santrüf edilmiş ve dip kısmı dökülmüştür. NükleoSpinPlant II Column滤resi 1.5 ml'lik yeni bir effendorf mikrosantrifuj tüpüne alınmış ve fitrenin üzerine 50  $\mu$ l Buffer PE eklenerek 5 dk 65°C derecede inkübe edilmiştir. DNA'nın filtreden tamamen kurtulması için tüp 1 dk 11,000xg de santrifüj edilmiştir. Daha sonra fitrenin üzerine tekrar 50  $\mu$ l Buffer PE eklenerek 5 dk 65°C derecede inkübe edilmiş ve tüp 1 dk 11,000xg de santrifüj edilmiştir. Sonuçta 100  $\mu$ l nrDNA içeren solüsyon elde edilmiştir. Bu solüsyon bir sonraki çalışmaya kadar -20°C'de saklanmıştır.

### 3.3.2. PCR Uygulamaları

İzolasyon sonucu elde edilen nrDNA'nın PCR'da çoğaltıması için iki farklı yöntem takip edilmiştir. Birinci yöntemde Tablo 2.4'de verilen kimyasallar ve primerler, tabloda

verildiği miktar ve sıra ile 200 µl'lik PCR tüplerine eklenmiştir. İkinci yöntemde ise Tablo 2.5'de verilen kimyasallar ve primerler, tabloda verildiği miktar ve sıra ile 200 µl'lik PCR tüplerine eklenmiştir. Her iki yöntemde de çalışma ortamı olarak buz kullanılmıştır. Kontaminasyon olup olmadığını kontrol edebilmek için, her uygulamada nrDNA içermeyen negatif kontroller hazırlanmıştır. PCR sonucu çoğalma gözlenmeyen örnekler için tekrar yapılmıştır. Bu tekrarlar sırasında kullanılan nrDNA miktarı değiştirilmiş ve her defasında toplam solüsyon dH<sub>2</sub>O ile 25 µl'ye tamamlanmıştır. PCR sonucu elde edilen ürünler dizileme aşamasına kadar 4°C'de saklanmıştır (38). ITS Primerleri için kullanılan PCR programı Tablo 3.7'de verilmiştir.

Tablo3.7. ITS Primerleri için kullanılan PCR programı

<b>Basamak</b>	<b>Sıcaklık</b>	<b>Zaman</b>	<b>Döngü Sayısı</b>
Ön Denatürasyon	94°C	5dk	1 döngü
Denatürasyon	94°C	30sn	35 döngü
Bağlanma (Annealing)	51°C	45sn	
Uzama (Extension)	72°C	1dk	
Son Uzama	72°C	10dk	1 döngü
Bekleme	4°C	cihazdan alınana kadar	

### **3.3.3. Agaroz Jel Elektroforezi**

İzolasyon ve PCR sonucunda oluşan bantları gözlemlemek amacıyla %0,8'lik agaroz jel elektroforezi yapılmıştır. Bunun için 20X TBE stok çözeltisi seyreltilerek 0.5X TBE hazırlanmıştır. Daha sonra 0,8 gr agaroz 100 ml 0.5X TBE tamponu içinde, hotplate ile kaynatılarak çözülmüş, karışım 50°C'ye kadar soğutularak içerisinde 1µl Etidium Bromür boyası ilave edilmiştir. Elde edilen karışım, tarakları önceden yerleştirilmiş jel kasetine dökülmüş ve polimerleşmesi ve donması için 15 dk beklenmiştir. Jel polimerleşikten sonra kasetten taraklar çekilerek çıkartılmış, hazırlanan jel elektroforez tankına yerleştirilip üzerine jelin üzerini örtecek kadar 0.5X TBE tamponu ilave edilmiştir.

Her bir kuyucuğa 3 µl PCR ürünü ve 3 µl yükleme boyası (6X DNA loadingdye) olmak üzere toplam 6 µl karışım pipet yardımıyla yüklenmiştir. İlk kuyucuğa Marker, son kuyucuğa da kontrol ürünü konmuştur. Örnekler 120 voltta 30 dk yürütüldükten sonra jel görüntüleme cihazına konmuş ve bilgisayarda görüntüsü gözlemlenmiştir (39).

### **3.3.4. Dizileme ve Dizilerin Hizalanması**

PCR uygulamalarında uygun bant elde edilen ITS bölgelerinin DNA dizilemeleri hizmet alımı şeklinde Genoks firmasında Sanger yöntemi ile yapılmıştır. Her bir örneğe ait DNA dizisi hem ileri (forward) hem de geri (revers) primerleriyle çift yönlü olarak okutulmuştur.

Dizileme sonuçları Bioedit programında hizalanarak düzenlenmiş, DNA dizilerinin kirlilik düzeyine bakılarak istenilen saflık düzeyinde olan diziler işlenmiştir (40). İstenilen düzeyde elde edilemeyen diziler ise tekrar PCR'da çoğaltılarak dizileme işlemi tekrarlanmıştır. Öncelikle örnekler ait ileri ve geri diziler birleştirilerek kontigler oluşturulmuştur. Bu kontigler dizilere ait kromatogramlarla karşılaştırılmış, piklerin temizliğine bakılıp gerekli düzeltmeler elle yapılmıştır.

Dizilerin hizalanması için yine Bioedit programı kullanılmıştır. Bu programda yer alan ClustalW komutu ile hizalama işlemi gerçekleştirılmıştır.

Taksonlara ait bu diziler yayın aşamasında gen bankasına yüklenerek kodları alınacaktır.


### **3.3.5. Filogenetik Analizlerin Yapılması**

Bioedit programında hizalaması ve düzenlenmesi yapılan diziler nexus formatına getirildikten sonra PAUP 4.0a146 programı kullanılarak filogenetik analizler yürütülmüştür (40-41). Bu çalışma sonucu elde edilen dizilerden filogenetik ağaçlar oluşturulmuştur. Analizlerde karakter temelli yöntemlerden parsimony kriteri kullanılarak Maksimum Parsimony ve Bootstrap analizi, mesafe temelli yöntemlerden UPGMA ve NJ analizleri yapılmıştır.


## 4. BULGULAR

### 4.1. Bitkilerden nrDNA İzolasyonu Sonucu Elde Edilen Bulgular


nrDNA izolasyonunda Fenol- Kloroform-İzoamilalkol yöntemi ve Macherey Nagel Kiti kullanılmıştır. Kullanılan bu iki yöntemde en iyi DNA izolasyonu Macherey Nagel Kitinde yer alan CTAB (Cetyltrimethylammonium bromide) metodu ile gerçekleştirilmiştir. İzolasyon ürünü solüsyonlarda DNA'nın varlığını belirleyebilmek için Agaroz Jel Elektroforezi yapılmış ve elde edilen sonuçlar görüntülenmiştir. Çalışılan taksonlarının nrDNA izolasyonuna ait jel fotoğrafı Şekil 4.1-6'da verilmiştir.




Şekil 4.1. *Achillea* taksonlarının nrDNA izolasyonuna ait jel fotoğrafı(M: Marker).1- *A. hamzaoglu* TA 2954, 2- *A. gypsicola* TA 2221, 3- *A. teretifolia* BY 8035, 4- *A. sivasica* TA 1755, 5- *A. sivasica* TA 2208, 6- *A. aleppica zederbaueri* TA 2620, 7- *A. aleppica* subsp. *aleppica* TA 1388, 8- *A. millefolium* TA 1429, 9- *A. cappadocica* TA 1567, 10- *A. setaceae* TA 2133, 11- *A. gonocephala* TA 2957, 12- *A. coarctata* TA 2671.




Şekil 4.2. *Achillea* taksonlarının nrDNA izolasyonuna ait jel fotoğrafı (M: Marker).1- *A. schischkinii* TA 2959a, 2- *A. lycaonica* TA 1377, 3- *A. membranacea* TA 1385, 4- *A. filipendulina* TA 1625, 5- *A. boissieri* TA 2594, 6- *A. cucullata* TA 2083, 7- *A. siehenana* TA 1527, 8- *A. nobilis* subsp. *kurdica* TA 1409, 9- *A. membranacea* TA 2951, 10- *A. brachyphylla* BY 15136, 11- *A. nobilis* subsp. *neilreichii* TA 2129, 12- *A. maritima* subsp. *maritima* EGE 396.




Şekil 4.3. *Achillea* taksonlarının nrDNA izolasyonuna ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *A. santolinoides* subsp. *wilhelmsii* TA 2231, 2- *A. magnifica* TA 2958, 3- *A. oligocephala* TA 1635, 4- *A. cretica* BY 15634, 5- *A. clypeolata* TA 1546, 6- *A. tenuifolia* TA 1427, 7- *A. sivasica* TA 2964, 8- *A. ketenoglui* TA 2219, 9- *A. milliana* TA 1600, 10- *A. pseudoallepica* TA 2244, 11- *A. formosa* subsp. *amanica* TA 2253, 12- *A. armenorum* TA 1968.



Şekil 4.4. *Achillea* taksonlarının ve *Anacyclus clavatus* türünün nrDNA izolasyonuna ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *Achillea grandifolia* TA 2254, 2- *A. nobilis* subsp. *denissima* TA 2062, 3- *A. cretica* BY 15634, 4- *A. falcata* TA 2558, 5- *A. oligocephala* TA 1635, 6- *A. spinulifolia* TA 2189, 7- *A. fraasii* TA 2525, 8- *A. multifida* BM 5003, 9- *A. phrygia* TA 2962, 10- *A. nobilis* subsp. *sypilea* BY 15750, 11- *Anacyclus clavatus* EGE 24127, 12- *Achillea vermicularis* TA 2559, 13- *A. sipikorensis* TA 2206, 14- *A. kotschyii* subsp. *canescens* TA 2627.




Şekil 4.5. *Achillea* taksonlarının nrDNA izolasyonuna ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *A. salicifoliasubsp. salicifolia* TA 2092, 2- *A. monocephala* TA 1584, 3- *A. crithmifolia* TA 1552, 4- *A. sintenisii* TA 2080, 5- *A. biserrata* BY 16676, 6- *A. formosa* subsp. *formosa* TA 2991, 7- *A. sivasica* TA 2208, 8- *A. arabica* TA 1440, 9- *A. latiloba* TA 1614, 10- *A. pannonica* TA 2131, 11- *A. maritima* TA 1947, 12- *A. gypsicola* TA 1560.




Şekil 4.6. *Achillea* taksonlarının ve *Anacyclus clavatus* türünün nrDNA izolasyonuna ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *Achillea formosa* subsp. *amanica* TA 2253, 2- *A. cretica* BY 15634, 3- *A. multifida* BY 15889, 4- *Anacyclus clavatus* ISTE 73889.

#### 4.2. PCR Uygulamaları Sonucu Elde Edilen Bulgular


İzolasyon sonucu elde edilen nrDNA'nın PCR amplifikasyonuyla ITS bölgeleri çoğaltılmıştır. Bant elde edilemeyen örnekler tekrardan PCR amplifikasyonuna tabi tutulmuştur. Her tekrar aşamasında nrDNA miktarı değiştirilerek en uygun bant elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bant görüntüleri Şekil 4.7-21'de verimmiştir.




Şekil 4.7. *Achillea* taksonlarının ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *Achillea aleppica* subsp. *aleppica* TA 1388, 2- *A. aleppica* zederbaueri TA 2620, 3- *A. brachyphylla* BY 15136, 4- *A. formosa* subsp. *formosa* TA 2991, 5- *A. hamzaoglu* TA 2954, 6- *A. cappadocica* TA 1567, 7- *A. setaceae* TA 2133, 8- *A. gonicephala* TA 2957 (K: Kontrol).




Şekil 4.8. *Achillea* taksonlarının ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *A. latiloba* TA 1614, 2- *A. siehenana* TA 1527, 3- *A. membranacea* TA 2951, 4- *Anacyclus clavatus* EGE 24127, 5- *A. biserrata* BY 16676, 6- *A. maritima* subsp. *maritima* EGE 396, 7- *A. filipendulina* TA 1625, 8- *A. oligocephala* TA 1635, 9- *A. schischkinii* TA 2959a, 10- *A. nobilis* subsp. *kurdica* TA 1409, 11- *A. maritima* TA 1947, 12- *A. grandifolia* TA 2254, 13- *A. millefolium* TA 1429 (K: Kontrol).




Şekil 4.9. *Achillea* taksonlarının ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *A. latiloba* TA 1614, 2- *A. sivasica* TA 1755, 3- *A. nobilis* subsp. *denissima* TA 2062, 4- *A. sivasica* TA 2208, 5- *A. gypsicola* TA 2221 (K: Kontrol).




Şekil 4.10. *Achillea* taksonlarının ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *A. nobilis* subsp. *kurdica* TA 1409, 2- *A. maritima* TA 1947, 3- *A. grandifolia* TA 2254, 4- *A. millefolium* TA 1429, 5- *A. aleppica* subsp. *aleppica* TA 1388, 6- *A. coarctata* TA 2671, 7- *A. teretifolia* BY 8035, 8- *A. sintenisii* TA 2080, 9- *A. formosa* subsp. *amanica* TA 2253, 10- *A. cretica* BY 15634, 11- *A. brachyphylla* BY 15136, 12- *A. multifida* BM 5003, 13- *A. siehenana* TA 1527 (K: Kontrol).




Şekil 4.11. *Achillea* taksonlarının ve *Anacyclus clavatus* türünün ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *Achillea siehenana* TA 1527, 2- *A. latiloba* TA 1614, 3- *A. siehenana* TA 1527, 4- *A. membranacea* TA 2951, 5- *Anacyclus clavatus* EGE 24127, 6- *A. biserrata* BY 16676, 7- *A. maritima* subsp. *maritima* EGE 396, 8- *A. santolinoides* subsp. *wilhelmsii* TA 2231, 9- *A. oligocephala* TA 1635, 10- *A. schischkinii* TA 2959a (K: Kontrol).




Şekil 4.12. *Achillea* taksonlarının ve *Anacyclus clavatus* türünün ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *Achillea sibirica* TA 2080, 2- *A. biserrata* BY 16676, 3- *Anacyclus clavatus* EGE 24127, 4-5- *A. multifida* BM 5003, 6- *A. formosa* subsp. *amanica* TA 2253, 7- *A. aleppica* zederbaueri TA 2620, 8- *Anacyclus clavatus* EGE 24127 (K: Kontrol).




Şekil 4.13. *Achillea* taksonlarının ve *Anacyclus clavatus* türünün ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *Anacyclus clavatus* EGE 24127, 2- *Achillea cretica* BY 15634, 3- *A. multifida* BM 5003, 4- *Anacyclus clavatus* EGE 24127, 5- *Achillea formosa* subsp. *amanica* TA 2253, 6- *A. cretica* BY 15634 (K: Kontrol).




Şekil 4.14. *Achillea* taksonlarının ve *Anacyclus clavatus* türünün ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *Achillea grandifolia* TA 2254, 2- *A. nobilis* subsp. *denissima* TA 2062, 3- *A. cretica* BY 15634, 4- *A. falcata* TA 2558, 5- *A. oligocephala* TA 1635, 6- *A. spinulifolia* TA 2189, 7- *A. fraasii* TA 2525, 8- *A. multifida* BM 5003, 9- *A. phyrigia* TA 2962, 10- *A. nobilis* subsp. *sypilea* BY 15750, 11- *Anacyclus clavatus* EGE 24127, 12- *Achillea vermicularis* TA 2559 (K: Kontrol).




Şekil 4.15. *Achillea* taksonlarının ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *A. sipikorensis* TA 2206, 2- *A. kotschyii* subsp. *canescens* TA 2627, 3- *A. salicifolia* subsp. *salicifolia* TA 2092, 4- *A. monocephala* TA 1584, 5- *A. crithmifolia* TA 1552, 6- *A. sintenisii* TA 2080, 7- *A. biserrata* BY 16676, 8- *A. formosa* subsp. *formosa* TA 2991, 9- *A. sivasica* TA 2208, 10- *A. arabica* TA 1440, 11- *A. latiloba* TA 1614, 12- *A. pannonica* TA 2131 (K: Kontrol Şekil 16'da verilmiştir).




Şekil 4.16. *Achillea* taksonlarının ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *A. pannonica* TA 2131, 2- *A. maritima* TA 1947, 3- *A. gypsicola* TA 1560, 4- *A. santolinoides* subsp. *wilhelmsii* TA 2231, 5- *A. magnifica* TA 2958, 6- *A. clypeolata* TA 1546, 7- *A. tenuifolia* TA 1427, 8- *A. sivasica* TA 2964, 9- *A. ketenoglui* TA 2219, 10- *A. milliana* TA 1600, 11- *A. pseudoallepica* TA 2244, 12- *A. formosa* subsp. *amanica* TA 2253 (K: Kontrol).




Şekil 4.17. *Achillea* taksonlarının ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *A. armenorum* TA 1968, 2- *A. schischkinii* TA 2959a, 3- *A. lycaonica* TA 1377, 4- *A. membranacea* TA 1385, 5- *A. filipendulina* TA 1625, 6- *A. boissieri* TA 2594, 7- *A. cucullata* TA 2083, 8- *A. siehenana* TA 1527, 9- *A. nobilis* subsp. *kurdica* TA 1409, 10- *A. membranacea* TA 2951, 11- *A. brachyphylla* BY 15136, 12- *A. nobilis* subsp. *neilreichii* TA 2129 (K: Kontrol Şekil 16'da verilmiştir).



Şekil 4.18. *Achillea* taksonlarının ve *Anacyclus clavatus* türünün ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1-3- *Achillea formosa* subsp. *amanica* TA 2253, 4-6- *A. cretica* BY 15634, 7-9- *A. multifida* BM 5003, 10-12- *Anacyclus clavatus* ISTE 73889 (K: Kontrol).



Şekil 4.19. *Achillea* taksonlarının ve *Anacyclus clavatus* türünün ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1-2- *Achillea kotschyii* subsp. *kotschyii* TA 1734, 3-4- *A. formosa* subsp. *amanica* TA 2253, 5-6- *A. multifida* BM 5003, 7-8- *Anacyclus clavatus* ISTE 73889 (K: Kontrol).




Şekil 4.20. *Achillea* taksonlarının ve *Anacyclus clavatus* türünün ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *Achillea multifida* BM 5003, 2- *Anacyclus clavatus* ISTE 73889, 3-4- *Achillea kotschyii* subsp. *kotschyii* TA 1734 (K: Kontrol).



Şekil 4.21. *Achillea multifida* ve *Anacyclus clavatus* türünün ITS Primerleriyle yapılan PCR ürünlerine ait jel fotoğrafı (M: Marker). 1- *Achillea multifida* BM 5003, 2- *Anacyclus clavatus* ISTE 73889 (K: Kontrol).


### 4.3. Filogenetik Analiz

Karakter temelli yöntemlerden Maksimum Parsimonisi kriteri kullanılarak ortak uyumluluk (consensus) ağaçlarından strict consensus ağaçları oluşturulmuştur (Şekil 4.22). Bu ağaç oluştururken 531 karakter incelenmiş ve bunlardan 363'si sabit, 86'sının parsimonik açıdan önemli olmayan, 82'sinin ise parsimonik açıdan önemli değişken karakterler olduğu tespit edilmiştir.




Şekil 4.22. *Achillea* cinsinin ülkemizde yayılış gösteren 48 türü ve 7 adet dış grubun ITS bölgesinin Maksimum Parsimonisi ile elde edilen Strict Konsensus ağaçları (I: sect. *Othantus*, II: sect. *Babounya*, III: sect. *Ptarmica*, IV: *Anthemoideae*, V: sect. *Achillea*).

Parsimony kriteri kullanılarak Bootstrap analizi yapılmıştır. *Achillea* ve dış grup olarak 7 cinse ait ITS bölgelerinin bootstrap analizi sonucu oluşan ağacı Şekil 4.23'de verilmiştir. Bu ağaç, maksimum ağaç sayısı 1000 ve 100 tekrar yapılarak elde edilmiştir.




Şekil 4.23. *Achillea* cinsinin ülkemizde yayılış gösteren 48 türü ve 7 adet dış grubun ITS bölgelerinin Bootstrap analizi sonucu oluşan ağacı (I: sect. *Othantus*, II: sect. *Babounya*, III: sect. *Ptarmica*, IV: *Anthemoideae*, V: sect. *Achillea*).

Bazı yurt dışı *Achillea* türlerinin de dahil edildiği Bootstrap analizi sonucu oluşan ağaç Şekil 4.24'de verilmiştir. Bu ağaçta Ülkemizde yayılışı olmayan 18 *Achillea* türü yer almaktadır.




Şekil 4.24. *Achillea* cinsinin ülkemizde yayılış gösteren 48 türü, 18 yurt dışı türü ve 7 adet dış grubun ITS bögelerinin Bootstrap analizi sonucu oluşan ağaç (I: sect. *Othantus*, II: sect. *Babounya*, III: sect. *Ptarmica*, IV: *Anthemoideae*, V: sect. *Achillea*).

Parsimony analizine ek olarak mesafe temelli yöntemlerden UPGMA (Unweighted Pair Group Method Using Arithmetic Average) ve NJ (Neighbor Joining) analizleri yapılmıştır. UPGMA analizi sonucu elde edilen ağaç Şekil 4.25'de verilmiştir.




Şekil 4.25. *Achillea* cinsinin ülkemizde yayılış gösteren 48 türü ve 7 adet dış grubun ITS bögelerinin UPGMA analizi sonucu oluşan ağaç (I: sect. *Othantus*, II: sect. *Babounya*, III: sect. *Ptarmica*, IV: *Anthemoideae*, V: sect. *Achillea*).

Bazı yurt dışı *Achillea* türlerinin de dahil edildiği ve dış gruptara ait ITS bölgelerinin UPGMA analizi sonucu oluşan ağaç Şekil 4.26'da verilmiştir.




Şekil 4.26. *Achillea* cinsinin ülkemizde yayılış gösteren 48 türü, 18 yurt dışı türü ve 7 adet dış grubun ITS bölgelerinin UPGMA analizi sonucu oluşan ağaç (I: sect. *Othantus*, II: sect. *Babounya*, III: sect. *Ptarmica*, IV: *Anthemoideae*, V: sect. *Achillea*).

Genetik uzaklılığı belirlemek üzere NJ (Neighbor Joining) analizi de yapılmıştır (Şekil 4.27).



Şekil 4.27. *Achillea* cinsinin ülkemizde yayılış gösteren 48 türü ve 7 adet dış grubun ITS bölgelerinin NJ (Neighbor Joining) analizi sonucu oluşan ağacı (I: sect. *Othantus*, II: sect. *Babounya*, III: sect. *Ptarmica*, IV: *Anthemoideae*, V: sect. *Achillea*).

Bazı yurt dışı *Achillea* türlerinin de dahil edildiği ve dış gruptara ait ITS bölgelerinin NJ (Neighbor Joining) analizi sonucu oluşan ağacı Şekil 4.28'de verilmiştir.



Şekil 4.28. *Achillea* cinsinin ülkemizde yayılış gösteren 48 türü, 18 yurt dışı türü ve 7 adet dış grubun ITS bölgelerinin NJ (Neighbor Joining) analizi sonucu oluşan ağacı (I: sect. *Othantus*, II: sect. *Babounya*, III: sect. *Ptarmica*, IV: *Anthemoideae*, V: sect. *Achillea*).

## 5. TARTIŞMA

Bu çalışmada, ülkemizde yayılış gösteren *Achillea* cinsine ait taksonların nrDNA'sının ITS bölgeleri filogenetik bakımdan analiz edilerek, taksonların akrabalık ilişkileri belirlenmiştir. Aytaç vd. tarafından 2016 yılında yeni tür olarak yayınlanan *Achillea adenii* Aytaç & M.Ekici ve *Achillea baltai* H.Duman & Aytaç türlerine ait bitki örneklerine ulaşılamadığı için bu iki yeni türün moleküler filogeneti analizi bu çalışma kapsamında yapılamamıştır (20).

ITS bölgesi, ITS1 ve ITS2 bölgelerinden oluşmaktadır ve filogenetik açıdan iyi korunmuş bölgelerdir. Bu bölgeler arasındaki farklar türler arası ve tür içi taksonomik ayırmalarda bazı cinslerde oldukça iyi sonuçlar vermektedir.

*Achillea* türleri Türkiye Florasında 6 seksiyon altında toplanmaktadır. Bu seksiyonların ayırmaya anahtarı aşağıda verilmiştir (13).

### Seksiyon Anahtarı

1. Yapraklar tam
2. Dilsiz çiçekler beyaz..... **Ptarmica**
2. Dilsiz çiçekler sarı..... **Babounya**
1. Yapraklar parçalı
  3. Yapraklar lineer, genişliği 0.4 cm'den az; segmentler küçük-enine-imbrikat ya da bazen aralıklı segmentlere bölünmüş, eni boyundan uzun
    4. Fillariler tabanda eklemli, çabuk düşücü..... **Arthrolepis**
    4. Fillariler tabanda eklemli değil, kalıcı..... **Santolinoideae**
  3. Yapraklar lineer, lanseolat ya da oblong'dan genişçe ovat'a kadar, genişliği 0.4 cm'den fazla; segmentler imbrikat değil, eni boyundan kısa
    5. Dilsiz çiçekler 4-6, beyaz, üst kısımlarında soluk sarı yada fildiği..... **Millefolium**
    5. Dilsiz çiçekler (2-)4-6 adet, sarı ..... **Filipendulinae**

Huber-Morath (1975) tarafından verilen seksiyonlarda türler yukarıdaki anahtarda da yer alan morfolojik özellikleri göz önüne alınarak sınıflandırılmıştır (13). *Achillea* türlerinin seksiyonları daha sonra Ehrendorfer ve Guo (2006) tarafından moleküler veriler ışığında yeniden düzenlenmiştir (12). Bu çalışmada da *Achillea*'nın *Arthrolepis* Boiss. ve

*Santolinoideae* DC. seksiyonları *Babounya* (DC.) O.Hoffm seksiyonu altında, *Filipendulinae* (DC.) Boiss. ve *Millefolium* (DC.) W.Koch. seksiyonları da *Achillea* seksiyonu altında birleştirilmiştir. Ayrıca *Otanthus* cinsinin tek türü *Achillea maritima* (L.) Ehrend. ve Y.-P.Guo olarak sect. *Otanthus* (Hoffmanns. ve Link) Ehrend. ve Y.-P.Guo altında, *Leucocyclus* cinsi ise *Achillea formosa* (Boiss.) Sch.Bip. olarak *Babounya* seksiyonunun altında yer almıştır. *Ptarmica* seksiyonu altında yer alan *Achillea fraasii* Sch.Bip. ve *A. multifida* (DC.) Griseb. türleri ise *A.* sect. *Anthemoidae* altında verilmiştir.

Ülkemizde yayılış gösteren *Achillea*, *Otanthus* ve *Leucocyclus* cinslerine ait türlerin Ehrendorfer ve Guo (2006) tarafından moleküler veriler ışığında yapılan ve Huber-Morath (1975) tarafından Türkiye Florasında verilen seksiyon düzeyindeki dağılımı Tablo 5.1'de verilmiştir (12, 13).

Tablo 5.1. *Achillea*, *Otanthus* ve *Leucocyclus* cinslerine ait türlerin seksiyon düzeyindeki dağılımları.

Seksiyonlar (Ehrendorfer ve Guo 2006)	Seksiyonlar (Huber-Morath 1975)	Türler
<i>A. sect.Othantus</i>	<i>Otanthus</i> cinsi altında	1. <i>A. maritima</i> subsp. <i>maritima</i>
<i>A. sect. Babounya</i>	<i>Leucocyclus</i> cinsi altında	1. <i>A. formosa</i> subsp. <i>formosa</i> <i>A. formosa</i> subsp. <i>amanica</i>
	<i>A. sect. Babounya</i>	1. <i>A. sieheana</i>
	<i>A. sect. Arthrolepis</i>	1. <i>A. membranacea</i> 2. <i>A. brachyphylla</i> 3. <i>A. oligocephala</i> 4. <i>A. sipikorensis</i>
	<i>A. sect. Santolinoidea</i>	1. <i>A. santolinoides</i> subsp. <i>wilhelmsii</i> 2. <i>A. falcata</i> 3. <i>A. cucullata</i> 4. <i>A. vermicularis</i> 5. <i>A. monocephala</i> 6. <i>A. schischkinii</i> 7. <i>A. lycaonica</i> 8. <i>A. magnifica</i> 9. <i>A. sivasica</i> 10. <i>A. tenuifolia</i> 11. <i>A. phrygia</i> 12. <i>A. gypsicola</i> 13. <i>A. boissieri</i> 14. <i>A. aleppica</i> subsp. <i>aleppica</i> <i>A. aleppica</i> subsp. <i>zederbaueri</i> 15. <i>A. pseudoaleppica</i> 16. <i>A. teretifolia</i>

		17. <i>A. cretica</i> 18. <i>A. armenorum</i> 19. <i>A. baltae</i> 20. <i>A. sintenisii</i> 21. <i>A. adenii</i> 22. <i>A. milliana</i> 23. <i>A. ketenoglu</i> 24. <i>A. hamzaoglu</i> 25. <i>A. goniocephala</i> 26. <i>A. spinulifolia</i>
<i>A. sect. Ptarmica</i>	<i>A. sect. Ptarmica</i>	1. <i>A. biserrata</i> 2. <i>A. salicifolia</i> subsp. <i>salicifolia</i>
<i>A. sect. Anthemoideae</i>		1. <i>A. fraasii</i> 2. <i>A. multifida</i>
<i>A. sect. Achillea</i>	<i>A. sect. Millefolium</i>	1. <i>A. latiloba</i> 2. <i>A. grandifolia</i> 3. <i>A. millefolium</i> subsp. <i>millefolium</i> 4. <i>A. pannonica</i> 5. <i>A. setacea</i> 6. <i>A. crithmifolia</i> 7. <i>A. kotschy</i> subsp. <i>kotschy</i> <i>A. kotschy</i> subsp. <i>canescens</i> 8. <i>A. nobilis</i> subsp. <i>neilreichii</i> <i>A. nobilis</i> subsp. <i>densissima</i> <i>A. nobilis</i> subsp. <i>sipylea</i> <i>A. nobilis</i> subsp. <i>kurdica</i>
	<i>A. sect. Filipendulinae</i>	1. <i>A. filipendulina</i> 2. <i>A. clypeolata</i> 3. <i>A. coarctata</i> 4. <i>A. arabica</i> 5. <i>A. cappadocica</i>
<b>Toplam</b>		<b>50</b>

Bu çalışma sonucu elde edilen dizilerden filogenetik ağaçlar oluşturulmuştur. Bu ağaçlar oluşturulurken karakter temelli yöntemler ve genetik uzaklık kriterlerinden yararlanılmıştır. Karakter temelli yöntemlerden parsimony kriteri kullanılmıştır. Parsimony (tutumluluk) ilkesine göre doğalarındaki bir teori mevcut durumlar ile uygunluk gösteren en basit açıklamaya sahip olmalıdır (42).

Ortak uyumluluk (consensus) ağaçlarından strict consensus ağacı incelendiği zaman dış grupların ayrı bir grup oluşturduğu ancak *Achillea grandifolia* ve *A. multifida* türlerinin de bu dış gruplar arasında yer aldığı gözlenmektedir. Bu iki türün dışındaki *Achillea* taksonlarının ise monofiletik olduğunu görmekteyiz (Şekil 4.22).

*Achillea* ve dış gruplara ait ITS bölgelerinin bootstrap analizi yapılmıştır (Şekil 4.23). Bootstrap yöntemi, ağaçların %0 ve %100 arasındaki güvenirlilik derecelerini vermektedir ve

güvenirlik oranı %50'nin üzerinde konsensus ağaçını oluşturmaktadır. Çözülmeyen veya karışık veriler sunan soy ağacında tek bir ortak atadan gelen 3 veya daha fazla nesil politomi olarak adlandırılır (43). *A. falcata* ve *A. spinulifolia* %99 bootstrap değeri ile diğer taksonlara göre daha yakın akrabadır. Aynı seksiyonda yer alan bu iki türün yayılış alanı Toros'lardır ve birbirine yakındır. Morfolojik olarak; *A. falcata*'nın çiçek durumu sapı 1-20 mm, capitulum sayısı 1-40 ve dilsiz çiçekler sarı renkte iken, *A. spinulifolia*'nın çiçek durumu sapı 5-70 mm, capitulum sayısı 3-12 ve dilsiz çiçekler beyaz renktedir. Bu taksonlar monofiletiktirler (Şekil 5.1).



Şekil 5.1. *A. falcata* (A) ve *A. spinulifolia* (B)'nın çiçek durumları.

Birbirine yakın akraba olan ve aynı seksiyonda yer alan *Achillea membranacea* ve *A. oligocephala*'nın bulunduğu dal ise %91 oranında desteklenmiştir (Şekil 4.23). Bu türler morfolojik olarak birbirine yakın ve ülkemizde sadece Şanlıurfa çevresinde yayılış göstermektedirler. *A. membranacea* involukrumlarının büyük, dilsiz çiçeklerinin uzun olması ile *A. oligocephala*'dan ayrılmaktadır. Bu iki türün monofiletik türler olduğu gözükmeğtedir (Şekil 5.2).



Şekil 5.2. *A. membranacea* (A) ve *A. oligocephala* (B)'nın capitulumları.

*Achillea formosa*'nın iki alt türünün bulunduğu dal da %51 oranında desteklenmiştir. Aynı seksiyonda yer alan *A. armenorum* ve *A. aleppica* subsp. *aleppica*'nın bulunduğu dal %69, *A. hamzaogluii* ve *A. schischkinii* % 55, *A. millefolium* ve *A. setacea* %76 oranında desteklenmiştir. *A. nobilis* türünün *sipylea* ve *densissima* alt türlerinin bulunduğu dal %58 oranında desteklenirken, diğer iki alt türünde (subsp. *kurdica* ve subsp. *neilreichii*) dal destek oranı %50'nin altında olmuş ve politomi gerçekleşmiştir. Dış grubu oluşturan türlerden 4'ü (*Chamaemelum nobile*, *Santolina oblongifolia*, *Chrysanthemum lavandulifolium* ve *Leucanthemum vulgare*) aynı dal üzerinde % 90 desteklenirken, diğer 2'sinde (*Anacyclus clavatus*, *Anthemis arvensis* ve *Tanacetum millefolium*) ise politomi görülmektedir (Şekil 4.23).

Şekil 4.23 incelendiğinde %50'nin üzerinde desteklenen *Achillea kotschyii* subsp. *canescens* ile *A. gonocephala* (%56), *A. salicifolia* subsp. *salicifolia* ile *A. latiloba* (%51), *A. crithmifolia* ile *A. santolinoides* subsp. *wilhelmsii* (%100) ve *A. pseudoaleppica* ile *A. biserrata* (%60) türlerinin morfolojik bakımından farklı seksiyonlarda yer aldığı görülmektedir. Ağaçta güvenirlilik değeri %50'nin altında kalan dallarda politomi oluşmuştur. Bu dallarda dallanma modeli belirlenemediğinden taksonlar arasında bir yorum yapılamamıştır.

Bootstrap yöntemi ile elde edilen ağaçda iyi ayrılmayan türler görülmektedir. Bu türler arasında muhtemelen gen alış-verisi yani hiritleşme olabilir. Bunların tür sınırları henüz tam olarak izole olmamıştır.

Bazı yurt dışı *Achillea* türlerinin de dahil edildiği Bootstrap analizi sonucu oluşan ağaç incelendiğinde türlerin büyük oranda kendi seksiyonları içinde dağılım gösterdikleri görülmektedir. Türkiye türlerinin ağaç üzerinde dallanma şekilleri ise büyük oranda değişmeden kalmıştır (Şekil 4.24).

Mesafe temelli yöntemlerden UPGMA analizi sonucu elde edilen ağaç Şekil 4.25'de, bazı yurt dışı *Achillea* türlerinin de dahil edildiği ve dış gruplara ait ITS bölgelerinin UPGMA analizi sonucu oluşan ağaç ise Şekil 4.26'da verilmiştir. Her iki ağaçta da ülkemiz türleri benzer bir dağılım gösterirken, yurt dışı türleri ise genellikle kendi seksiyonunda yer alan türlerle birlikte gruplanmıştır.

Bu ağaçlar incelendiğinde dış grupların kendi içinde gruplandığı görülmektedir. Ancak *Achillea maritima* subsp. *maritima* ve *A. multifida* dış grupların arasında yer almaktadır. *A. maritima* Türkiye Florası'nda *Otanthus* altında ayrı bir cins olarak yer almaktadır (44). *Achillea* cinsinin moleküler filogenisi ile ilgili yapılan çalışmalarda *Otanthus* cinsi *Achillea* cinsine dahil edilmiştir (16). *Achillea* cinsinde capitulumlar (*Achillea fragrantissima* (Forssk.) Sch. Bip. hariç) heterogam-radiat iken, *Othantus* cinsinin capitulumu homogam-diskoiddir. Bu morfolojik fark Asteraceae familyasının cinslerinin ayrimında kullanılan önemli bir karakterdir. Bu çalışmadan elde edilen veriler morfolojik özelliklerle birlikte değerlendirildiğinde *A. maritima* türünün tekrar cins seviyesine yükseltilerek, *Otanthus* cinsi altında yer alması gerektiğini önermektedir.

*Achillea multifida* yapraklarının pinnatisekt ve loblarının aralıklı olması ile *Anthemis* türlerine benzerlik göstermektedir. Ağaçta da dış grup olan *Anthemis arvensis* türü *Achillea multifida*'ya yakın çıkmıştır (Şekiller 4.25, 4.26). *Achillea* cinsi papus'unun olmaması, tüpsü çiçeklerin tabanının akeni sarması ve palea özelliklerile *Anthemis* cinsden ayrılmaktadır.

*Achillea grandifolia* türü *Tanacetum millefolium* ile aynı dalda yer almaktadır. *Achillea* cinsi morfolojik bakımından reseptakulumda palea bulundurması ile *Tanacetum* cinsinden ayrılmaktadır. Bu karakter familya içinde pek çok cinsin ayrimında kullanılan önemli bir özelliklektir. Bununla birlikte *Achillea grandifolia* gerek yaprak gerekse çiçek morfolojisini bakımından incelendiğinde *Tanacetum* türlerine oldukça benzer olan bir türdür.

*Achillea* türleri temelde yapraklarının küçük segmentli, kiremit dizilişli (1-2-pinnatisekt) olması yada segmentlerin geniş ve aralıklı (3-4-pinnatisekt) olması ile birbirinden ayırmaktadır. UPGMA analizi sonucu elde edilen ağaç incelendiğinde yaprakları kiremit dizilişli türlerin genellikle ağacın üst kısmında (sect. *Babounya*), kiremit dizilişli (imbricate) olmayan türlerin ise alt kısmında yer aldığı görülmektedir (sect. *Ptarmica*, sect. *Anthemoideae*, sect. *Achillea*). Türler seksiyon bazında da genellikle kendi grupları içinde dağılım göstermişlerdir. Ehrendorfer ve Guo (2006) tarafından moleküler veriler sonucu yapılan *Achillea* türlerinin seksiyonlara göre dağılımı ile bizim elde ettiğimiz ağaç büyük oranda uyum içerisinde yer almaktadır. Ehrendorfer ve Guo (2006) tarafından verilen *Babounya*

seksiyonu yaprakları kiremit dizilişli olan türleri, *Achillea* seksiyonu ise yaprak segmentleri geniş ve aralıklı olan türleri içermektedir (12).

UPGMA analizi sonucu elde edilen ağaç incelendiğinde *Achillea sivasica* türünün *A. phrygia* ve *A. gypsicola*'nın farklı lokalitelerden toplanan iki örneği (1560 ve 2221) ile yakın dallarda yer aldığı görülmektedir (Şekiller 4.25, 4.26). Benzer durum NJ ağacında da görülmektedir (Şekiller 4.27, 4.28). *A. sivasica*, çiçek durumu sapının uzun, korimbusun dar, capitulumun büyük ve az sayıda olması ile *A. gypsicola*'ya da benzerlik göstermektedir. Fakat yaprak ve filleri özellikleri ile farklılık göstermektedir. *A. sivasica*'nın *A. phrygia*'dan farkı; çiçek durumu sapının uzun, capitulum sayısının az, involukrum ve fillarilerinin daha büyük olmasıdır. Yaprak ve capitulum özellikleri ise aynıdır (Şekil 5.3). *A. sivasica*, morfolojik olarak *A. gypsicola*'ya oldukça benzerdir. Aralarındaki morfolojik farklılıklar bu iki taksonun ayrı birer tür olarak değerlendirilmesi için yeterli değildir. Moleküller sonuçlarda bu morfolojik benzerliği desteklemiştir. Bu nedenle, morfolojik ve moleküler veriler sonucunda *A. sivasica*'nın *A. gypsicola* türünün, *A. gypsicola* subsp. *sivasica* (Çelik & Akpulat) Arabacı & G.Uzay şeklinde bir alt türü olması gerektiği belirlenmiştir.



Şekil 5.3. *A. gypsicola*(A), *A. sivasica* (B) ve *A. phrygia* (C)'nın capitulumları.

NJ (Neighbor Joining) analizi ile elde edilen ağaçlarda *Achillea* türlerinin dallanması UPGMA analizi sonucu elde edilen ağaç desteklemektedir. Dış gruplar kendi arasında dallanırken, *Achillea grandifolia* türü *Tanacetum millefolium* ile aynı dalda yer almıştır (Şekiller 4.27, 4.28).

## 6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma sonucunda, Türkiye'de yayılış gösteren *Achillea* cinsine ait türler moleküler filogenetik açıdan değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar cinsin mevcut morfolojik özellikleri ile karşılaştırılarak *Achillea*'nın cins, seksiyon ve tür düzeyinde taksonomik durumu tartışılmıştır. Buna göre:

1. Cins düzeyinde; *Achillea maritima* türünün tekrar *Otanthus* cinsi altında *O. maritimus* (L.) Hoffmanns. & Link şeklinde yer olması gerektiği,
2. Seksiyon düzeyinde; *Achillea* türlerinin Ehrendorfer ve Guo (2006) tarafından verilen *A. sect. Othantus* dışındaki 4 seksiyon (*A. sect. Babounya* *A. sect. Ptarmica*, *A. sect. Anthemoideae* ve *A. sect. Achillea*) altında yer olması gerektiği (Tablo 6.1),
3. Tür düzeyinde ise; *Achillea sivasica*'nın, *A. gypsicola* subsp. *sivasica* (Çelik & Akpulat) Arabacı & G.Uzay comb. et stat. nova olarak *A. gypsicola* türünün bir alt türü olması gerektiği tarafımızdan önerilmektedir.

Bu çalışma *Achillea* cinsine ait taksonların nrDNA'sının ITS bölgeleri filogenetik analizini içermektedir. Bu gen bölgesi bazı taksonları ayırmada yeterli olmayabilir. Bu nedenle farklı gen bölgeleri ile yapılacak olan çalışmalar ile bu durum çözülebilir.

Buna göre ülkemizde yayılış gösteren *Achillea* taksonları 4 seksiyona ait 5'i tipik, 9'u tipik olmayan 48 tür olarak Tablo 6.1'de verilmiştir.

Tablo 6.1. Türkiye'de yayılış gösteren *Achillea* seksiyonları ve içerdikleri türler.

Seksiyonlar (Ehrendorfer & Guo 2006 ve bu çalışma sonucunda)	Seksiyonlar (Huber-Morath 1975)	Türler (Bu çalışmadan önce)	Türler (Bu çalışma sonucunda)
<i>A. sect. Othantus</i>	<i>Otanthus</i> cinsi altında	1. <i>Achillea maritima</i> subsp. <i>maritima</i>	<i>Otanthus maritimus</i>
<i>A. sect. Babounya</i>	<i>Leucocyclus</i> cinsi altında	1. <i>A. formosa</i> subsp. <i>formosa</i> 2. <i>A. formosa</i> subsp. <i>amanica</i>	1. <i>A. formosa</i> subsp. <i>formosa</i> 2. <i>A. sieheana</i>
	<i>A. sect. Babounya</i>	1. <i>A. sieheana</i>	3. <i>A. membranacea</i>
	<i>A. sect. Arthrolepis</i>	1. <i>A. membranacea</i> 2. <i>A. brachyphylla</i> 3. <i>A. oligocephala</i> 4. <i>A. sipikorensis</i>	4. <i>A. brachyphylla</i> 5. <i>A. oligocephala</i> 6. <i>A. sipikorensis</i> 7. <i>A. santolinoides</i> subsp. <i>wilhelmsii</i> 8. <i>A. falcata</i> 9. <i>A. cucullata</i> 10. <i>A. vermicularis</i> 11. <i>A. monocephala</i> 12. <i>A. schischkinii</i> 13. <i>A. lycaonica</i>
	<i>A. sect. Santolinoidae</i>	1. <i>A. santolinoides</i> subsp. <i>wilhelmsii</i> 2. <i>A. falcata</i> 3. <i>A. cucullata</i> 4. <i>A. vermicularis</i> 5. <i>A. monocephala</i> 6. <i>A. schischkinii</i> 7. <i>A. lycaonica</i> 8. <i>A. magnifica</i> 9. <i>A. sivasica</i>	

		10. <i>A. tenuifolia</i> 11. <i>A. phrygia</i> 12. <i>A. gypsicola</i> 13. <i>A. boissieri</i> 14. <i>A. aleppica</i> subsp. <i>aleppica</i> A. <i>aleppica</i> subsp. <i>zederbaueri</i> 15. <i>A. pseudoaleppica</i> 16. <i>A. teretifolia</i> 17. <i>A. cretica</i> 18. <i>A. armenorum</i> 19. <i>A. balta</i> 20. <i>A. sintenisii</i> 21. <i>A. adenii</i> 22. <i>A. milliana</i> 23. <i>A. ketenoglu</i> 24. <i>A. hamzaoglu</i> 25. <i>A. goniocephala</i> 26. <i>A. spinulifolia</i>	14. <i>A. magnifica</i> 15. <i>A. tenuifolia</i> 16. <i>A. phrygia</i> 17. <i>A. gypsicola</i> subsp. <i>gypsicola</i> A. <i>gypsicola</i> subsp. <i>sivasica</i> 18. <i>A. boissieri</i> 19. <i>A. aleppica</i> subsp. <i>aleppica</i> A. <i>aleppica</i> subsp. <i>zederbaueri</i> 20. <i>A. pseudoaleppica</i> 21. <i>A. teretifolia</i> 22. <i>A. cretica</i> 23. <i>A. armenorum</i> 24. <i>A. balta</i> 25. <i>A. sintenisii</i> 26. <i>A. adenii</i> 27. <i>A. milliana</i> 28. <i>A. ketenoglu</i> 29. <i>A. hamzaoglu</i> 30. <i>A. goniocephala</i> 31. <i>A. spinulifolia</i>
<i>A. sect. Ptarmica</i>	<i>A. sect. Ptarmica</i>	1. <i>A. biserrata</i> 2. <i>A. salicifolia</i> subsp. <i>salicifolia</i>	1. <i>A. biserrata</i> 2. <i>A. salicifolia</i> subsp. <i>salicifolia</i>
<i>A. sect.</i> <i>Anthemoidae</i>		1. <i>A. fraasii</i> 2. <i>A. multifida</i>	1. <i>A. fraasii</i> 2. <i>A. multifida</i>
<i>A. sect. Achillea</i>	<i>A. sect. Millefolium</i>	1. <i>A. latiloba</i> 2. <i>A. grandifolia</i> 3. <i>A. millefolium</i> subsp. <i>millefolium</i> 4. <i>A. pannonica</i> 5. <i>A. setacea</i> 6. <i>A. crithmifolia</i> 7. <i>A. kotschy</i> subsp. <i>kotschy</i> A. <i>kotschy</i> subsp. <i>canescens</i> 8. <i>A. nobilis</i> subsp. <i>neilreichii</i> A. <i>nobilis</i> subsp. <i>densissima</i> A. <i>nobilis</i> subsp. <i>sipylea</i> A. <i>nobilis</i> subsp. <i>kurdica</i>	1. <i>A. latiloba</i> 2. <i>A. grandifolia</i> 3. <i>A. millefolium</i> subsp. <i>millefolium</i> 4. <i>A. pannonica</i> 5. <i>A. setacea</i> 6. <i>A. crithmifolia</i> 7. <i>A. kotschy</i> subsp. <i>kotschy</i> A. <i>kotschy</i> subsp. <i>canescens</i> 8. <i>A. nobilis</i> subsp. <i>neilreichii</i> A. <i>nobilis</i> subsp. <i>densissima</i> A. <i>nobilis</i> subsp. <i>sipylea</i> A. <i>nobilis</i> subsp. <i>kurdica</i> 9. <i>A. filipendulina</i> 10. <i>A. clypeolata</i> 11. <i>A. coarctata</i> 12. <i>A. arabica</i> 13. <i>A. cappadocica</i>
<b>Toplam</b>		<b>50 tür</b>	<b>48 tür</b>

## KAYNAKLAR

1. Güner A, Ekim T. (eds). *Resimli Türkiye Flora*, cilt 1. İstanbul, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları2014.
2. Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT. (eds). *Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)*. İstanbul, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayıını2012.
3. Davis PH. Flora of Turkey and East Aegean Islands (vol. 1-9). Edinburgh, Edinburgh University Press1965-1985.
4. Davis PH, Mill RR, Tan K. Flora of Turkey and East Aegean Islands, (vol. 10). Edinburgh, Edinburgh University Press 1988: 213-4.
5. Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC. *Flora of Turkey and East Aegean Islands*, vol. 11. Edinburgh, Edinburgh University Press 2000: 213-4.
6. Baytop T. *Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi*. Nobel Tıp Kitabevleri 1999: 520.
7. Brunke EJ, Hammerschmidt FJ, Aboutabl EA. Progress in Essential Oil Research. Berlin, New York, Walter de Gruyterand Co. 1986: 85.
8. Arabacı T. Türkiye'de Yetişen Achillea L. (Asteraceae) Cinsinin Revizyonu. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji anabilim Dalı. Doktora tezi,Malatya: İnönü Üniversitesi,2006.
9. Arabacı T. *Achillea* L. In: Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (eds). *Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)*.İstanbul, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayıını2012:108-112.
10. Bremer K. *Asteraceae: Cladistics & Classification*. Timber Press, Oregon 1994.
11. Kadereit JW, Jeffrey C (eds). Flowering Plants. Eudicots: Asterales. In: Kubitzki K (ed).*The Families and Genera of Vascular Plants*, Vol. 8. Berlin, Springer 2007.
12. Ehrendorfer F, Guo YP. Multidisciplinary studies on *Achillea* sensu lato (Compositae-Anthemideae): new data on systematics and phylogeography.*Willdenowia* 2006, 36: 1–19.
13. Huber-Morath A.*Achillea* L. In:Davis PH. (ed). *Flora of Turkey and the East Aegean Islands*, vol. 5. Edinburgh, Edinburgh University Press1975: 224-52.
14. Duman H. *Achillea* L.In : Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC. (eds). *Flora of Turkey and the East Aegean Islands*, (supplement)vol. 11. Edinburgh, Edinburgh University Press2000: 158-9.
15. Danihelka J. *Achillea pannonica* in the Czech Republic, with taxonomic remarks.*Preslia*2001, 73: 213-44.

16. Ehrendorfer F, Guo YP. Changes in the circumscription of the genus *Achillea* (Compositae-Anemoneae) and its subdivision. *Willdenowia* 2005, 35: 1-6.
17. Arabacı T, Yıldız B. *Achillea salicifolia* Besser subsp. *salicifolia* (Asteraceae) in Turkey, with Taxonomic Remarks. *Tr J Bot* 2006, 30: 171-4.
18. Çelik N, Akpulat HA. *Achillea sivasica* (Asteraceae: sect. Babounya (DC.) O. Hoffm.), a new species from Inner Anatolia, Turkey. *Kew Bulletin* 2008, 63: 485-9.
19. Arabacı T, Budak Ü. *Achillea hamzaoglu* (Asteraceae), a new species from Turkey. *Ann Bot Fenn* 2009, 46: 459-463.
20. Aytaç Z, Duman H, Ekici M. Two new *Achillea* L. (Asteraceae) species from Turkey. *Turk J Bot* 2016, 40: 373-9.
21. Akyalçın H, Arabacı T, Yıldız B. Türkiye'de Yetişen *Achillea* L. (Asteraceae) Taksonlarının Polen Morfolojisi, TÜBİTAK Projesi (Proje No: TBAG-104T291), 2009.
22. Akyalçın H, Arabacı T, Yıldız B.. Pollen morphology of some *Achillea* L. sect. *Babounya* (DC.) O. Hoffm. (Asteraceae) species from Turkey. *Acta Botanica Gallica* 2014, 161: 129-49.
23. Akyalçın H, Arabacı T, Yıldız B. Pollen morphology of six *Achillea* L. sect. *Achillea* (Asteraceae) species in Turkey. *Tr J Bot* 2011, 35: 183-201.
24. Şahin A, Kırın Y, Arabacı T, Turkoglu I. Karyological Notes on Eight Species of *Achillea* L. (Asteraceae, Santolinoideae) from Turkey. *Bot J Linn Soc* 2006, 151: 573-80.
25. Aksu N, Inceer H, Hayırlıoğlu-Ayaz S. Karyotype analysis of six *Achillea* L. (Asteraceae, Anthemideae) taxa from Turkey. *Caryologia* 2013, 66: 103-8.
26. Kırın Y, Arabaci T, Şahin A, Turkoglu I. Karyological Notes on Another Eight Species of *Achillea* (Asteraceae) from Turkey. *Biologia* 2008, 63: 343-8.
27. Kiran Y, Turkoglu I, Kirilmaz F, Arabaci T, Sahin A, Bagci E. Karyological investigation of six *Achillea* L. (Asteraceae) species growing in Turkey. *Caryologia* 2012, 65: 101-5.
28. Turkoglu S, Akpulat HA. Chromosome numbers, karyotypes and 4C DNA contents of *Achillea sipikorensis* Hausskn. and Bornm. and *Achillea sintenisii* Hub.-Mor. (Asteraceae). *Caryologia* 2004, 57: 244-9.
29. İşcan G, Kırımer N, Kürküoğlu M, Arabacı T, Küpeli E, Başer KHC. Biological Activity and Composition of the Essential Oils of *Achillea schischkinii* Sosn. and *Achillea aleppica* DC. subsp. *aleppica*. *J Agric Food Chem* 2006, 54: 170-3.

30. Azaz AD, Arabacı T, Sangun MK, Yıldız B. Composition and the in vitro Antimicrobial Activities of the Essential Oils of *Achillea wilhelmsii* C.Koch. and *Achillea lycaonica* Boiss. & Heldr. *Asian J Chem* 2008, 20: 1238-44.
31. Azaz AD, Arabacı T, Sangun MK. Essential Oil Composition and Antimicrobial Activities of *Achillea biserrata* M. Bieb. and *Achillea salicifolia* Besser subsp. *salicifolia* Collected in Turkey. *Asian J Chem* 2009, 21: 3193-8.
32. Kucukbay FZ, Kuyumcu E, Gunal S, Arabaci T. Composition and antimicrobial activity of the essential oil of *Achillea formosa* subsp. *amanica*. *Chem Nat Compd* 2011, 47: 300-2.
33. Kucukbay FZ, Kuyumcu E, Arabaci T. The essential oil of *Achillea boissieri*. *Chem Nat Compd* 2010, 46: 824-5.
34. Guo YP, Ehrendorfer F, Samuel R. Phylogeny and systematics of Achille (Asteraceae-Anthemideae) inferre from nrITS and plastid trnL-F DNA sequences. *Taxon* 2004, 53:(3) 657-72.
35. Saukel J, Anchev M, Guo Y-P, Vitkova A, Nedelcheva A, Goranova V, Konakchiev A, Lambrou M, Nejati S, Rauchensteiner F, Ehrendorfer F. Comments on the biosystematics of Achillea (Asteraceae-Anthemideae) in Bulgaria. *Phytologia Balcanica* 2004, 9: 361-400.
36. Baltaş H, Bağda E. Türkiye'de Yayılış Gösteren Bazı *Achillea* L. (Anthemideae, Asteraceae) Taksonlarının Moleküler Karakterizasyonu. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014.
37. Dellaporta SL, Wood J, Hicks JB. A Plant DNA Minipreparation: Version II. *Plant Molecular Biology Reporter* 1983, 1/4: 19.
38. White TJ, Bruns T, Lee S, Taylor JW(eds). Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. In: Innis MA, Gelfand DH, Sninsky JJ, White TJ. *PCR Protocols: a guide to methods and applications*. New York, Academic Press, 1990: 315-22.
39. Sambrook J, Russel DW. Agarose Gel Electrophoresis. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY, USA, 2006.
40. Hall T (2004). BioEdit. Carlsbad, CA, USA: Ibis Biosciences. Web adresi <http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html>. (Erişim tarihi 1 September 2015).
41. Swofford DL. *PAUP 4.0b10: Phylogenetic analysis using parsimony (and other methods)*, Sunderland, Massachusetts, Sinauer Associates, 2002.
42. Campbell NA, Reece JB. Biyoloji. Ankara, Palme Yayıncılık, 2008.

43. Simpson MG. Plant Systematics. Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 2012.
44. Davis PH. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. 5. Edinburgh, Edinburgh University Press1975: 253.



## **EKLER**

### **EK.1. ÖZGEÇMİŞ**

**Ad Soyad** : Gizem UZAY

**Doğum Yeri ve Tarihi:** Malatya, 1992

**Adres** : İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Botanik Abd., MALATYA

**E-Posta** : guzay44@gmail.com

**Lisans** : İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2014.

#### **Eserler Listesi:**

#### **Yayınlar:**


1. Arabacı T., Uzay G., Kelestemur U., Karaaslan MG., Balcioğlu S., Ateş B. Cytotoxicity, Radical Scavenging, Antioxidant Properties and Chemical Composition of the Essential Oil of *Satureja cilicica* P.H. Davis from Turkey. Marmara Pharmaceutical Journal 21/3: (Baskıda), 2017.

#### **Kongre Bildirileri:**

1. Arabacı T., Uzay G., Kelestemur U., Karaaslan MG., Balcioğlu S., Ateş B. Cytotoxicity, Antioxidant and Chemical Composition of the Essential Oil of *Satureja cilicica* P.H. Davis from Turkey. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara University, Faculty of Pharmacy, 09-12 June 2015, Ankara-TURKEY.

## EK.2. ITS nrDNA Dizisinin Veri Matrisi

	10	20	30	40	50	60
A. falcata 2558	GAACCC	TGCAAAGCAG	AACGACCGTGAAACATGTAAAA	CAACCG	AGCGTCGGGTGGA	
A. spinulifolia 2189	.	.	.	A	T	A
A. fraasii 2525	.	.	C	.	.	
A. phrygia 2962	.	.	C	.	A	
A. nobilis subsp. sipylea	.	.	C	.	T	
A. vermicularis 2559	.	.	C	.	SW	
A. sipikorenensis 2206	C.	WG	C	.	T	
A. kotschyi subsp. canescens 2	.	R	C	.	A	
A. salicifolia subsp. salicifo	.	.	C	.	T	
A. monocephala 1584	.	.	C	.	A	
A. crithmifolia 1552	.	.	C	.	T	
A. arabica 1440	.	.	C	.	A	
A. pannonica 2131	.	.	Y	.	Y	
A. magnifica 2958	.	.	C	.	A	
A. clypeolata 1546	.	.	C	.	G	
A. tenuifolia 1427	.	.	C	.	.	
A. ketenoglu 2219	.	.	Y	.	K	
A. milliana 1600	.	.	C	.	.	
A. pseudoaleppica 2244	.	.	C	.	.	
A. armenorum 1968	.	.	C	.	T	A
A. lycaonica 1377a	.	.	C	.	AA	
A. membranacea 1385	.	.	C	.	AT	
A. boissieri 2594	.	.	C	.	.	
A. culculata 2083	.	.	C	.	.	
A. nobilis subsp. neilreichii	.	.	C	.	TA	
A. nobilis subsp. densissima 2	.	.	C	.	T	G
A. gypsicola 1560	.	.	C	.	A	
A. gypsicola 2221	.	.	C	.	A	
A. sivasica 2964	.	.	C	.	A	
A. filipendulina 1625	.	.	C	M	.	A
A. formosa subsp. formosa 2991	.	.	C	.	.	A
A. hamzaoglu 2954	.	.	C	.	.	
A. cappadocica 1567	.	.	C	.	T	A
A. setacea 2133	.	.	C	.	A	
A. gonocephala 2957	.	.	C	.	T	
A. latiloba 1614	.	.	C	.	A	
A. sieheana 1527	.	.	C	.	T	
A. santolinoides subsp. wilhel	.	.	C	.	A	
A. oligocephala 1635	.	.	C	.	AT	
A. schischkinii 2959a	.	.	C	.	K	
A. nobilis subsp. kurdica 1409	.	.	C	.	A	
A. maritima subsp. maritima 19	.	.	C	.	T	
A. grandifolia 2254	.	.	C	.	A	
A. millefolium 1429	.	.	C	.	AT	
A. aleppica subsp. aleppica 13	.	.	C	.	A	G
A. coarctata 2671	.	.	C	.	T	
A. teretifolia 8035	.	.	C	.	A	
A. brachyphylla 15136	.	.	C	.	AW	
A. sintenisii 2080	.	.	C	.	A	
A. biserrata 16676	.	.	C	.	T	
A. aleppica subsp. zederbaueri	.	.	C	.	A	
A. formosa subsp. amanica 2253	.	.	C	.	T	
A. cretica 15634	.	.	A	.	.	



	130	140	150	160	170	180
<i>A. falcata</i> 2558	TATGGACCTCGTGAATGTGTCATTGACGCAATAACAACCCCCGGCACAAATGTGTGCCAAG					S
<i>A. spinulifolia</i> 2189	.....	G				
<i>A. fraasii</i> 2525	.T.	.....				
<i>A. phrygia</i> 2962	.M.	.....	T	.....		S
<i>A. nobilis</i> subsp. <i>sipylea</i>	.T.	.....	G	.....	T	
<i>A. vermicularis</i> 2559	.....	A.Y.	A			
<i>A. sipikorensis</i> 2206	.....					
<i>A. kotschyi</i> subsp. <i>canescens</i> 2	.....					
<i>A. salicifolia</i> subsp. <i>salicifo</i>	.T.	.....	G			
<i>A. monocephala</i> 1584	.....	Y				
<i>A. crithmifolia</i> 1552	.T.	.....	AG			
<i>A. arabica</i> 1440	.....	G				
<i>A. pannonica</i> 2131	.....	S				
<i>A. magnifica</i> 2958	.T.	.....	G			
<i>A. clypeolata</i> 1546	.....	G				
<i>A. tenuifolia</i> 1427	.T.	.....	G			
<i>A. ketenoglui</i> 2219	.....					
<i>A. milliana</i> 1600	.....					
<i>A. pseudoaleppica</i> 2244	R	.....	T			
<i>A. armenorum</i> 1968	.....		K	AC		A
<i>A. lycaonica</i> 1377a	.T.	C	AG			
<i>A. membranacea</i> 1385	.T.	.....		A		C
<i>A. boissieri</i> 2594	.....					M
<i>A. culcullata</i> 2083	.....			T		
<i>A. nobilis</i> subsp. <i>neilreichii</i>	.T.	.....	G			
<i>A. nobilis</i> subsp. <i>densissima</i> 2	.T.	.....	G.G	W	Y	
<i>A. gypsicola</i> 1560	.C.	.....	G	g		
<i>A. gypsicola</i> 2221	.C.	.....	C	G		
<i>A. sivasica</i> 2964	.C.	.....	CT	g		
<i>A. filipendulina</i> 1625	.T.	.....	AG		A	
<i>A. formosa</i> subsp. <i>formosa</i> 2991	.....	T				Y
<i>A. hamzaoglu</i> 2954	.....					A
<i>A. cappadocica</i> 1567	.T.	.....	G			
<i>A. setacea</i> 2133	.T.	.....	G	A		
<i>A. goniocephala</i> 2957	.....					
<i>A. latiloba</i> 1614	.T.	.....	G			
<i>A. sieheana</i> 1527	A	.....	C			
<i>A. santolinoides</i> subsp. <i>wilhel</i>	.T.	.....	AG			
<i>A. oligocephala</i> 1635	.TC	.....		A		
<i>A. schischkinii</i> 2959a	.....					
<i>A. nobilis</i> subsp. <i>kurdica</i> 1409	.T.	.....	G			S
<i>A. maritima</i> subsp. <i>maritima</i> 19	.....			T		
<i>A. grandifolia</i> 2254	.TC	.....	A.G		G	
<i>A. millefolium</i> 1429	.T.	.....	G	A		
<i>A. aleppica</i> subsp. <i>aleppica</i> 13	.....	CT				
<i>A. coarctata</i> 2671	.T.	.....	G.Y		M.R	A
<i>A. teretifolia</i> 8035	.....	T		C		A
<i>A. brachyphylla</i> 15136	.....		A			
<i>A. sintenisii</i> 2080	.....					
<i>A. biserrata</i> 16676	G	.....	T			
<i>A. aleppica</i> subsp. <i>zederbaueri</i>	.....			R		
<i>A. formosa</i> subsp. <i>amanica</i> 2253	.....	T				
<i>A. cretica</i> 15634	.....	T		C		

	190	200	210	220	230	240
<i>A. falcata</i> 2558	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<i>A. spinulifolia</i> 2189	.....	.....	.....	.....	S	Y
<i>A. fraasii</i> 2525	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. phrygia</i> 2962	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. nobilis</i> subsp. <i>sipylea</i>	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. vermicularis</i> 2559	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. sipikorenensis</i> 2206	.....	.....	G	.....	S	.....
<i>A. kotschyi</i> subsp. <i>canescens</i> 2	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. salicifolia</i> subsp. <i>salicifo</i>	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. monocephala</i> 1584	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. crithmifolia</i> 1552	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. arabica</i> 1440	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. pannonica</i> 2131	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. magnifica</i> 2958	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. clypeolata</i> 1546	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. tenuifolia</i> 1427	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. ketenoglu</i> 2219	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. milliana</i> 1600	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. pseudoaleppica</i> 2244	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. armenorum</i> 1968	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. lycaonica</i> 1377a	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. membranacea</i> 1385	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. boissieri</i> 2594	.....	.....	A G	.....	C	.....
<i>A. culculata</i> 2083	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. nobilis</i> subsp. <i>neilreichii</i>	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. nobilis</i> subsp. <i>densissima</i> 2	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. gypsicola</i> 1560	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. gypsicola</i> 2221	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. sivasica</i> 2964	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. filipendulina</i> 1625	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. formosa</i> subsp. <i>formosa</i> 2991	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. hamzaoglu</i> 2954	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. cappadocica</i> 1567	.....	.....	AG	.....	C	.....
<i>A. setacea</i> 2133	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. gonocephala</i> 2957	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. latiloba</i> 1614	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. sieheana</i> 1527	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. santolinoides</i> subsp. <i>wilhel</i>	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. oligocephala</i> 1635	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. schischkinii</i> 2959a	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. nobilis</i> subsp. <i>kurdica</i> 1409	.....	G	.....	.....	.....	.....
<i>A. maritima</i> subsp. <i>maritima</i> 19	.....	.....	W	.....	.....	.....
<i>A. grandifolia</i> 2254	.....	A	.....	T	.....	.....
<i>A. millefolium</i> 1429	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. aleppica</i> subsp. <i>aleppica</i> 13	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. coarctata</i> 2671	.....	R	.....	R Y	.....	.....
<i>A. teretifolia</i> 8035	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. brachyphylla</i> 15136	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. sintenisii</i> 2080	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. biserrata</i> 16676	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. aleppica</i> subsp. <i>zederbaueri</i>	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. formosa</i> subsp. <i>amanica</i> 2253	.....	.....	G	.....	C	.....
<i>A. cretica</i> 15634	.....	.....	G	.....	C	.....

250            260            270            280            290            300

.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|

<i>A. falcata</i> 2558	TATGGCTTTTTTAATT	-ACAAACRACTCTCGGAAACGGWTWTYT	TCGGCTCACGCATYG			
<i>A. spinulifolia</i> 2189	.....	.....	S..M..C.....			
<i>A. fraasii</i> 2525	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. phrygia</i> 2962	CG.....C....	.....	C.....			
<i>A. nobilis</i> subsp. <i>sipylea</i>	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. vermicularis</i> 2559	.G.....C....	.....	M.M..C.....			
<i>A. sipikorensis</i> 2206	.....C....	.....	C.....			
<i>A. kotschyi</i> subsp. <i>canescens</i> 2	.R.....C....	.....	C.....			
<i>A. salicifolia</i> subsp. <i>salicifo</i>	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. monocephala</i> 1584	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. crithmifolia</i> 1552	.G.....C...A..T.Y	.....	C.....			
<i>A. arabica</i> 1440	.....C....	.....	C.....			
<i>A. pannonica</i> 2131	.G.....C...W	.....	C.....			
<i>A. magnifica</i> 2958	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. clypeolata</i> 1546	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. tenuifolia</i> 1427	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. ketenoglui</i> 2219	.G.....C....C	.....	C.....			
<i>A. milliana</i> 1600	.....C....	.....	C.....			
<i>A. pseudoaleppica</i> 2244	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. armenorum</i> 1968	.G.....C....T.T	.....	CWM.....			
<i>A. lycaonica</i> 1377a	.G.....C...A..T.T	.....	C.....			
<i>A. membranacea</i> 1385	.G.....C....T	.....	C.....			
<i>A. boissieri</i> 2594	.....C....	.....	C.....			
<i>A. culculata</i> 2083	.....C....	.....	C.....			
<i>A. nobilis</i> subsp. <i>neilreichii</i>	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. nobilis</i> subsp. <i>densisima</i> 2	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. gypsicola</i> 1560	CG.....C...A..C	.....	C.....			
<i>A. gypsicola</i> 2221	CG.....C....	.....	C.....			
<i>A. sivasica</i> 2964	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. filipendulina</i> 1625	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. formosa</i> subsp. <i>formosa</i> 2991	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. hamzaoglu</i> 2954	.....C....T	.....	C.....			
<i>A. cappadocica</i> 1567	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. setacea</i> 2133	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. gonocephala</i> 2957	.....C....	.....	C.....			
<i>A. latiloba</i> 1614	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. sieheana</i> 1527	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. santolinoides</i> subsp. <i>wilhel</i>	.G.....C...A..T.T	.....	C.....			
<i>A. oligocephala</i> 1635	.G.....C....T	.....	C.....			
<i>A. schischkinii</i> 2959a	.....C....	.....	C.....			
<i>A. nobilis</i> subsp. <i>kurdica</i> 1409	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. maritima</i> subsp. <i>maritima</i> 19	.G.....C...A....	.....	C.....			
<i>A. grandifolia</i> 2254	CG.....C...A..C	.....	C.....			
<i>A. millefolium</i> 1429	.G.....C....	.....	C.....			.C
<i>A. aleppica</i> subsp. <i>aleppica</i> 13	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. coarctata</i> 2671	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. teretifolia</i> 8035	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. brachyphylla</i> 15136	.G.....C....C..YT	.....	C.....			
<i>A. sintenisii</i> 2080	.....C....	.....	C.....			
<i>A. biserrata</i> 16676	.G.....C....	.....	C.....			
<i>A. aleppica</i> subsp. <i>zederbaueri</i>	CG.....C....T	.....	C.....			
<i>A. formosa</i> subsp. <i>amanica</i> 2253	.GW.....C....	.....	C.....			
<i>A. cretica</i> 15634	.G.....C....	.....	C.....			

	310	320	330	340	350	360
A. falcata 2558	ATGAA	R	AAMGTAGCAA	ATGGSGATACTTGGTGKGAATTGCAGAATCCC	GGGAACC	ATCGA
A. spinulifolia 2189	.	.	.	.	T	S
A. fraasii 2525	.	.	.	.	T	.
A. phrygia 2962	.	.	.	.	T	.
A. nobilis subsp. <i>sipylea</i>	.	.	.	.	T	.
A. vermicularis 2559	.	.	.	.	T	.
A. <i>sipikorensis</i> 2206	.	.	.	.	T	.
A. <i>kotschy</i> subsp. <i>canescens</i> 2	.	.	.	.	T	.
A. <i>salicifolia</i> subsp. <i>salicifo</i>	.	.	.	.	T	.
A. <i>monocephala</i> 1584	.	.	.	.	T	K.
A. <i>crithmifolia</i> 1552	.	.	.	.	T	.
A. <i>arabica</i> 1440	.	.	.	.	T	.
A. <i>pannonica</i> 2131	.	.	.	.	T	.
A. <i>magnifica</i> 2958	.	.	.	.	W	.
A. <i>clypeolata</i> 1546	.	.	.	.	T	.
A. <i>tenuifolia</i> 1427	.	.	.	.	T	.
A. <i>ketenoglu</i> 2219	.	.	.	.	T	.
A. <i>milliana</i> 1600	.	.	.	.	T	.
A. <i>pseudoaleppica</i> 2244	.	.	.	.	T	.
A. <i>armenorum</i> 1968	.	.	.	.	T	.
A. <i>lycaonica</i> 1377a	.	.	.	.	T	.
A. <i>membranacea</i> 1385	.	.	.	.	T	.
A. <i>boissieri</i> 2594	.	.	.	.	T	.
A. <i>culcullata</i> 2083	.	.	.	.	T	.
A. <i>nobilis</i> subsp. <i>neilreichii</i>	.	.	.	.	T	.
A. <i>nobilis</i> subsp. <i>densissima</i> 2	.	.	.	.	T	.
A. <i>gypsicola</i> 1560	.	.	.	.	T	.
A. <i>gypsicola</i> 2221	.	.	.	.	T	.
A. <i>sivasica</i> 2964	.	.	.	.	T	.
A. <i>filipendulina</i> 1625	.	.	.	.	T	.
A. <i>formosa</i> subsp. <i>formosa</i> 2991	.	.	.	.	T	.
A. <i>hamzaoglu</i> 2954	.	.	.	.	T	.
A. <i>cappadocica</i> 1567	.	.	.	.	T	.
A. <i>setacea</i> 2133	.	.	.	.	T	.
A. <i>goniocephala</i> 2957	.	.	.	.	T	.
A. <i>latiloba</i> 1614	.	.	.	.	T	.
A. <i>sieheana</i> 1527	.	.	T.	.	T	.
A. <i>santolinoides</i> subsp. <i>wilhel</i>	.	.	.	.	T	.
A. <i>oligocephala</i> 1635	.	.	.	.	T	.
A. <i>schischkinii</i> 2959a	.	.	.	.	T	.
A. <i>nobilis</i> subsp. <i>kurdica</i> 1409	.	.	Y.	.	T	.
A. <i>maritima</i> subsp. <i>maritima</i> 19	.	.	.	Y.	T	.
A. <i>grandifolia</i> 2254	.	.	.	.	T	.
A. <i>millefolium</i> 1429	.	.	.	T.	W	.
A. <i>aleppica</i> subsp. <i>aleppica</i> 13	.	.	.	.	T	.
A. <i>coarctata</i> 2671	.	.	K.	KY.	W	.
A. <i>teretifolia</i> 8035	.	.	.	.	T	.
A. <i>brachyphylla</i> 15136	.	.	.	.	T	.
A. <i>sintenisii</i> 2080	.	.	.	.	T	.
A. <i>biserrata</i> 16676	.	.	.	.	T	.
A. <i>aleppica</i> subsp. <i>zederbaueri</i>	.	.	.	.	T	.
A. <i>formosa</i> subsp. <i>amanica</i> 2253	.	.	.	.	T	.
A. <i>cretica</i> 15634	.	.	.	.	T	.

	370	380	390	400	410	420
A. falcata 2558	GTTTTTGAAACGCAAGTTGC	GGCCCCGAAACCTTTGGCC	MAGGGCMCGTCYGCCTGGGCGTC		K K	
A. spinulifolia 2189	.....	.....	G		G	
A. fraasii 2525	.....	.....	G		G	
A. phrygia 2962	.....	.....	G		G	
A. nobilis subsp. sipylea	.....	.....	G		G	
A. vermicularis 2559	.....	.....	G		G	
A. sipikorensis 2206	.....	.....	G		G	
A. kotschyi subsp. canescens 2	.....	.....	G		G	
A. salicifolia subsp. salicifo	.....	.....	G		G	
A. monocephala 1584	.....	.....	G		G	
A. crithmifolia 1552	.....	.....	G	TG		
A. arabica 1440	.....	.....	G		G	
A. pannonica 2131	.....	.....	G		G	
A. magnifica 2958	.....	.....	G		G	
A. clypeolata 1546	.....	.....	G		G	
A. tenuifolia 1427	.....	.....	G		G	
A. ketenoglu 2219	.....	.....	G		G	
A. milliana 1600	.....	.....	G		G	
A. pseudoaleppica 2244	.....	.....	G		G	
A. armenorum 1968	.....	.....	G		G	
A. lycaonica 1377a	.....	.....	G	TG		
A. membranacea 1385	.....	.....	G		G	
A. boissieri 2594	.....	.....	G		G	
A. culculata 2083	.....	.....	G		G	
A. nobilis subsp. neilreichii	.....	.....	G		G	
A. nobilis subsp. densissima 2	.....	.....	G		G	
A. gypsicola 1560	.....	.....	G		G	
A. gypsicola 2221	.....	.....	G		G	
A. sivasica 2964	.....	.....	G		G	
A. filipendulina 1625	.....	.....	G		G	
A. formosa subsp. formosa 2991	.....	.....	G	TG		
A. hamzaoglu 2954	.....	.....	G		G	
A. cappadocica 1567	.....	.....	G		G	
A. setacea 2133	.....	.....	G		G	
A. gonocephala 2957	.....	.....	G		G	
A. latiloba 1614	.....	.....	G		G	
A. sieheana 1527	.....	.....	G		G	
A. santolinoides subsp. wilhel	.....	.....	G	TG		
A. oligocephala 1635	.....	.....	G		G	
A. schischkinii 2959a	.....	.....	G		G	
A. nobilis subsp. kurdica 1409	.....	S	G		G	
A. maritima subsp. maritima 19	.....	R	G		G	
A. grandifolia 2254	.....	.....	G		G	
A. millefolium 1429	.....	T	G		G	
A. aleppica subsp. aleppica 13	.....	R	G	TG R		
A. coarctata 2671	.....	G	G		G	
A. teretifolia 8035	.....	.....	G		G	
A. brachyphylla 15136	.....	.....	G	TG		
A. sintenisii 2080	.....	.....	G		G	
A. biserrata 16676	.....	.....	G		G	
A. aleppica subsp. zederbaueri	.....	.....	G		G	
A. formosa subsp. amanica 2253	.....	.....	G	TG		
A. cretica 15634	.....	.....	G	TG		

Sequence alignment showing the conservation of the sequence **AMGCATTCGCGT CGCCCCAAACAAATYTCTGT** across various *Acer* species. The alignment is plotted against positions 430 to 480.

The reference sequence is **AMGCATTCGCGT CGCCCCAAACAAATYTCTGT**. Other species are represented by dotted lines, with colored letters indicating mutations:

- Red letters:** T at position 470.
- Green letters:** G at position 450, A at position 440, A at position 430.
- Blue letters:** M at position 430, A at position 440, T at position 450, T at position 470.
- Purple letters:** M at position 430.
- Black letters:** K at position 430, S at position 440, C at position 450, Y at position 470.

Species listed on the left include: *falcata*, *spinulifolia*, *fraasii*, *phrygia*, *nobilis* subsp. *sipylea*, *vermicularis*, *sipikorensis*, *kotschyi* subsp. *canescens*, *salicifolia* subsp. *salicifo*, *monocephala*, *crithmifolia*, *arabica*, *pannonica*, *magnifica*, *clypeolata*, *tenuifolia*, *ketenoglu*, *milliana*, *pseudoalepica*, *armenorum*, *lycaonica*, *membranacea*, *boissieri*, *culcullata*, *nobilis* subsp. *neilreichii*, *nobilis* subsp. *densissima*, *gypsicola*, *gypsicola*, *sivasica*, *filipendulina*, *formosa* subsp. *formosa*, *hamzaoglu*, *cappadocica*, *setacea*, *goniocephala*, *latiloba*, *sieheana*, *santolinoides* subsp. *wilhel*, *oligocephala*, *schischkinii*, *nobilis* subsp. *kurdica*, *maritima* subsp. *maritima*, *grandifolia*, *millefolium*, *aleppica* subsp. *aleppica*, *coarctata*, *teretifolia*, *brachyphylla*, *sintenisii*, *biserrata*, *aleppica* subsp. *zederbaueri*, *formosa* subsp. *amanica*, and *cretica*.

	490	500	510	520	530
<i>A. falcata</i> 2558	TTGGTCTCCCGKGCTCATGGTGKGGTTGGCCAAAATAGAAGTC	TG	RG	S	
<i>A. spinulifolia</i> 2189	C	AG			
<i>A. fraasii</i> 2525	C	G			
<i>A. phrygia</i> 2962	C	AG			
<i>A. nobilis</i> subsp. <i>sipylea</i>	C	G	T	Y	T
<i>A. vermicularis</i> 2559	C	G			
<i>A. sikokorensis</i> 2206	C	G			
<i>A. kotschyi</i> subsp. <i>canescens</i> 2	C	G			
<i>A. salicifolia</i> subsp. <i>salicifo</i>	C	G			
<i>A. monocephala</i> 1584	C	G			
<i>A. crithmifolia</i> 1552	C	G	R		C
<i>A. arabica</i> 1440	C	G			
<i>A. pannonica</i> 2131	C	G			
<i>A. magnifica</i> 2958	C	G			
<i>A. clypeolata</i> 1546	C	G			
<i>A. tenuifolia</i> 1427	C	G			
<i>A. ketenoglui</i> 2219	C	G			
<i>A. milliana</i> 1600	C	G			
<i>A. pseudoalepica</i> 2244	C	G			
<i>A. armenorum</i> 1968	C	G			
<i>A. lycaonica</i> 1377a	C	G			
<i>A. membranacea</i> 1385	C	TG			
<i>A. boissieri</i> 2594	C	G			
<i>A. culcullata</i> 2083	C	G			
<i>A. nobilis</i> subsp. <i>neilreichii</i>	C	G			
<i>A. nobilis</i> subsp. <i>densissima</i> 2	C	AG			G
<i>A. gypsicola</i> 1560	C	G			
<i>A. gypsicola</i> 2221	C	G			
<i>A. sivasica</i> 2964	C	G			
<i>A. filipendulina</i> 1625	C	G			
<i>A. formosa</i> subsp. <i>formosa</i> 2991	C	G			AG
<i>A. hamzaoglu</i> 2954	C	G	A		
<i>A. cappadocica</i> 1567	C	G			
<i>A. setacea</i> 2133	C	AG			
<i>A. goniocephala</i> 2957	C	G			
<i>A. latiloba</i> 1614	C	G			
<i>A. sieheana</i> 1527	C	G			A
<i>A. santolinoides</i> subsp. <i>wilhel</i>	C	G			C
<i>A. oligocephala</i> 1635	K	TG	A		
<i>A. schischkinii</i> 2959a	C	G	A		
<i>A. nobilis</i> subsp. <i>kurdica</i> 1409	Y	M	RGT		
<i>A. maritima</i> subsp. <i>maritima</i> 19	T	C.T	G		
<i>A. grandifolia</i> 2254	C	G			
<i>A. millefolium</i> 1429		AR			
<i>A. aleppica</i> subsp. <i>aleppica</i> 13		TG			
<i>A. coarctata</i> 2671	T	MC	TA		
<i>A. teretifolia</i> 8035	Y		G		
<i>A. brachyphylla</i> 15136	C	G			
<i>A. sintenisii</i> 2080		G			
<i>A. biserrata</i> 16676		G			
<i>A. aleppica</i> subsp. <i>zederbaueri</i>		AGC			
<i>A. formosa</i> subsp. <i>amanica</i> 2253		G			
<i>A. cretica</i> 15634					

### **EK.3.Etik Kurul Onayı Gerekmediğine Dair Yazı**

Çalışma konusunu Bitki Materyali oluşturduğundan dolayı Resmi Gazetenin 13 Nisan 2013 tarih ve 28617 sayılı “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte” belirtilen Etik Kurul Onay Belgesine gerek bulunmamaktadır.

