

T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNE ULAŞIM YOLLARI, PSİKIYATRI HASTALARININ AİLE
HEKİMLİĞİ UYGULAMASINI KULLANIMI VE AİLE HEKİMİ ALGISI

Dr. Elif Hilal ÜNVERDİ
UZMANLIK TEZİ

TEZ DANIŞMANI
Prof. Dr. Cengiz KILIÇ

ANKARA
2019

T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNE ULAŞIM YOLLARI, PSİKIYATRI HASTALARININ AİLE
HEKİMLİĞİ UYGULAMASINI KULLANIMI VE AİLE HEKİMİ ALGISI

Dr. Elif Hilal ÜNVERDİ
UZMANLIK TEZİ

TEZ DANIŞMANI
Prof. Dr. Cengiz KILIÇ

ANKARA
2019

TEŐEKKÜR

Birlikte alıřmaktan onur duyduėum tez danıřmanım Sayın Prof. Dr. Cengiz Kılı'a sonsuz teőekkür ve saygılarımı sunarım.

Desteklerini ve ilgisini bizden esirgemeyen Aile Hekimliėi Anabilim Dalı Bařkanı Sayın Mustafa Cankurtaran'a sonsuz teőekkür ve saygılarımı sunarım.

Her konuda özveriyle yardımcı olan Aile Hekimliėi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Dr. Öğr. Üyesi Duygu Ayhan Bařer'e sonsuz teőekkür ederim.

Tezimin bařından sonuna kadar bana verdiėi büyük destek için bařta sevgili arkadařım Dr. Özge Mıhçı olmak üzere bölümümüzdeki tüm asistan arkadařlarıma teőekkür ederim.

Arařtırmam sürecinde birlikte alıřtıėım tüm psikiyatri asistanı arkadařlarıma yardımları ve gösterdikleri samimiyet için teőekkür ederim.

Kliniklerinde alıřma fırsatı verdikleri, misafirperverlikleri ve ilgileri için Sayın Prof.Dr.Sibel Örsel'e teőekkür ederim.

Varlıklarından güç aldıėım sevgili annem, babam ve kardeřime sonsuz teőekkür ederim.

Elif.

ÖZET

ÜNVERDİ EH, Ruh Sağlığı Hizmetlerine Ulaşım Yolları, Psikiyatri Hastalarının Aile Hekimliği Uygulamasını Kullanımı ve Aile Hekimi Algısı, Hacettepe Üniversitesi, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi, Ankara 2019.

Ruhsal hastalıklar dünya çapında engelliliğin, yeti yitiminin, iş gücü kaybının başlıca nedenlerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 2006 yılında yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sağlığı Politikası metnine göre, ruh sağlığı hizmetlerinin toplum temelli olması, genel sağlık sistemine ve birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre edilmesi kararlaştırılmıştır. Çalışmamızın temel amacı hastaların, ruh sağlığı hizmetlerine ulaşım yollarını, bu ulaşım yolunda aile hekimliği uygulamasını ne oranda kullandıklarını incelemek ve hastaların aile hekimlerinin ruhsal ve bedensel hastalıkların tedavisi konusunda yetkinlikleriyle ilgili algılarını değerlendirmektir. Çalışmamız tanımlayıcı gözlemsel tipte bir çalışma olup Ocak 2018 ve Ağustos 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği (HÜTF) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'ne (DYBEAH) başvurmuş 265 hastanın katılımıyla gerçekleşmiştir. Hastaların ruhsal bir şikayetle ilk başvurusunda en küçük payı alan grup aile hekimleri olmuştur (%6.8). Hastalarımızın büyük çoğunluğu (%54.5) doğrudan psikiyatriste ulaşmaktadır. Hastanın tanısının ne olduğu aile hekimine başvuruyu etkilemektedir: ilk başvuru noktası olarak aile hekimine başvurma anksiyete bozukluklarında diğer tanı gruplarına göre daha fazladır. Ruhsal hastalık tanısı aldıktan sonra ise aile hekimine başvuru yüksek orandadır. Hastaların çoğu (%76) bedensel hastalığı için aile hekimine başvurmaktadır. Ruhsal hastalık tanısı aldıktan sonra, şizofrenisi olan hastalar arasında aile hekimine "psikiyatrik ilaçları yazdırmak için gitme", anksiyete bozuklukları grubu hastalarda "ruhsal hastalığı hakkında danışmanlık almak için gitme" diğer gruplardan daha fazla bildirilmiştir. Aile hekiminin ruhsal hastalıklarla ilgili bilgisini yeterli bulan hastaların, ruhsal sorunlar için ilk olarak aile hekimine

başvurma ihtimali artmaktadır. Aile hekimine başvurunun tedavi başvurusunda gecikmeye yol açmadığı saptanmıştır. Hastaların büyük çoğunluğu aile hekiminin bedensel hastalıklar konusundaki mesleki becerisini iyi bulurken, büyük çoğunluğunun aile hekimlerinin ruhsal hastalık becerisi hakkında fikri yoktur.

Anahtar kelimeler: birinci basamak, ruh sağlığı hizmetleri, ulaşım yolları, gecikme



ABSTRACT

ÜNVERDİ EH, Pathways to Mental Health Care and Utilization of Primary Care Services, and Patients Thoughts About Family Physicians' Professional Skills, Hacettepe University, Thesis in Family Medicine, Ankara 2019.

Mental disorders are the leading causes of disability, worldwide. The Mental Health Policy Act, issued in 2006 by the Ministry of Health, advised that mental services need to be community-based, and integrated with primary care services. The main aim of our study was to examine the pathways to mental health care and the role of family physicians in this process. We also wanted to learn opinions and attitudes of patients about the competence levels of family physicians in treating mental and physical disorders. This study was conducted between January 2018 and August 2018 with 265 participants. The family physicians were the least likely to be the first point of contact for psychological problems (%6.8); most of the patients (%54.5) contacted a mental health specialist directly. Psychiatric diagnosis had an effect on the choice of type of doctor for the first contact: anxiety patients attend family physicians as first contact more often compared to patients with other diagnoses. Once the psychiatric diagnosis is established, contact with family physicians is common: most patients go to their family physician for physical symptoms. Schizophrenic patients go for refills, whereas anxiety patients go to their family physician for counselling more often than others. Patients who see FPs as competent for treating mental patients tend to choose FPs as the first point of contact more often than others. There were no differences in delay to treatment among patients who contacted different carers as first contact. The majority of patients thinks family physicians to be more capable about physical disorders, the majority of patients don't have any idea about family physicians ability to manage mental disorders.

Key words: *primary care, mental health services, pathways to care, delay*

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|----|
| TEŞEKKÜR..... | 4 |
| ÖZET..... | 5 |
| ABSTRACT..... | 7 |
| İÇİNDEKİLER..... | 8 |
| SİMGELER VE KISALTMALAR..... | 10 |
| ŞEKİLLER..... | 11 |
| TABLolar..... | 12 |
| 1. GİRİŞ..... | 15 |
| 2. GENEL BİLGİLER..... | 17 |
| 2.1. Ruh Sağlığı Tanımı, Ruhsal Hastalıkların Yaygınlığı ve Küresel Ruhsal Hastalık Yüğü | 17 |
| 2.2. Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Organizasyonu..... | 19 |
| 2.3. Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Birinci Basamağın Önemi ve Dünyadaki Mevcut Durumu | 22 |
| 2.4. Ruh Sağlığı Hizmetlerine Ulaşım Yolları..... | 24 |
| 2.5. Ruhsal Hastalıklarda Doktora Başvuruda Gecikme | 26 |
| 2.6. Ruhsal Hastalığı Olan Hastaların Aile Hekimi Algısı..... | 27 |
| 3. GEREÇ VE YÖNTEM..... | 29 |
| 3.1. Çalışmanın Yapıldığı Yer ve Hasta Seçimi | 29 |
| 3.2. Uygulama | 30 |
| 3.3. Veri Toplama Aracı..... | 30 |
| 3.4. İstatistiksel Analiz | 31 |
| 3.5. Analize Katılan Değişkenlerin Seçilmesi ve Oluşturulması..... | 32 |
| 3.5.1 Tanılar | 32 |
| 3.5.2 Tedaviler | 32 |
| 3.5.4 Aile hekimi, Ruh Sağlığı Uzmanı ve Damgalama ile İlgili Tutum ve Yargılar | 33 |
| 3.6 Etik Kurul Onayı..... | 33 |
| 4. BULGULAR | 34 |
| 4.1. Hastaların Sosyodemografik Özellikleri | 34 |
| 4.1.1 İki Araştırma Merkezinin Karşılaştırılması | 36 |
| 4.1.2. Son Bir Yılda Aile Hekimine Başvuranlar ve Başvurmayanların Karşılaştırılması | 38 |
| 4.1.3 Kadın ve Erkek Hastaların Karşılaştırılması | 40 |
| 4.2. Hastaların Ruhsal Hastalık Tanıları..... | 42 |

| | |
|--|-----------|
| 4.3. Ruhsal Şikayet Nedeniyle İlk Başvurulan Tedavici | 43 |
| 4.4. Şifacılar Başvuru | 53 |
| 4.5. Psikiyatri Hastalarının Aile Hekimliği Uygulamasını Kullanım Durumları | 53 |
| 4.6. Psikiyatri Hastalarının Aile Hekiminin Mesleki Becerisi Hakkındaki Düşünceleri | 55 |
| 4.7. Psikiyatri Hastalarının Aile Hekimi Algısı | 56 |
| 5. TARTIŞMA | 64 |
| 5.1. Örneklemin Özellikleri | 64 |
| 5.2. Hastaların Ruh Sağlığı Hizmetlerine Ulaşım Yolları | 66 |
| 5.3. Ruhsal Hastalıklarda Doktora Başvuruda Gecikme | 69 |
| 5.4. Psikiyatri Hastalarının Aile Hekimliği Uygulamasını Kullanım Durumları | 72 |
| 5.5 Psikiyatri Hastalarının Aile Hekimi Hakkında Tutum ve Yargıları | 73 |
| 6.SONUÇ VE ÖNERİLER | 74 |
| 7.KAYNAKÇA | 76 |
| 8.EKLER | |
| 8.1. Anket Formu | |
| 8.2. Etik Kurul Onayı | |

SİMGELER VE KISALTMALAR

AH: Aile Hekimi

ANK: Anksiyete Bozuklukları

BAB: Bipolar afektif bozukluk

BU: Başka Uzman

CIDI: Composite International Diagnostic Interview

DALY: Disability Adjusted Life Years

DEP: Depresyon

DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü

DŞ: Dini şifacı

DYBEAH: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HÜTF: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

KW: Kruskal-Wallis

MWU: Mann-Whitney U

PSK: Psikiyatri

ŞİZ: Şizofreni

TOP: Toplam

YLD: Years Lived with Disability

ŞEKİLLER

Şekil 2.1. DSÖ'ne Göre Optimal Ruh Sağlığı Hizmetleri Organizasyonu.....

Şekil 4.1. Ruhsal Şikayeti Olan Hastaların Psikiyatriye Ulaşım Yolu.....

Şekil 4.2. Ruhsal Şikayet İçin Doktora Başvurudaki Gecikmeler.....

Şekil 4.3. Ruhsal Hastalık Tanılarına Göre Gecikme Süresi.....



TABLULAR

Tablo 4.1. Hastaların Sosyodemografik Özellikleri

Tablo 4.2. Hastanelere Hastaların Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Tablo 4.3. Son Bir Yılda Aile Hekimine Başvurusu Olanlar ve Olmayanların Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Tablo 4.4. Kadın ve Erkek Hastaların Karşılaştırılması

Tablo 4.5. Ruhsal Hastalık Tanılarının Araştırma Merkezlerine Göre Dağılımı

Tablo 4.6. Ruhsal Hastalık Tanılarının Cinsiyetlere Göre Dağılımı

Tablo 4.7. Araştırma Merkezlerinin İlk Başvurulan Tedavici Açısından Karşılaştırılması

Tablo 4.8. Kadın ve Erkek Hastalarının İlk Başvurulan Tedavici Açısından Karşılaştırılması

Tablo 4.9. İlk Başvurulan Tedaviciye Göre Ruhsal Hastalık Tanılarının Karşılaştırılması

Tablo 4.10. Araştırma Merkezleri, Cinsiyet ve Ruhsal Hastalık Tanılarının Başvuruda Gecikme Açısından Karşılaştırılması

Tablo 4.11. Hastaların Bildirdiği Gecikme Nedenleri

Tablo 4.12. Aile Hekiminden Alınan Hizmetlerin Hastalık Tanı Grupları Arasında Karşılaştırılması

Tablo 4.13. Aile Hekimleriyle İlgili Tutum ve Yargıların Araştırma Merkezleri Arasında Karşılaştırılması

Tablo 4.14. Aile Hekimleriyle İlgili Tutum ve Yargıların Kadınlar ve Erkekler Arasında Karşılaştırılması

Tablo 4.15. Aile Hekimleriyle İlgili Tutum ve Yargıların Hastalık Tanıları Arasında Karşılaştırılması

Tablo 4.16. Ruh Sağlığı Uzmanı ile İlgili Önermelerin Araştırma Merkezleri Arasında Karşılaştırılması

Tablo 4.17. Ruh Sağlığı Uzmanı ile İlgili Önermelerin Kadınlar ve Erkekler Arasında Karşılaştırılması

Tablo 4.18. Ruh Sağlığı Uzmanı ile İlgili Önermelerin Ruhsal Hastalık Tanıları Arasında Karşılaştırılması

Tablo 4.19. Damgalama ile İlgili Önermelerin Araştırma Merkezleri Arasında Karşılaştırılması

Tablo 4.20. Damgalama ile İlgili Önermelerin Kadınlar ve Erkekler Arasında Karşılaştırılması

Tablo 4.21. Damgalama ile İlgili Önermelerin Ruhsal Hastalık Tanıları Arasında Karşılaştırılması



1. GİRİŞ

Ruhsal hastalıklar dünya çapında engelliliğin, yeti yitiminin, iş gücü kaybının başlıca nedenlerinden biridir (1). 2010 yılında yapılan uluslararası "Küresel Hastalık Yüğü" çalışmasında ruhsal hastalıklar için hesaplanan "Yeti Yitimine Ayarlanmış Yaşam Yılı (Disability Adjusted Life Years; DALY)" oranı %7.4'tür (Bir DALY, yaşamdan kaybedilmiş bir sağlıklı yıl anlamına gelmektedir) (2). "Türkiye Ruh Sağlığı Profili" çalışması Türkiye'de ruhsal hastalıkların yaygınlığı hakkında bilgi vermektedir. Bu çalışmaya göre Türkiye'de erişkin nüfusun yaklaşık %18'inde herhangi bir ruhsal hastalık bulunmaktadır. Bu bulgular dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de ruhsal hastalıkların yaygın olduğunu göstermektedir (3). Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 2006 yılında yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sağlığı Politikası metninde, ruh sağlığı hizmetlerinin toplum temelli olması, genel sağlık sistemine ve birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre edilmesi, toplum temelli rehabilitasyon çalışmalarının yapılması, ruh sağlığı hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ruh sağlığı alanı ile ilgili yasaların çıkarılması, damgalamaya karşı hasta haklarının savunulması, ruh sağlığı alanında eğitim, araştırma ve insan gücünün arttırılması hedefleri yer almaktadır (4). Ruh sağlığı politika metninin yayımlanmasından sonra, toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerine geçileceğinin ifade edildiği bir "Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı" (2011) oluşturulmuştur. Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı'nda Türkiye'de 2010 yılı sonu itibariyle tüm illerde aile hekimliği uygulamasına geçildiği, ruh sağlığı hizmetlerinin sunumunun da bu yeni modele uygun hale getirilmesi gerektiği, aile hekimliği uygulamasında hekim-hasta ilişkisinin daha uzun süreli ve yakın olması nedeniyle ruh sağlığı hastalarına hizmetin birinci basamakta verilmeye başlanması ve gerek olduğunda ikinci veya üçüncü basamağa sevkinin daha uygun olduğu açıklanmıştır. Gelecekte evde sağlık hizmetleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, toplum temelli madde bağımlılığı tedavi merkezleri, gençlik evleri ve toplum merkezleri uygulamalarının yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Bu merkezlerin aile hekimleri ile eşgüdüm içinde çalışmaları gerektiği açıktır (5).

Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar, ruhsal hastalıklar nedeniyle pratisyen hekimlere başvurunun; psikiyatriye doğrudan başvuru ve diğer uzmanlıklara başvurudan çok daha az olduğunu göstermiştir (3,6). Aile Hekimliği uygulamasına geçildikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan çalışmada ise ruhsal sorunlar nedeni ile ilk başvurusunu aile hekimine yapanların oranı %3.8, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan çalışmada ise %4.4 bulunmuştur (7,8). Ruhsal hastalıkların birinci basamakta tanısının ve tedavisinin öngörülüyor olmasına karşılık başvuru oranları beklenenden düşüktür. Bu durumun nedenlerini araştıran kapsamlı çalışmalar henüz yapılmamıştır.

Çalışmamızın temel amacı, ruhsal şikayetleri olan hastaların ruh sağlığı hizmetlerine nasıl ulaştıklarını araştırmaktır. Bu amaçla üçüncü basamak psikiyatri polikliniğine başvurmuş olan hastaların, bu hizmete ulaşım yolları, bu ulaşım yolunda aile hekimliği uygulamasını ne oranda kullandıkları incelenecek, ayrıca hastaların aile hekimlerinin ruhsal ve bedensel hastalıkların tedavisi konusunda yetkinlikleriyle ilgili algıları değerlendirilecektir.

2. GENEL BİLGİLER

2.1. Ruh Sağlığı Tanımı, Ruhsal Hastalıkların Yaygınlığı ve Küresel Ruhsal Hastalık Yüğü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlıklı olma halini, yalnızca hasta olmama hali değil, fiziksel, ruhsal ve toplumsal tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır (9). Ruh sağlığı kavramı kişinin kendini iyi hissetmesi, kendine yetebilmesi, entelektüel ve duygusal potansiyelinin farkında olması, nesiller arası bağıllık ve iletişim ögelerini içerir. Aynı zamanda, bireylerin yeteneklerini tanımaları, günlük streslerle başa çıkabilmeleri, üretken bir şekilde çalışabilmeleri ve topluma katkıda bulunabilmelerini kapsayan bir iyilik hali olarak tanımlanmıştır (10).

Ruhsal hastalıklar;

- Düşük özgüven, yetersiz bilişsel ve duygusal kapasite gibi bireysel özelliklere,

-İletişim sorunları, bedensel hastalıklar, madde kullanımı, yalnızlık, yakın birinin ölmesi, ihmal edilme, ailede huzursuzluk, şiddete ve istismara maruz kalma, yoksulluk, okulda veya işte başarısızlık, işsizlik gibi sosyal olaylara ve koşullara,

-Temel hizmetlere ulaşmada güçlük, adaletsizliğe, ayrımcılığa, sosyal eşitsizliğe ve cinsiyet eşitsizliğine uğrama, savaş veya doğal felaketlere maruz kalma gibi çevresel şartlara bağılı olarak ortaya çıkabilir (11). Bu nedenle yoksullar, evsizler, işsizler, düşük eğitimli kişiler, şiddet mağdurları, göçmenler ve mülteciler, çocuklar ve ergenler, istismara uğramış kadınlar ve ihmal edilen yaşlıların ruhsal hastalıklara yakalanma riski daha yüksektir (12). Toplumdaki savunmasız gruplarda ruhsal hastalığa yakalanma riski daha yüksek olsa da ruhsal hastalıklar cinsiyet, yaş, sosyoekonomik durum, yaşanan bölge ve ülke ayrımı olmaksızın tüm toplumlarda yaygın görülen hastalıklardır (13).

DSÖ'nün raporuna göre dünya genelinde yaklaşık 450 milyon kişinin ruhsal hastalığı olduğu tahmin edilmektedir. Erişkinlerin yaklaşık %10'unun mevcut bir ruhsal hastalığı vardır ve %25'i hayatları boyunca bir ruhsal hastalık geçirecektir (13).

Yapılan geniş çaplı epidemiyolojik arařtırmalarda ruhsal hastalıkların sanıldığından çok daha yaygın olduđu görölmüřtür. Hayat boyu ruhsal hastalıklara yakalanma riski ölkeler arasında deęişiklik göstermektedir. "World Mental Health" çalıřmasına katılan Kolombiya, Fransa, Yeni Zelanda, Ukrayna ve Amerika Birleřik Devletleri'nde her üç kiřiden birinde; Belçika, Hollanda, Lübnan, Meksika, Hollanda, Güney Afrika'da her dört kiřiden birinde; İsrail, İtalya, Japonya ve İspanya'da ise altı kiřiden birinde bir ruhsal hastalık görölmektedir (14).

Ölkemizde günümüze kadar yapılmıř olan en geniş çaplı epidemiyolojik çalıřma 1998 yılında yapılan "Türkiye Ruh Saęlığı Profili" çalıřmasıdır. Bu çalıřma tüm toplumu temsil eden 7479 kiřiyle yapılmıřtır. Çalıřmaya katılan kiřiler evlerinde ziyaret edilerek bu kiřilere "Uluslararası Bileřik Tanı Görüşmesi" (Composite International Diagnostic Interview-CIDI) uygulanmıřtır. Bu görüşmeyle, depresif nöbet, distimi, kısa yineleyici depresyon, agorafobi, yaygın bunaltı bozukluđu, panik bozukluđu, sosyal fobi, özgül fobi, obsesif kompulsif bozukluk, anoreksiya nevroza, bulimiya nevroza, somatizasyon bozukluđu, hipokondriyazis, nevrasteni, somatoform aęrı bozukluđu, alkol kullanım bozukluđu hastalıklarının yaygınlığı belirlenmiřtir. Katılımcıların % 17.2'sine en az bir ruhsal hastalık tanısı konulmuřtur (3). Bu çalıřma dıřında yapılmıř olan çalıřmalar il, bölge ya da hastalık tanısı bazında olup ölk genelini yansıtan daha güncel tarihli bir çalıřma bulunmamaktadır.

1990'dan beri yapılan "Küresel Hastalık Yüğü" çalıřmaları ruhsal hastalıkların yaygınlıklarının yanı sıra ciddi derecede yeti yitimine de neden olduklarını göstermiřtir. 2010 yılındaki Küresel Hastalık Yüğü çalıřmasına göre tüm "Yeti Yitimine Ayarlanmıř Yařam Yıllarının (DALY)" %7.4'ünü ruhsal hastalıklar ve madde kullanım bozuklukları oluřturmaktadır. Ruhsal hastalıklar yeti yitimiyle geçen yılların (YLD: years lived with disability) başlıca nedenidir. Ruhsal hastalık yükünün %40.5'ini depresyon, %14.6'sını anksiyete bozukluđu, %10.9'unu madde kullanım bozukluđu, %9.6'sını alkol kullanım bozukluđu, %7.4'ünü řizofreni, %7'sini bipolar afektif bozukluk, %4.2'sini yaygın gelişimsel bozukluk, %1.2'sini yeme bozuklukları oluřturmaktadır (2).

“Türkiye Ruh Sağlığı Profili” raporuna göre Türkiye’de ruhsal hastalıkları olan kişilerin yalnızca %14’ü tedavi almak için bir tedaviciye başvurmuştur (15). Bu durum Türkiye’de ruhsal hastalığı olan milyonlarca kişinin tedavisiz kaldığını göstermektedir.

Bedensel hastalıkların çoğuna oranla toplumsal yükü çok daha fazla olmasına rağmen birçok ülkede ruh sağlığına ve ruhsal bozukluklara gereken önemin verilmediği bir gerçektir. Oysa, ruhsal bozukluklar toplumda yaygın olarak görülmesi, kronikleşme eğilimi göstermesi, en az bedensel hastalıklar kadar yeti kaybı ile sonuçlanabilmesi ve iş gücü-iş günü kayıplarına neden olmaları nedeniyle öncelikle ele alınması zorunlu hastalıklardandır (9). Ruhsal hastalıkların tanısı ve takibi güçlü bir ruhsal sağlık hizmeti sunumu gerektirmektedir.

2.2. Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Organizasyonu

Ruh sağlığı hizmetleri ruh sağlığının iyileştirilmesi için gereken etkili müdahalelerin uygulanmasını sağlayan hizmetler bütünüdür. Dünyada bu zamana kadar temel olarak üç ruh sağlığı hizmeti modeli kullanılmıştır: hastane temelli model, toplum temelli model, toplum-hastane denge modeli.


Hastane temelli model çok uzun yıllar boyunca çoğu Avrupa ülkesinde kullanılmıştır. Bu modelde ağır ve kronik ruhsal hastalıklara sahip hastalar büyük hastanelerde bir araya getirilmiş zaten az sayıda olan sağlık personeli sadece büyük merkezlerde istihdam edilmiştir. Bu model hem bakımı zor olan hastalarla yaşamak zorunda olan aileler, hem toplum için tercih nedeni olmuştur. Zamanla insan hakları ihlaliyle ilgili skandalların ortaya çıkması, yapılan araştırmalarda verilen tedavinin kalitesiz oluşunun görülmesi nedeniyle bu model terkedilmiş, birçok ülke toplum temelli ruh sağlığı modeline geçmiştir (16). Ülkemizde var olan hastane temelli sistemde ise hastaneler psikiyatri hastalarına ayaktan poliklinik hizmetleri vermekte ve hastalar hastalıkların atak dönemlerinde hastaneye yatırılarak tedavi edilmektedir. Ağır hastalığı olan, ailesi tarafından bakılamayan hastalar uzun yıllar hastanelerde

kalmaktadır. Bu hizmet modeli hastalıkların atak döneminde tedavi edilmesine yoğunlaşmıştır. Hastalığın kötüleşmesinin altta yatan nedenlerine çözüm üretmemektedir. Bu nedenle tedavi olup hastaneden taburcu olan hastalar bir süre sonra tekrar kötüleşmeyle hastaneye başvurmaktadır (17).

Toplum temelli ruh sağlığı modeli, ruh sağlığı hastalarının kişisel haklarına önem veren, hastalara tecrit edilmiş kalabalık hastaneler yerine hastanın yaşadığı yerde bakım verilmesini destekleyen bir hizmet şeklidir. DSÖ'nün önerdiği toplum temelli ruh sağlığı modeli öncelikle Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Son otuz yılda dünya çapında birçok ülke toplum temelli modele geçmeye başlamıştır. Bu modelde ruh sağlığı hastalarının damgalanması azalmakta ve sağlık hizmetlerine erişim daha kolay olmaktadır. Ayrıca bu hizmet modelinde hastaların ihtiyaçları daha yüksek seviyede karşılanmakta, hastalıkların tekrarlama önlenmekte ve hizmet kullananların memnuniyetleri artmaktadır (5).

Thornicroft ve Tansella ise kapsamlı bir bakım sisteminin hem toplum temelli hem de hastane temelli hizmetlerin dengeli kullanılmasıyla mümkün olabileceğini belirtmiş ve toplum-hastane denge modelini sunmuşlardır (18). Ruhsal hastalıkların tedavisi ve hastaların bakımı konusunda ne hastane temelli modelin ne de toplum temelli modelin tek başına yeterli olmadıkları düşüncesiyle ruh sağlığı hizmetlerinin sunumu için bu iki modelin faydalı yönlerini bir araya getirdikleri karma bir model oluşturmuşlardır. Denge modelinde dikkat edilmesi gereken hususlar ise, sunulan hizmetlerin yaşanılan çevreye yakın olması, hastane yatış sürelerinin mümkün olduğu kadar azaltılması ve ruh sağlığına ayrılan bütçenin hastaneler yerine toplum temelli hizmetlere aktarılması olarak belirlenmiştir (19). Psikiyatri hastanelerinin tamamen kapatılmasını ve psikiyatrik yataklı hizmetlerin ülke geneline yayılmasını hedefleyen toplum temelli modelin, özellikle insan kaynakları bakımından maliyeti oldukça yüksektir. İngiltere'de halen uygulanmakta olan bu modelde psikiyatri hastaneleri 200 yatak veya altına düşürülerek korunmuş, ayrıca toplum ruh sağlığı sistemi de kurulmuştur (5).

DSÖ ruh sađlığı hizmetlerinin örgütlenmesinin nasıl olması gerektiğini gösteren örnek bir model geliştirmiştir. Ülkelerin bu modeli kendi sosyal, kültürel, ekonomik durumlarına ve ihtiyaçlarına göre uyarlaması gerektiği belirtilmiştir. Bu model genel sađlık hizmetleri ile ruh sađlığı hizmetlerinin entegrasyonunu içermektedir (20). Şekil 2.1’de DSÖ’nün optimal ruh sađlığı hizmetleri organizasyonu piramidi gösterilmiştir.



Şekil 2.1 DSÖ’ne göre optimal ruh sađlığı hizmetleri organizasyonu

Bu piramitte ilk basamağı kişinin kendine bakımı oluşturur. İkinci basamakta ise resmi olmayan toplumsal sağlık bakımı bulunur. Resmi olmayan sağlık bakımını; aile, geleneksel şifacılar, kendine yardım ve destek grupları, klinik ve okullarda ebeveynlere ve gençlere ruhsal hastalıklar konusunda eğitim veren gönüllüler, din adamları oluşturmaktadır. Piramidin üçüncü basamağında resmi sağlık hizmetleri başlar. Bu basamağı ruhsal bozukluklar için tanı, tedavi ve sevk hizmetleri ya da ruhsal hastalıkların takibi için evde bakım hizmeti veren birinci basamak kliniklerinde çalışan pratisyen hekimler, hemşireler ve diğer sağlık personeli oluşturmaktadır. Dördüncü basamakta toplum ruh sağlığı merkezleri/ayaktan tedavi klinikleri, gündüz bakım merkezleri, istihdam/ rehabilitasyon atölyeleri, mobil kriz ekipleri bulunmaktadır. İkinci basamak hastaneler ya da üçüncü basamak üniversite hastaneleri de bu basamakta bulunmaktadır. Bu hastaneler psikiyatri servislerine sahip olan genel hastanelerdir. Ruhsal hastalıkları olan hastalar yatırılarak tedavi edilir. Diğer servislerde yatan hastalara konsültasyon hizmeti verilir. Akademik personel yetiştirme ve birinci basamağa danışmanlık verme görevlerini üstlenir. Piramidin son basamağında ise psikiyatri hastaneleri bulunmaktadır. Bunlar uzun süreli yataklı bakım verirler. Çocuklar ve yaşlılar için özel üniteler ya da yüksek güvenli üniteler içerebilirler. Adli psikiyatri hizmeti verebilirler. Piramitte üst basamaklara çıkıldıkça ihtiyaç sıklığı azalmakta ancak maliyet artmaktadır (20).

2.3. Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Birinci Basamağın Önemi ve Dünyadaki Mevcut Durumu

Birçok sağlık modelinde, birinci basamak hekimleri, hem bedensel hem ruhsal hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde önemli rol üstlenir. Ruhsal hastalıkların toplumda yaygınlığının tahmin edilenden çok daha fazla olması nedeniyle geçtiğimiz yirmi yılda, birinci basamakta ruhsal hastalıkların tedavisi gündeme gelmiş ve aile hekimlerinin/pratisyen hekimlerin önemi artmıştır. Uluslararası epidemiyolojik çalışmalara göre, birinci basamak doktorları ruhsal hastalığı için tedavi alan hastaların büyük bölümüne en azından asgari düzeyde müdahale etmektedir. Birinci basamağın

öneminin artmasına diđer bir neden ise psikiyatri hastanelerinin yatak sayılarının azaltılma eğiliminin devam etmesi ve ayaktan tedavi gören psikiyatri hastalarının sayısının artmasıdır. Klinik nörobilim ve klinik psikoloji alanlarındaki hızlı gelişmeler, birçok nöropsikiyatrik hastalık için yeni ve çeşitli tedavi seçenekleri sunmaktadır. Bu tedavilerin çođu birinci basamakta uygulanabilir tedavilerdir (21).

Çođu sađlık sisteminde, hastaların büyük kısmı yılda en az bir kez birinci basamađa başvurmaktadır. Böylece hasta ve hekim arasında sürekli ve kalıcı bir ilişki mümkün olmaktadır. Birinci basamak hekimleri hastaların aile ilişkileri, işle ilgili sorunları, sosyal, çevresel ve ekonomik durumlarıyla ilgili bilgi sahibidir. Bu nedenle hastalıđa yakalanma riskini, hastalık davranışını, hastalığın kötüleşmesi veya gerilemesini daha iyi gözlemleyebilir. Bedensel ve ruhsal komorbiditelerin gelişimi durumunda bunların dolaylı ve doğrudan etkilerinin üstesinden gelme becerisini gösterebilir. Birinci basamađa başvuru bir ruh sađlığı uzmanına başvuru kadar damgalayıcı olmadığından yardım arama ve tedavi alma önündeki engeller daha azdır (21).

Kronik hastalıkları olan hastaların hem hastalık stresi ve hem de bedensel yakınmaları nedeniyle ruhsal şikayetleri ortaya çıkabilmekte ya da var olan ruhsal şikayetleri kötüleşebilmektedir. Yapılan çalışmalarda bedensel hastalıklara komorbid gelişen ruhsal hastalıkların morbiditeyi artırdığı gösterilmiştir (22). Birinci basamak hekimlerinin takip ettiği kronik bedensel hastalığı olan hastaları ruhsal hastalıklar açısından da deđerlendirmesi gerekmektedir (23).

Birinci basamakta ruhsal hastalıkların hangilerinin tedavi edilebileceđi hastanın durumuna, birinci basamađın yeterliliđine, ikinci ve üçüncü basamakların yapısına ve basamaklar arası koordinasyona göre de deđerlik gösterir. Birinci basamakta ruhsal hastalıkların tedavisinde aile hekiminin rolünün artması aynı zamanda sorumluluklarının da artmasını birlikte getirmektedir. Bu nedenle ruhsal hastalıklardan hangilerinin birinci basamakta tedavi edilip, hangi durumlarda sevk edileceđinin iyi tanımlanması, psikotrop ilaç reçetelenmesi konusunda yetkilerinin belirlenmesi gerekmektedir (24).

2.4. Ruh Saęlıęı Hizmetlerine Ulařım Yolları

Ruh saęlıęı hizmetine ulařım yollarının anlařılması, ruh saęlıęı hizmetlerinin planlanması aısından ok nemlidir. Ruh saęlıęı hizmetlerine ulařım yollarını ve bu yollardaki aksaklıkları belirlemek, bu ulařım yolları zerinde yer alan ve sevk ve konsltasyon konusunda doęru kararlar vermesi gereken ruh saęlıęı uzmanı olmayan tedavicilerin eęitimi aısından da gereklidir.

Sekiz Doęu Avrupa lkesinde yrtlen, her lkeden 50 katılımcıyla yapılan ruh saęlıęı hizmetlerine ulařım yolları alıřmasında, katılımcıların %40'ı pratisyen hekimlere, %33' psikiyatri uzmanlarına, %14' ise bařka uzmanlara bařvurmuřlardır. Geri kalan hastalar ise hemřire, geleneksel řifacı, dini řifacılara bařvurmuřlardır. řizofreni hastalarının yarısından fazlası psikiyatri uzmanlarına doęrudan bařvurmuř, drtte birinin ilk bařvurusu ise pratisyen hekimlere olmuřtur. Doęrudan psikiyatriste bařvuru oranı dięer ruhsal hastalık tanısı alanlarda daha azdır (25).

Amerika Birleřik Devletleri (ABD), Hollanda, Almanya, Kanada ve řili'deki ruh saęlıęı hizmeti kullanımını inceleyen bir alıřmada, son on iki ayda ruhsal saęlık hizmeti alanların oranları belirlenmiřtir. Kanada'da son on iki ayda ruhsal saęlık hizmeti alanların oranı %7, řili'de %17.3, ABD'de ise %10.9'dur. Hastaların; Kanada'da % 65.4', Hollanda'da %74', řili'de %83', ABD'de %43', Almanya'da ise %39'u ruh saęlıęı hizmetlerini pratisyen hekimlerden almıřtır. Hastalar, ABD ve Almanya'da direkt ruh saęlıęı uzmanına bařvurabilirken, dięer lkelerde ise nce birinci basamaęa bařvururlar, gerekirse psikiyatriye sevkleri yapılır. řili' de ulusal saęlık sigortası birinci basamak hizmetlere kolay eriřim saęlamaktadır. Bu yzden pratisyen hekimlere bařvuru oranı yksektir (26).

Avusturalya'da yapılan ruh saęlıęı hizmetlerine ulařım alıřmasında, hastaların ilk bařvuru yerinin % 45 oranında pratisyen hekim, %19 psikiyatri uzmanı, %12 acil servis, %11 polis, %10 yardımcı saęlık personeli, %5 ise geleneksel ya da dini řifacı olduęu gsterilmiřtir. Hastaların %53' ruhsal řikayetleri iin en az bir kez pratisyen

hekimlere başvurmuşlardır. Psikotik hastalığı olanlar diğer hastalarla kıyaslandığında daha fazla oranda ilk başvuru yeri olarak psikiyatri uzmanlarını tercih etmişlerdir ve diğer hastalara göre daha hızlı doktora ulaşmışlardır. Psikotik olmayan ruhsal hastalığa sahip hastaların ilk başvuru yeri ise büyük oranda pratisyen hekimlerdir (27).

İtalya'da yapılan çalışmada ise hastaların ilk başvuru yeri %34 psikiyatri, %33 pratisyen hekim, %20 başka uzmanlar, %10 özel muayenehane hekimidir. Hastaların %1'i ise polis aracılığıyla başvurmuştur. İtalya'da yapılan daha önceki çalışmalarda psikiyatriye doğrudan başvuru oranı daha azdır. Bu durumun, hastaların ve yakınlarının ruhsal hastalıklarla ilgili bilgisinin artmış olabileceğinden kaynaklandığı düşünülmüştür. Ruhsal hastalığı olanların ilk başvuru yerinin %10 oranında özel muayenehaneler oluşu ise, hastalığın gizli kalması isteği ve psikiyatriye başvurudan daha az damgalayıcı bulunması şeklinde yorumlanmıştır (28).

Asya ülkelerinde yapılan çalışmada, diğer ülkelerden farklı olarak pratisyen hekimlere başvurunun az olduğu görülmüştür. Bu ülkelerde geleneksel şifacıların ruh sağlığına ulaşımında önemli bir yeri vardır. Psikiyatri uzmanlarının az olduğu bölgelerde geleneksel ve dini şifacılara başvuru oranı yükselmektedir. Diğer çalışmalardan farklı olarak geleneksel şifacılara başvuruların gecikmesi diğer merkezlere başvuruların gecikmesinden farklı değildir. Bangladeş ve Hindistan'da geleneksel şifacılara ruhsal hastalıklar açısından eğitimler verilmiştir. Gecikmenin az oluşu şifacıların eğitilmiş olmasına bağlanmıştır. Yine diğer çalışmalardan farklı olarak psikotik hastalıkları olanların ulaşımında diğer hastalara oranla daha fazla geciktiği belirlenmiştir (29).

2015 yılında 23 ülkenin ruh sağlığı hizmetlerine ulaşım yollarını inceleyen çalışmada, ülkelerin çoğunda ilk başvuru merkezi birinci basamaktır. Küba, Yemen, İngiltere, İspanya ve Portekiz'de psikiyatri uzmanına doğrudan ulaşım yoktur. Hastalar öncelikle birinci basamağa başvurmaktadır, sonra sevk edilmektedirler. Pratisyen hekimlere başvuru, ruhsal sağlık hizmetlerindeki yoğunluğu azaltıp, erken teşhis oranını artırmaktadır. Ancak pratisyen hekimlere başvurunun hastaların uygun tedavi almaları için geçen süreyi uzatabileceği belirtilmiştir. Kenya'da ilk başvuru en fazla oranda hastane doktorlarına yapılmaktadır. Ruh sağlığı hizmetlerinin hastaneler

içinde olması ulaşımı kolaylaştırmış ve gecikmeyi azaltmıştır, ancak doktorların merkezlerde oluşundan dolayı kırsal kesimdeki hastaların doktorlara ulaşabilmek için günlerce seyahat etmesi gerekmektedir. Yemen, Bangladeş, Endonezya, Hindistan, Moğolistan, Romanya, Makedonya ve Hırvatistan'da hastane doktorlarına başvuru %10'un altında kalmıştır. Geleneksel şifacılar, Makedonya, Hindistan ve Endonezya'da önemli rol oynamaktadır. Bu şifacılar, hastaları eninde sonunda psikiyatri uzmanlarına yönlendirse de ulaşımında gecikmeye neden olmaktadır (30).

Ülkemizde ruh sağlığı hizmetine ulaşım yolları hakkında yapılan iki çalışmanın sonuçları ise şu şekildedir: 1994 yılında Ankara'da beş farklı merkezde 427 hastayla yürütülen çalışmada ilk başvuru merkezi: %50 psikiyatri, %42 başka uzman, %5 pratisyen hekim, %1 dini şifacılar, %1 ise polistir (6). 1998'de Erzurum'da 102 kişiyle yapılan çalışmada ise ilk başvuru merkezi %43.2 başka uzman, %23.5 pratisyen hekim, %18.6 ise psikiyatridir (31).

Örneklerde görüldüğü üzere birinci basamak, ruh sağlığına ulaşımında hem Türkiye'de hem dünyada önemli rol üstlenmektedir.

2.5 Ruhsal Hastalıklarda Doktora Başvuruda Gecikme

Ruh sağlığı hizmetlerine ulaşım birçok nedene bağlı olarak gecikmektedir. Bu nedenler arasında hastalıkla ilgili farkındalık, ekonomik nedenler, coğrafi nedenler, damgalanma sorunları sayılabileceği gibi o ülkeye ait sağlık hizmetleri örgütlenmesinin de etkili olacağı düşünülebilir.

Andrade ve ark.nın 25 ülkede benzer yöntemle yaptığı çalışmada ruhsal hastalığı olduğu halde tedaviye başvurmama nedenleri incelenmiştir. Doktora başvurmama nedeni olarak hastaların tutumlarıyla ilgili nedenlerin, yapısal nedenlerin önüne geçtiği görülmüştür. Tutumla ilgili engeller ve yüzdeleri; "Kendim halletmek istedim" (%63.8), "kendiliğinden geçer diye düşündüm" (%16), "tedavi işe yaramaz diye düşündüm" (%16), "damgalanma korkusu" (%7.7) olarak bulunmuştur. Yapısal engeller ve yüzdeleri ise; "finansal sorunlar" (%16), "bulunduğu yerde

doktorun olmaması" (%12.4), "randevu alamama" (%6.5), "ulařım sorunu" (%5.5) olarak bildirilmiřtir (32).

"World Mental Health" alıřmasına katılan lkelerde yapılan alıřmada hastalık tanılarına gre gecikme karřılařtırılmıřtır. Duygulanım bozuklukları hastaları diđer hastalara gre bařvuruda daha az gecikmiř, bu durum bazı lkelerde yapılan ruhsal hastalıklarla ilgili eđitim ve farkındalık kampanyalarının etkisi olarak yorumlanmıřtır. Anksiyete bozuklukları grubundaki hastaların gecikmesinin ok uzun olmasını ise fobilerin erken yařta bařlamasına ve hayatını daha az etkilemesine ya da hastalıđı nedeniyle doktora gidememesine (rn. Sosyal fobi) bađlamıřlardır. alıřmada kadınların ruhsal sorunlarını erkeklere gre daha hızlı tanıyabildiđi ve doktora daha hızlı ulařtıđı grlmřtr. Eski alıřmalar incelendiđinde yıllar iinde ruhsal hastalıklar iin bařvuruda gecikmenin azaldıđı belirtilmiřtir (33).

Altı Avrupa lkesinde hastaların ruhsal hastalık tanılarını ve tutumlarını deđerlendirmeyi amalayan, 8796 kiřiyle yapılan alıřmada CIDI ile hastalık taraması yapılmıř ve hastalara drt tutum sorusu yneltilmiřtir: "Bir ruhsal Őikayetiniz olsa profesyonel yardım alır mısınız?","Sorunlarınızı rahata konuřabilir misiniz?","Arkadařlarınızın profesyonel yardım almanızı bilmesinden utanır mıydınız?","Sizce ruhsal hastalıkların tedavisi ne kadar mmkndr?". Kadınlar, 65 yařından kkler, gelir dzeyi yksek olanlar bu sorulardan iki ya da daha fazlasına diđer gruplara gre daha ılımlı cevaplar vermiřlerdir; yardım alma ve sorunlarını konuřabilme oranları daha yksektir (34).

Damgalamanın doktora bařvurudaki gecikmeye etkisinin arařtırıldıđı bir meta-analizde etnik azınlıkların, erkeklerin, askeri personelin ve sađlık alıřanlarının damgalamadan daha fazla ekindiđi gsterilmiřtir (35).

2.6. Ruhsal Hastalıđı Olan Hastaların Aile Hekimi Algısı

Ruh sađlıđı hizmetlerinde nemli paya sahip olan birinci basamak hizmetlerinin ruhsal Őikayeti olan hastalar tarafından benimsenmesi ve bu hastalarca

birinci basamağın kullanılması büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde ruhsal hastalığı bulunan hastaların birinci basamağa başvuru oranı ve birinci basamak hekimleri hakkındaki düşünceleri ile ilgili bazı çalışmalar yapılmıştır. 2006 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği'ne başvuran 249 hastayla yapılan çalışmada ruhsal sorunlar nedeniyle ilk başvuru merkezi %17.7 oranında pratisyen hekimler olmuştur. Tüm katılımcıların %22.9'u ruhsal hastalıklar konusunda birinci basamak hekimine güvendiğini, %58.2'si güvenmediğini, %18.9'u kısmen güvendiğini belirtmiştir. Güvenmeme nedenleri sorulduğunda sırasıyla: kendilerini uzman hekimin anlayabileceğini, psikiyatri konusunda diğer hekimlerin eğitimlerinin yetersiz olduğunu düşündüklerini, psikiyatrik hastalıkların farklı ve özgün olduğunu belirtmişlerdir (36).

2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne başvuran 185 hastayla yapılan benzer bir çalışmada; hastaların %3.8'inin ilk başvuru yeri aile hekimleridir. Hastaların %13.7'si ruhsal sorunları nedeniyle en az bir kez aile hekimine başvurmuştur. Başvuranların %40'ı ruhsal hastalıklarının tedavisinde aile hekimine güvenmekte, %52'si güvenmemekte, %8'inin ise bu konuda fikri bulunmamaktadır. Ruhsal hastalıklarının tedavisinde aile hekimine güvenmeyen katılımcıların belirttiği başlıca nedenler: "ruhsal hastalıkları sadece uzman hekim tedavi edebilir", "aile hekimlerinin eğitimleri yetersizdir" şeklindedir (7).

2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne başvuran 92 hastayla yapılan çalışmada ise ruhsal hastalık nedeniyle ilk olarak aile hekimine başvuranların oranı %4.4 olup, hastaların %24'ü ruh sağlığı hizmeti almak için en az bir defa birinci basamak sağlık kuruluşuna başvurmuştur. Katılımcıların sadece %21.7'si aile hekiminin ruhsal hastalıklar konusunda bilgi ve becerisine kesinlikle güvendiğini belirtmiştir. Ruhsal hastalıkların sadece psikiyatri uzmanının alanı olduğunu düşünmesi nedeniyle ilk başvuruyu birinci basamakta çalışan hekime yapmadığını belirtenlerin sıklığı %53.4 olarak tespit edilmiştir (8).

3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Çalışmanın Yapıldığı Yer ve Hasta Seçimi

Çalışma tanımlayıcı gözlemsel tipte bir çalışma olup Ocak 2018 ve Ağustos 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği (HÜTF) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'nde (DYBEAH) yürütülmüştür. Başlangıçta çalışmanın sadece HÜTF'nde yapılmasının yeterli olacağı düşünülmüşse de, ilk dört ayda yeterli sayıda hastaya ulaşılamaması nedeniyle, sorumlu araştırmacının ve etik kurulun onayı ile DYBEAH'nden de hastaların katılmasına karar verilmiştir. Temel araştırma sorularımızdan biri "aile hekimine başvurmuş olmanın ruh sağlığı uzmanına ulaşmada etkisinin değerlendirilmesi" olduğundan, araştırmaya alınan hastalar arasında aile hekimine başvurmuş kişi sayısının analizlere izin verecek oranda olması hedeflenmiştir. Gerekli izinler alınarak Mayıs 2018 ve Ağustos 2018 tarihleri arasında DYBEAH'nden hastalar da çalışmaya alınmıştır.

Hastaların çalışmaya dahil edilme kriterleri şunlardır:

- 18 yaş ve üzerinde olmak
- Çalışmaya katılmaya gönüllü olmak
- Hastayı tedavi eden doktorun görüşmeye onay vermesi
- İletişim kurmayı engelleyecek derecede zihinsel veya ruhsal engeli (ağır psikoz, demans, zeka geriliği gibi) bulunmaması

3.2. Uygulama

18 yaş ve üzeri, çalışmaya katılmaya gönüllü olan ve tedavi eden doktorunun görüşmeye onay verdiği hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Polikliniğe başvuran hastalara, tedavi eden doktoruyla görüşükten sonra çalışmaya katılmak isteyip istemeyecekleri sorulmuş, kabul edenlerin doktorlarından da onay alınmıştır. Mahremiyetin sağlanması için hasta ile her iki araştırma merkezinde de psikiyatri polikliniği içinde özel bir odada görüşülmüştür. Hastalara önce aydınlatılmış onam okutularak imzalatılmış, daha sonra yaklaşık 5-10 dakikalık kısa klinik değerlendirme yapılmış, ardından anket soruları yöneltilmiştir. Anket formları yüz yüze görüşme tekniğiyle görüşmeci (E.H.Ü.) tarafından doldurulmuştur. Görüşme esnasında anket sorularına cevap veremeyecek derecede psikotik yakınmaları veya zihinsel engeli bulunan üç hastanın görüşmesi sonlandırılmış ve bu kişiler çalışmadan dışlanmıştır. Görüşmeler ortalama 45 dakika sürmüştür. Hastaların tanı ve tedavi bilgileri takip eden doktorundan edinilmiştir. Çalışmaya Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nden 152 kişi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 113 kişi dahil edilmiştir.

3.3. Veri Toplama Aracı

Google Scholar ve PubMed veritabanlarında "aile hekimliği", "birinci basamak", "ruhsal hastalık", "birinci basamak sağlık hizmetleri", "ruh sağlığı hizmetleri", "mental health care", "mental health care services", "primary care", "family medicine", "primary care health services", "primary care services use" terimleri aratılarak literatür taraması yapılmıştır. Tarama sonucunda, bu konuda yapılmış araştırmalarda incelenmiş olan değişkenlere ek olarak araştırma sorumuzla ilgili değişkenleri birlikte değerlendiren 81 soruluk bir anket formu oluşturulmuştur. Anketin ilk kısmında hastaların sosyodemografik özellikleri, (cinsiyet, yaş, eğitim,

meslek, gelir, medeni durum, sosyal güvence) ve antropometrik özellikleri (boy, kilo) sorgulanmıştır. İkinci kısımda son bir yılda aile hekimlerine ve diğer doktorlara başvuru nedenleri ve sayısı, aldıkları tedaviler, kronik bedensel hastalıkları ve bedensel hastalıklarının günlük işlerine ve sosyal yaşamlarına etkisi sorgulanmıştır. Üçüncü kısımda geçmişteki ve şu anda mevcut olan ruhsal şikayetleri, bu şikayetleri için hangi doktora ve ne zaman başvurdukları, yardım aramalarında bir gecikme mevcutsa bu gecikmenin süresi ve nedeni, kullandıkları psikiyatrik ilaçlar, ruhsal şikayetlerinin iş ve sosyal yaşamlarına etkisi, genel sağlık ve ruhsal sağlık hakkındaki bilgilerini nereden edindikleri, hastaneye yatış öyküleri, psikoterapi alıp almadıkları, bir din görevlisi veya şifacıdan yardım alma durumları sorgulanmıştır. Dördüncü kısımda ise hastaların aile hekimleri, ruh sağlığı uzmanları ve damgalama hakkında tutum ve yargıları sorgulanmıştır.

3.4. İstatistiksel Analiz

Araştırmamızın temel amacı, psikiyatri kliniğine başvurmuş olan hastaların ulaşım yollarında aile hekiminin yerini araştırmak olduğu için bununla ilgili değişkenler seçilmiştir.

Analizlerde kullandığımız değişkenler şunlardır:

1. Son bir yılda herhangi bir nedenle aile hekimine başvurmuş olma,
2. Aile hekimine başvuru sayısı ve nedeni,
3. Kronik bedensel hastalık olup olmaması durumu,
4. Ruhsal şikayet nedeniyle ilk başvuru alan tedavcinin kim olduğu,
5. Başvuruda ne kadar gecikildiği,
6. Başvuruda gecikme nedenleri,
7. Ruhsal hastalık tanıları,
8. Ruhsal hastalık için aile hekimine gitme durumu,
9. Aile hekimi ve ruh sağlığı uzmanı ile ilgili tutum ve düşünceler
10. Damgalama ile ilgili tutum ve düşünceler

Sürekli deęişkenlerin cinsiyetler ve araştırma merkezleri arasında dağılımı normal dağılıma uymadığından Mann-Whitney U (MWU) testiyle, hastalık grubu için Kruskal-Wallis ile incelenmiştir. Kategorik deęişkenlerin yüzde dağılımı için ise ki-kare istatistięi kullanılmıştır.

3.5. Analize Katılan Deęişkenlerin Seçilmesi ve Oluşturulması

3.5.1 Tanılar

Hastaların poliklinik tanıları, tedavi eden doktorlarından öğrenilmiş ve dosya notlarının incelenmesiyle kesinleştirilmiştir. Birçok hastanın birden fazla tanısı olması, tanılara göre gruplamayı veya analizi zorlaştırmaktadır. Klinik anlamlılık ve hastalık şiddeti temel alınarak, hastalık tanıları, her hasta bir tanı grubuna girecek şekilde yeniden kodlanmıştır. Kodlama yaparken, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, özgül fobiler ve yaygın anksiyete bozukluğu tanısı alanlar “anksiyete bozuklukları” grubu olarak sınıflanmıştır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, alkol ve madde kullanım bozuklukları, yeme bozukluğu gibi tanısı olanlar ise, her bir gruptaki hasta sayısının az olması nedeniyle “dięer tanılar” başlığı altında toplanmıştır. Dięer hastalık grupları ise “depresyon”, “bipolar afektif bozukluk” ve “şizofreni” olarak belirlenmiştir. Birden fazla tanısı olan hastalar, tanılar arasında şizofreni varsa şizofreni grubuna; şizofreni yok, ancak bipolar afektif bozukluk ve dięer tanılar varsa bipolar afektif bozukluk grubuna katılmıştır. Dięer hastalık tanılarının bir arada olduęu durumlarda son bir yıldaki başvuru yakınmasına göre karar verilmiştir.

3.5.2 Tedaviciler

Ruhsal şikayetler için ilk başvuru alan tedavi edici deęişkeni, içinde aile hekiminin de yer aldığı 20’den fazla tedavi türünü içermekteydi. Bu nedenle tedavi türleri, literatürdeki eğilime de uygun olarak, aile hekimi, ruh sağlığı uzmanı ve başka uzmanlar olarak gruplanmıştır.

3.5.3 Başvuruda Gecikme ve Nedenleri

Daha önce yapılan çalışmalar ve genelde hekime ulaşma yolları göz önüne alınarak, ruhsal şikayetleri başladıktan sonraki bir ay içinde bir doktora başvurmayan hastalar “gecikmiş” olarak değerlendirilmiştir. Hastalara tarafımızca oluşturulan gecikme nedenleri sorulmuş ve bu nedenleri “gecikmeyi hiç etkilemedi”, “az etkiledi”, “orta derece etkiledi” ya da “çok etkiledi” şeklinde cevaplamaları istenmiştir. Birçok soruda cevapların “hiç etkilemedi” şikkında yoğunlaşması nedeniyle, cevap şıkları ikiye indirilecek şekilde yeniden gruplanmış, “az”, “orta” veya “çok” etkiledi şıkları “etkiledi” olarak kodlanmıştır.

3.5.4 Aile hekimi, Ruh Sağlığı Uzmanı ve Damgalama ile İlgili Tutum ve Yargılar

Hastaların aile hekimleri, ruh sağlığı uzmanları ve damgalamayla ilgili tutum ve yargılarını anlamak amacıyla 18 önerme oluşturulmuş, bu önermelere “Hiç katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum”, “tamamen katılıyorum” şeklinde cevap vermeleri istenmiştir. Her önermeye hiç katılmıyorum için 1, katılmıyorum için 2, kararsızım için 3, katılıyorum için 4, tamamen katılıyorum için 5 puan verilerek ortalama puanları hesaplanmıştır.

3.6 Etik Kurul Onayı

Bu araştırma için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 19.12.2017 tarihinde GO 17/981 proje numarası ile onay alınmıştır.

4. BULGULAR

Arařtırmamıza Ocak 2018 Ağustos 2018 tarihleri arasında Hacettepe Tıp Fakóltesi Psikiyatri Poliklinikleri'ne ve Dıřkapı Eđitim ve Arařtırma Hastanesi Psikiyatri Poliklinikleri'ne bařvuran 265 kiři dahil edilmiřtir.

4.1. Hastaların Sosyodemografik Özellikleri

Tablo 4.1'de hastaların yařı, aylık geliri, çocuk sayısı, hanede yařayan kiři sayısı ortalamaları, bařvurduđu hastane, cinsiyeti, eđitim durumu, gelir getiren iřte çalıřma durumu, medeni hali ve sađlık güvencesi durumunun dađılımları verilmiřtir. Hastaların 152'si Hacettepe Tıp Fakóltesi Hastanesine, 113'ü Dıřkapı Eđitim ve Arařtırma Hastanesi'ne bařvurmuřtur. Kadın hasta sayısı erkek hasta sayısından fazladır. Hastaların ortalama yařı 39.35, aylık hane geliri 4030 TL, hanede yařayan kiři sayısı 3.37, çocuk sayısı 1.25'dir. Arařtırmaya katılanların %54'ünün lise veya üniversite mezunu olduđu görölmektedir. Hastaların 84'ü (%31.6) gelir getiren bir iřte çalıřmaktadır. Hiç evlenmemiřlerin oranı %36.2'dir. Hastaların büyük çođunluđunun sađlık güvencesi vardır.

Tablo 4.1. Hastaların Sosyodemografik Özellikleri

| | N | En küçük | En büyük | Ortalama |
|----------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Yaş | 265 | 18 | 79 | 39.35 |
| Aylık hane geliri (TL) | 265 | 200 | 50000 | 4030 |
| Hanede yaşayan kişi sayısı | 265 | 1 | 8 | 3.37 |
| Çocuk sayısı | 265 | 0 | 7 | 1.25 |
| | | | N | % |
| Hastane | | | | |
| Hacettepe | | | 152 | 57.4 |
| Dışkapı | | | 113 | 42.6 |
| Cinsiyet | | | | |
| Erkek | | | 84 | 31.7 |
| Kadın | | | 181 | 68.3 |
| Eğitim | | | | |
| Okur yazar değil | | | 6 | 2.3 |
| Okur yazar | | | 4 | 1.5 |
| İlkokul | | | 65 | 24.5 |
| Ortaokul | | | 47 | 17.7 |
| Lise | | | 97 | 36.6 |
| Üniversite ve üstü | | | 46 | 17.4 |
| Gelir getiren işte çalışma | | | | |
| Evet | | | 84 | 31.7 |
| Hayır | | | 181 | 68.3 |
| Medeni hal | | | | |
| Hiç evlenmemiş | | | 96 | 36.2 |
| Evli/beraber yaşama | | | 137 | 51.7 |
| Boşanmış | | | 25 | 9.4 |
| Dul | | | 7 | 2.6 |
| Sigorta | | | | |
| Var | | | 257 | 96.9 |
| Yok | | | 8 | 3.1 |

4.1.1 İki Araştırma Merkezinin Karşılaştırılması

Tablo 4.2’de başvuru hastaneye göre yaş, aylık gelir, çocuk sayısı, hanede yaşayan kişi sayısı ortalamaları, cinsiyet, eğitim, gelir getiren işte çalışma durumu, medeni hal, sağlık güvencesi durumu sayısı ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne (HÜTF) başvuru hastalar ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (DYBEAH) başvuru hastalar karşılaştırıldığında yaş ($p=0.086$), hanede yaşayan kişi sayısı ($p=0.806$), cinsiyet ($p=0.627$), gelir getiren bir işte çalışma ($p=0.961$), sağlık güvencesi olup olmaması ($p=0.36$) açılarından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.

HÜTF’ne başvuru hastaların aylık gelir ortalaması (4.532 TL), DYBEAH’ne başvuru hastalara oranla (3357 TL) anlamlı olarak daha yüksektir ($p=0.007$). Benzer şekilde HÜTF’ne başvuru hastaların eğitim düzeyi, DYBEAH’ne başvuru hastalardan fazladır ($p<0.0001$): Lise ve üstü eğitim alanların oranı HÜTF’ne başvuru hastalarda %63.8, DYBEAH’ne başvuru hastalarda ise %40.7’dir.

İki merkez arasında medeni durum açısından da farklılık vardır: HÜTF’ne başvuru hastalarda bekarların oranı DYBEAH’ne başvuru hastalara oranla fazladır ($p<0.0001$). Buna paralel olarak HÜTF’ne başvuru hastaların sahip oldukları çocuk sayısı ortalaması (0.94) da DYBEAH’ne başvuru hastalara oranla (1.67) daha azdır ($p<0.0001$).

Tablo 4.2. Hastanelere Göre Hastaların Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması

| | Hacettepe Ortalama | Dışkapı Ortalama | P (*Mann- Whitney U) |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| Yaş | 38.38 | 40.66 | 0.086 |
| Aylık hane geliri (TL) | 4532 | 3357 | 0.007 |
| Çocuk sayısı | 0.94 | 1.67 | <0.0001 |
| Hanede yaşayan kişi sayısı | 3.39 | 3.35 | 0.806 |
| | Sayı (%) | Sayı (%) | P (Ki-kare) |
| Cinsiyet | | | |
| Erkek | 50 (32.9) | 34 (30.1) | 0.627 |
| Kadın | 102 (67.1) | 79 (69.9) | |
| Eğitim | | | <0.0001 |
| Okur yazar değil | 3 (2.0) | 3 (2.7) | |
| Okur yazar | 2 (1.3) | 2 (1.8) | |
| İlkokul | 26 (17.1) | 39 (34.5) | |
| Ortaokul | 24 (15.8) | 23 (20.4) | |
| Lise | 63 (41.4) | 34 (30.1) | |
| Üniversite ve üstü | 34 (22.4) | 12 (10.6) | |
| Gelir getiren işte çalışma | | | 0.961 |
| Evet | 48 (31.6) | 36 (31.9) | |
| Hayır | 104 (61.8) | 77 (68.1) | |
| Medeni hal | | | <0.0001 |
| Hiç evlenmemiş | 70 (46.1) | 26 (23.0) | |
| Evli/Beraber yaşama | 65 (42.8) | 72 (63.7) | |
| Boşanmış | 11 (7.2) | 14 (12.4) | |
| Dul | 6 (3.9) | 1 (0.9) | |
| Sigorta | | | 0.36 |
| Var | 146 (96.1) | 111 (98.2) | |
| Yok | 6 (3.9) | 2 (1.8) | |

4.1.2. Son Bir Yılda Aile Hekimine Başvuranlar ve Başvurmayanların Karşılaştırılması

Tablo 4.3'de son bir yılda herhangi bir şikayetle aile hekimine başvuran ve başvurmayan hastaların sosyodemografik özellikleri karşılaştırılmıştır.

Son bir yılda herhangi bir şikayetle aile hekimine başvuranların başvurmayanlara göre daha yaşlı olduğu görülmektedir ($p=0.02$). Gelir getiren işi olmayanların (%68.3) başvuru oranı da çalışanlara oranla daha yüksektir ($p=0.048$). Aylık geliri yüksek olanlar aile hekimine daha az başvurmuştur ($p=0.014$). Kronik bedensel hastalığı olanların son bir yılda aile hekimine başvurma oranı daha fazladır ($p=0.012$).

Son bir yılda aile hekimine herhangi bir şikayetle başvurma ile cinsiyet ($p=0.297$), eğitim durumu ($p=0.129$), medeni durum ($p=0.097$), çocuk sayısı ($p=0.716$), hanede yaşayan kişi sayısı ($p=0.418$), sağlık güvencesi olup olmaması ($p=0.071$) ile anlamlı ilişki saptanmamıştır.

Tablo 4.3 Son Bir Yılda Aile Hekimine Başvuranlar ve Başvurmayanların Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması

| | | Aile hekimine son bir yılda başvuru | | P (*MWU) |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| | | Yok | Var | |
| | | Ortalama | Ortalama | |
| Yaş | | 34.96 | 40.70 | 0.02 |
| Aylık hane geliri (TL) | | 4581 | 3863 | 0.014 |
| Hanede yaşayan kişi sayısı | | 3.45 | 3.34 | 0.418 |
| Çocuk sayısı | | 1.18 | 1.28 | 0.716 |
| | | N (%) | N (%) | P (*Ki-kare) |
| Cinsiyet | Erkek | 23 (27.4) | 61 (72.6) | 0.297 |
| | Kadın | 39 (21.5) | 142 (78.5) | |
| Eğitim | Okur yazar değil | 1 (1.6) | 5 (2.5) | 0.129 |
| | Okur yazar | 0 (0) | 4 (2) | |
| | İlkokul | 8 (12.9) | 57 (28.1) | |
| | Ortaokul | 14 (22.6) | 33 (16.3) | |
| | Lise | 28 (45.2) | 69 (34.0) | |
| | Üniversite | 11 (17.7) | 35 (17.1) | |
| Gelir getiren işte çalışma | Evet | 26 (31) | 58 (69) | 0.048 |
| | Hayır | 36 (19.9) | 145 (80.1) | |
| Medeni hal | Hiç evlenmemiş | 26 (41.9) | 70 (34.5) | 0.097 |
| | Evli/beraber yaşama | 34 (54.8) | 103 (50.7) | |
| | Boşanmış | 2 (3.2) | 23 (11.3) | |
| | Dul | 0 (0) | 7 (3.4) | |
| | | | | |
| Sigorta | Var | 58 (93.5) | 199 (98) | 0,071 |
| | Yok | 4 (6.5) | 4 (2) | |

4.1.3 Kadın ve Erkek Hastaların Karşılaştırılması

Tablo 4.4'de cinsiyete göre yaş, aylık gelir, çocuk sayısı, hanede yaşayan kişi sayısının ortalamaları; eğitim, gelir getiren işte çalışma, medeni hal ve sağlık güvencesi durumlarının sayı ve yüzdeleri verilmiştir.

Çalışmaya katılan kadın hastaların evli olma oranı (%56.4) erkeklere göre (%41.7) daha fazla bulunmuştur ($p=0.015$). Buna paralel olarak kadın hastaların çocuk sayısı da erkeklere göre fazladır ($p=0.002$). Erkeklerin ve kadınların eğitim seviyesi karşılaştırıldığında erkeklerin eğitim düzeyi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur ($p=0.005$). Gelir getiren işte çalışma oranı erkeklerde daha fazla iken ($p<0.0001$), erkeklerin sosyal güvencesi kadınlara göre daha azdır ($p=0.001$).

Kadın ve erkek hastalar arasında yaş ($p=0.114$), aylık gelir ($p=0.071$), hanede yaşayan kişi sayısı ($p=0.212$) açılarından ise istatistiksel anlamlı fark yoktur.

Tablo 4.4 Kadın ve Erkek Hastaların Karşılaştırılması

| | | Erkek Ortalama | Kadın Ortalama | P (*MWU) |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Yaş | | 37.83 | 40.06 | 0.114 |
| Aylık hane geliri (TL) | | 4670 | 3734 | 0.071 |
| Hanedeyen yaşayan kişi sayısı | | 3.20 | 3.45 | 0.212 |
| Çocuk sayısı | | 0.93 | 1.4 | 0.002 |
| | | N (%) | N (%) | P (*Ki-kare) |
| Eğitim | Okur yazar değil | 0 (0) | 6 (3.3) | 0.005 |
| | Okur yazar | 0 (0) | 4 (2.2) | |
| | İlkokul | 11 (13.1) | 54 (29.8) | |
| | Ortaokul | 19 (22.6) | 28 (15.5) | |
| | Lise | 40 (47.6) | 57 (31.5) | |
| | Üniversite | 14 (16.7) | 32 (17.7) | |
| Gelir getiren işte çalışma | Evet | 41 (48.8) | 43 (23.8) | <0.0001 |
| | Hayır | 43 (51.2) | 138 (76.2) | |
| Medeni hal | Hiç evlenmemiş | 42 (50) | 54 (29.8) | 0.015 |
| | Evli/beraber yaşama | 35 (41.7) | 102 (56.4) | |
| | Boşanmış | 6 (7.1) | 19 (10.5) | |
| | Dul | 1 (1.2) | 6 (3.3) | |
| Sigorta | Var | 77 (92) | 180 (99.4) | 0.001 |
| | Yok | 7 (8) | 1 (0.6) | |

4.2. Hastaların Ruhsal Hastalık Tanıları

Hastaların 101'inin (%38.1) tanısı depresyon, 77'sinin (%29.1) anksiyete bozuklukları, 36'sının (%13.6) şizofreni, 32'sinin (%12.1) ise bipolar afektif bozukluktur (BAB). "Diğer hastalıklar" grubunu 19 kişi (%7.2) oluşturmaktadır.

İki merkeze başvuran hastaların ruhsal hastalık tanıları, sayısı ve yüzdesi Tablo 4.5'te verilmiştir. HÜTF'ne başvuranlar arasında hem şizofreni hem de bipolar afektif bozukluk hastalarının oranı %17.1 olup, her iki tanı grubu oranı da DYBEAH'ne başvuran şizofreni (%8.8) ve bipolar afektif bozukluk (%5.3) hastalarının oranından fazladır. Buna karşılık DYBEAH'ne başvuran depresyon (%42.5) ve anksiyete bozuklukları (%37.2) hastalarının oranı, HÜTF'ne başvuran depresyon (%34.9) ve anksiyete bozuklukları (%23) hastalarının oranından fazladır ($p=0.02$). Her iki merkezde en büyük grubu depresyon hastaları oluşturmaktadır.

Tablo 4.5 Ruhsal Hastalık Tanılarının Araştırma Merkezlerine Göre Dağılımı

| | | Hacettepe | Dışkapı | Toplam | P (Ki-kare) |
|--------------------------|---|-----------|---------|--------|-------------|
| Anksiyete bozuklukları | n | 35 | 42 | 77 | 0.02 |
| | % | 23 | 37.2 | 29.1 | |
| Bipolar afektif bozukluk | n | 26 | 6 | 32 | |
| | % | 17.1 | 5.3 | 12.1 | |
| Depresyon | n | 53 | 48 | 101 | |
| | % | 34.9 | 42.5 | 38.1 | |
| Şizofreni | n | 26 | 10 | 36 | |
| | % | 17.1 | 8.8 | 13.6 | |
| Diğer | n | 12 | 7 | 19 | |
| | % | 7.9 | 6.2 | 7.2 | |
| Toplam | n | 152 | 113 | 265 | |
| | % | 100 | 100 | 100 | |

Hastalık tanılarının cinsiyete göre dağılımı, sayı ve yüzdeleri Tablo 4.6’da görülmektedir. Erkeklerde şizofreni tanısı oranı (%23.8) kadınlardan fazlayken (%8.8), kadınlarda anksiyete bozuklukları (%33.1) ve bipolar afektif bozukluk tanıları (%13.8) oranı erkeklerden fazladır. Depresyon tanısı hem kadın hem erkeklerde en büyük grubu oluşturmaktadır. Erkeklerde bipolar afektif bozukluk grubu en küçük grupken, kadınlarda ise “diğer hastalık” grubu en küçük grubu oluşturmaktadır.


Tablo 4.6 Ruhsal Hastalık Tanılarının Cinsiyete Göre Dağılımı

| | | Erkek | Kadın | Toplam | P (Ki-kare) |
|--------------------------|---|-------|-------|--------|-------------|
| Anksiyete bozuklukları | n | 17 | 60 | 77 | 0.03 |
| | % | 20.2 | 33.1 | 29.1 | |
| Bipolar afektif bozukluk | n | 7 | 25 | 32 | |
| | % | 8.3 | 13.8 | 12.1 | |
| Depresyon | n | 31 | 70 | 101 | |
| | % | 36.9 | 38.7 | 38.1 | |
| Şizofreni | n | 20 | 16 | 36 | |
| | % | 23.8 | 8.8 | 13.6 | |
| Diğer | n | 9 | 10 | 19 | |
| | % | 10.7 | 5.5 | 7.2 | |
| Toplam | n | 84 | 181 | 265 | |
| | % | 100 | 100 | 100 | |

4.3. Ruhsal Şikayet Nedeniyle İlk Başvurulan Tedavici

Hastaların ruhsal bir şikayet nedeniyle yaptıkları ilk başvuruda en küçük payı alan grup aile hekimleriydi (N=18, %6.8). Hastaların 34’ü (%12.8) dini şifacılar, 69’u (%26) başka uzmanlara, büyük bölümü ise doğrudan psikiyatriye başvurmuştu (N=144, %54.3). Hastaların ruhsal şikayetleri için ilk başvurduğu merkezler ve bu merkezler arasındaki sevkleri Şekil 4.1’de verilmiştir. Şekilde gösterilen sayılar kişi sayısıdır. Siyah renkli sayılar tedavicilere ilk başvuruyu yapan kişi sayısını, mavi renkli sayılar ikinci tedaviciye giden kişi sayısını, kırmızı renkli sayılar da üçüncü tedaviciye giden kişi sayısını göstermektedir. Düz oklar hastaların gidiş yönünü, kıvrımlı oklar

aynı kategoride farklı tedavcilere gidişi temsil etmektedir. Aile hekimine başvuran 18 hastanın 15'i daha sonra psikiyatrye, 3'ü ise başka uzmana gitmiştir. Dini şifacıya başvuran 34 kişinin 26'sı daha sonra psikiyatrye, 5'i başka uzmanlara, 3'ü aile hekimine gitmiştir. Psikiyatri dışı uzmanlara başvuran 69 hastanın 54'ü daha sonra psikiyatrye, 2'si aile hekimine, 13'ü ise başka uzmanlara gitmiştir.



Şekil 4.1 Ruhsal Şikayeti Olan Hastaların Psikiyatrye Ulaşım Yolu

Hastaların ruhsal bir şikayetle ilk başvurdukları tedaviçi oranlarının araştırmanın yürütüldüğü iki merkez arasında karşılaştırılması Tablo 4.7'de görülmektedir. Merkezler arasında ilk başvurunun hangi tedaviçiye yapıldığı konusunda anlamlı farklılık saptanmamıştır.

Tablo 4.7 Araştırma Merkezlerinin İlk Başvurulan Tedaviçi Açısından Karşılaştırılması

| Hastane | | İlk başvuru alan tedaviçi | | | | | Top. | P _(Ki-kare) |
|-----------|---|---------------------------|------|------|------|-----|-------|------------------------|
| | | AH | BU | PSK | DŞ | | | |
| Hacettepe | n | 6 | 41 | 85 | 20 | 152 | 0.207 | |
| | % | 3.9 | 27.0 | 55.9 | 13.2 | 100 | | |
| Dışkapı | n | 12 | 28 | 59 | 14 | 113 | | |
| | % | 10.6 | 24.8 | 52.2 | 12.4 | 100 | | |
| Toplam | n | 18 | 69 | 144 | 34 | 265 | | |
| | % | 6.8 | 26 | 54.3 | 12.8 | 100 | | |

(AH: Aile Hekimi, BU: Başka Uzman, PSK: Psikiyatrist, DŞ: Dini Şifacı Top.: Toplam)

Kadın ve erkek hastaların ruhsal şikayetleri için ilk başvurduğu doktorlar Tablo 4.8'de verilmiştir. Cinsiyetin başvuruyu anlamlı olarak etkilediği görülmektedir. Her iki cinsiyette de psikiyatriye doğrudan başvuru en büyük grubu oluştursa da, erkeklerde doğrudan psikiyatri başvurusu (%67.9) kadınlardan anlamlı olarak daha fazladır. Kadınlarda ise başka uzmana başvuru erkeklerden fazladır ($p=0.001$)

Tablo 4.8 Kadın ve Erkek Hastaların İlk Başvurulan Tedavici Açısından Karşılaştırılması

| | | İlk başvurulan tedavi | | | | | |
|----------|---|-----------------------|------|------|------|------|------------------------|
| | | AH | BU | PSK | DŞ | Top. | P _(Ki-kare) |
| Cinsiyet | | | | | | | |
| Erkek | n | 3 | 10 | 57 | 14 | 84 | 0.001 |
| | % | 3.6 | 11.9 | 67.9 | 16.7 | 100 | |
| Kadın | n | 15 | 59 | 87 | 20 | 181 | |
| | % | 8.3 | 32.6 | 48.1 | 11.0 | 100 | |
| Toplam | n | 18 | 69 | 144 | 34 | 265 | |
| | % | 6.8 | 26 | 54.3 | 12.8 | 100 | |


Hastaların aldığı tanıların ilk olarak başvurulan tedavcinin kim olduğu değişkeniyle karşılaştırılması Tablo 4.9’da verilmiştir. Hastaların tanısının kime başvurulduğu ile anlamlı ilişkisinin olduğu görülmektedir. Tüm hastalık gruplarında ilk başvuru yeri olarak en büyük payı psikiyatri almaktadır. Şizofreni hastalarının %30.6’sının ilk başvuru yeri dini şifacılarıdır. Anksiyete bozuklukları hastaları diğer hastalara göre ilk başvuruda daha çok “başka uzmanları” tercih etmiştir. Aile hekimine başvuru oranı da anksiyete hastalarında diğer hasta gruplarından daha fazladır.

Tablo 4.9 İlk Başvurulan Tedaviciye Göre Ruhsal Hastalık Tanılarının Karşılaştırılması

| | | AH | BU | PSK | DŞ | Top. | P _(Ki-kare) |
|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| Anksiyete bozuklukları | n | 8 | 29 | 33 | 7 | 77 | 0.002 |
| | % | 10.4 | 40.3 | 45.5 | 9.1 | 29.1 | |
| Bipolar afektif bozukluk | n | 1 | 10 | 15 | 6 | 32 | |
| | % | 3.1 | 37.5 | 56.3 | 18.8 | 12.1 | |
| Depresyon | n | 8 | 20 | 63 | 10 | 101 | |
| | % | 7.9 | 18.8 | 73.3 | 9.9 | 38.1 | |
| Şizofreni | n | 1 | 4 | 20 | 11 | 36 | |
| | % | 2.8 | 16.7 | 77.8 | 30.6 | 13.6 | |
| Diğer | n | 0 | 6 | 13 | 0 | 19 | |
| | % | 0 | 26.8 | 63.2 | 0 | 7.2 | |
| Toplam | n | 18 | 69 | 144 | 34 | 265 | |
| | % | 6.8 | 28.3 | 63 | 12.8 | 100 | |

4.4. Doktora Başvuruda Gecikme Süreleri ve İlişkili Faktörler

Hastaların ruhsal şikayetlerinin başlangıcından bir tedaviciye ulaşmaya kadar geçen ortalama süre 22 aydır. Gecikme değişkeni normal dağılıma uymadığı için analizlerde hem kategorik biçimde kullanılmış, hem de non-parametrik analizler yapılmıştır. Yöntem bölümünde de belirtildiği gibi ruhsal şikayetleri başladıktan sonra bir ay içinde herhangi bir doktora başvurmamış olan hastalar “gecikmiş” olarak gruplanmıştır. Bu gruplamaya göre ruhsal şikayetleri için doktora başvuruda gecikenlerin oranı %61’dir (N=162). Hastaların şikayetleri başladıktan sonra bir doktora başvurana kadar geçen süre Şekil 4.2’de verilmiştir.



Şekil 4.2 Ruhsal Şikayet Nedeniyle Doktora Başvurudaki Gecikmeler

Şikayetler başladıktan sonra doktora başvurmaya kadar geçen sürenin (gecikme) cinsiyetler arası, araştırmanın yapıldığı merkezler arası veya hastalık tanılarını açısından farklılaşıp farklılaşmadığı açısından karşılaştırmalar Tablo 4.10'da verilmiştir.


Gecikme açısından her iki çalışma merkezine başvuran hastalar arasında ve ($p=0.492$) kadınlarla erkekler arasında ($p=0.523$) anlamlı fark yoktur.

Doktora başvurudaki gecikme süresi normal dağılıma uymadığından Kruskal-Wallis testi uygulanmış ve gecikme süresi ruhsal hastalık tanısı ile ilişkili bulunmuştur ($p < 0.0001$). Post hoc analiz için tüm hastalık grupları ikiye ayrılmış ve Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Buna göre BAB ve şizofreni hastaları diğer tüm hastalardan daha hızlı doktora ulaşmıştır. BAB hastalarının doktora başvuruya kadar geçen süre ortalaması 5.07 ay, şizofreni hastalarının ortalaması 7.2 aydır. Buna karşılık, anksiyete bozuklukları tanılı hastaların doktora ilk başvuru süresi ortalaması 25.30 ay, depresyon hastalarının 30.13 ay, "diğer" tanı kategorisindeki hastaların doktora ilk başvuru süresi ortalaması 32.68 aydır.

Tablo 4.10 Araştırma Merkezleri, Cinsiyet ve Ruhsal Hastalık Tanılarının Başvuruda Gecikme Açısından Karşılaştırılması

| | Gecikme ortalama (ay) | P (MWU) |
|---------------------------|------------------------------|----------------|
| Hacettepe | 24.22 | 0.492 |
| Dışkapı | 20.82 | |
| P (MWU) | | |
| Erkek | 32.55 | 0.523 |
| Kadın | 18.23 | |
| P (Kruskal-Wallis) | | |
| Anksiyete bozuklukları | 25.30 | 0.0001 |
| Bipolar afektif bozukluk | 5.07 | |
| Depresyon | 30.13 | |
| Şizofreni | 7.2 | |
| Diğer | 32.68 | |

Hastalık tanılarına göre gecikme süresi Şekil 4.3'de gösterilmiştir.



Şekil 4.3 Ruhsal Hastalık Tanılarına Göre Gecikme Süresi

Başvuruda geciken 162 hastaya (%61) yöntemde de belirtildiği gibi önceden belirlediğimiz gecikme nedenleri sorulmuş, verdikleri cevaplar daha sonra bu durum geç kalmayı "etkiledi" veya "etkilemedi" şeklinde kodlanmıştır. Verilen cevaplar ve yüzdeleri Tablo 4.11'de gösterilmiştir. Verilen cevaplar arasında en büyük iki grubu "sorununu kendi halletmek istemek" (%51.2) ve "problemin kendiliğinden kaybolacağını düşünmek" (%49.4) oluşturmaktaydı.

Gecikme için bildirilen nedenler cinsiyetler, hastalık tanı grupları, araştırma merkezleri ve bir işte çalışma durumu arasında farklılıklar göstermektedir. HÜTF'ne başvuranlar DYBEAH'ne başvuranlara göre daha fazla oranda "hangi doktora başvuracağına emin olamamak" ($p=0.001$), "randevu alamamak" ($p<0.0001$), "tedavinin işe yaramayacağını düşünmek" ($p=0.021$), "kendi iradem dışında

hastaneye yatırılmaktan korkmak" (p=0.001) ve "şikayetim çok da rahatsız etmemesi" (p=0.048) cevaplarını vermişlerdir. Kadınların, erkeklere oranla "ailem izin vermedi" cevabını daha fazla bildirdikleri görülmüştür (p=0.034). Diğer nedenler için kadınlarla erkekler arasında fark bulunmamıştır.

Hastalık tanısına göre yardım aramada gecikme sebepleri analiz edildiğinde ise, bipolar afektif bozukluk hastaları diğer hastalara göre daha fazla oranda "kendi iradem dışında hastaneye yatırılmaktan korkmak" (p=0.045) ve "doktorumun görev yerinin değişmesi" (p=0.047) cevabını vermiştir. "Diğer" hastalık grubunda olan hastaların "şikayetim çok da rahatsız etmemesi" cevabını başka hastalara göre daha çok verdiği belirlenmiştir (p =0.009).

Bir işte çalışanlar çalışmayanlara göre daha çok "tedavinin çok zaman alacağını düşünmek" (p=0.007) ve "başkalarının tedavi aldığını öğrenmelerinden çekinmek" (p=0.043) cevabını vermiştir.

Tablo 4.11 Hastaların Bildirdiği Gecikme Nedenleri

| | Gecikmeyi etkiledi | Gecikmeyi etkilemedi |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| | % | % |
| Tedavinin maddi olarak yük getireceğini düşünmek | 6.8 | 93.2 |
| Hangi doktora başvuracağına emin olamamak | 11.7 | 88.3 |
| Randevu alamamak | 11.1 | 88.9 |
| Ulaşım, çocuk bakımı, zaman planlaması gibi sorunların olması | 22.2 | 77.8 |
| Tedavinin çok zaman alacağını düşünmek | 19.1 | 80.9 |
| Tedavinin işe yaramayacağını düşünmek | 25.9 | 74.1 |
| Sorununu kendi halletmek istemek | 51.2 | 48.8 |
| Daha önce tedavi alınmış ancak fayda etmemiş olması | 10.5 | 89.5 |
| Başkalarının tedavi aldığını öğrenmelerinden çekinmek | 25.9 | 74.1 |
| Kendi iradem dışında zorla hastaneye yatırılmaktan korkmak | 11.7 | 88.3 |
| Problemin kendiliğinden kaybolacağını düşünmek | 49.4 | 50.6 |
| Şikayetimin çok da rahatsız etmemesi | 27.8 | 72.2 |
| Doktorumun görev yerinin değişmesi | 4.3 | 95.7 |
| Başka bir yere taşınma | 6 | 96.9 |
| İlaç kullanmak istememe | 35.6 | 65.4 |
| Hasta olduğunu farketmeme | 21.6 | 78.4 |
| Ailenin doktora gitmeye izin vermemesi | 5.6 | 94.4 |
| Başka sebep | 9.3 | 90.7 |

4.4. Şifacılara Başvuru

73 hasta (%27.5) ruhsal hastalık şikayeti ile hastalıklarının herhangi bir döneminde dini şifacılara başvurmuştur. Dini şifacılara başvuran ve başvurmeyen hastalar karşılaştırıldığında; iki grup arasında yaş ($p=0.458$), gelir düzeyi ($p=0.605$), başvurduğu araştırma merkezi ($p=0.384$), cinsiyet ($p=0.799$), eğitim düzeyi ($p=0.924$), gelir getiren işte çalışma durumu ($p=0.967$), medeni hal ($p=0.784$), sigortalı olma durumu ($p=0.149$) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Dini şifacılara başvuran hastaların tanıları karşılaştırıldığında şizofreni hastalarının diğer hastalara göre dini şifacılara daha çok gittiği belirlenmiştir ($p<0,0001$).

Dini şifacılara başvuran hastaların 34'ü (%46.5) bir doktora başvurmadan önce dini şifacılara gitmiştir. İlk başvuru yeri dini şifacılar olan hastaların 11'inin tanısı (%32.4) şizofreni, 10'unun (%29.4) depresyon 7'sinin (%20,6) anksiyete bozukluğu, 6'sının (%17.6) ise bipolar afektif bozukluktur. Hastalık tanıları ile şifacıya başvuru arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır ($p=0.808$). Bu hastaların sosyodemografik verileri karşılaştırıldığında, hastaların ilk başvuruda dini şifacılara gidip gitmeme durumları ile yaş ($p=0.843$), gelir düzeyi ($p=0.354$), başvuru araştırma merkezi ($p=0.566$), cinsiyet ($p=0.281$), eğitim düzeyi ($p=0.954$), gelir getiren işte çalışma durumu ($p=0.404$), medeni hal ($p=0.487$), sigortalı olma durumu ($p=0.978$) arasında anlamlı fark yoktur.

4.5. Psikiyatri Hastalarının Aile Hekimliği Uygulamasını Kullanım Durumları

Çalışmaya alınan 265 hastanın 203'ü (%76.6) son bir yılda herhangi bir şikayetle aile hekimlerine başvurmuştur. Daha önceden ruhsal hastalık tanısı almış hastalara tanı aldıktan sonra aile hekimlerine gidip gitmedikleri, eğer gittilerse aile hekiminden aldıkları hizmetler sorulmuştur. Aile hekimlerine başvuranların aldıkları hizmetler "psikiyatrik ilaçları yazdırmak için gitme", "ruhsal hastalığı hakkında danışmanlık almak için gitme", "bedensel hastalıkları için gitme" şeklinde belirlenmiştir. "Psikiyatrik ilaçları yazdırmak için gitme" için ruhsal tanıları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Şizofreni hastaları diğer hastalara göre psikiyatrik ilaçlarını yazdırmak

için daha yüksek oranda aile hekimine başvurmuşlardır ($p=0.02$). İlaç yazdırmak için aile hekimine gitme oranı HÜTF'ne başvuranlarda anlamlı olarak daha fazladır ($p=0.01$), kadınlarla erkekler arasında bu açıdan fark yoktur ($p=0.081$).

Ruhsal hastalığı için aile hekiminden danışmanlık alan hastaların tanılarını karşılaştırıldığında, anksiyete bozuklukları tanı grubundaki hastaların aile hekiminden diğer hastalara göre daha fazla oranda ruhsal hastalığı için danışmanlık aldığı; "diğer hastalıklar" tanı grubundaki hastaların ise aile hekimlerinden hiç danışmanlık almadıkları bulunmuştur ($p=0.036$). Ruhsal hastalığı için aile hekimlerinden danışmanlık alan hastalarda cinsiyet ($p=0.66$) ve başvuru merkeze ($p=0.565$) göre karşılaştırılma yapıldığında anlamlı fark bulunmamıştır.

Ruhsal hastalığı olan kişilerin bedensel hastalığı için aile hekimine başvuru oranı %76.9'dur. Bedensel hastalık nedeniyle aile hekimine başvuranlarla başvurmayanlar arasında ruhsal hastalık tanılarını, cinsiyet ($p=0.978$) ve araştırma merkezi ($p=0.851$) bakımından da anlamlı fark bulunmamıştır. Tablo 4.12'de aile hekiminden alınan hizmetlere göre hastalık tanılarının karşılaştırılması gösterilmiştir.

Tablo 4.12. Aile Hekiminden Alınan Hizmetlerin Hastalık Tanı Grupları Arasında Karşılaştırılması

| | | | Tanılar | | | | | Top | P _(Ki-kare) |
|---------------------------------------|-----|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------------------|
| | | | Ank | Bab | Dep | Şiz | Diğ | | |
| Psikiyatrik ilaç yazdırma | Yok | n % | 19 28.8 | 5 7.6 | 29 43.9 | 5 7.6 | 8 12.1 | 66 100 | 0.02 |
| | Var | n % | 33 25.6 | 22 17.1 | 43 33.3 | 25 19.4 | 6 4.7 | 129 100 | |
| Ruhsal hastalık için danışmanlık alma | Yok | n % | 32 22.4 | 18 12.6 | 56 39.2 | 23 16.1 | 14 9.8 | 143 100 | 0.036 |
| | Var | n % | 20 38.5 | 9 17.3 | 16 30.8 | 7 13.5 | 0 0 | 52 100 | |
| Bedensel hastalık için gitme | Yok | n % | 15 33.3 | 7 15.6 | 17 37.8 | 4 8.9 | 2 4.4 | 45 100 | 0.505 |
| | Var | n % | 37 24.7 | 20 13.3 | 55 36.7 | 26 17.3 | 12 8.0 | 150 100 | |

(Ank: Anksiyete Bozuklukları, Bab: Bipolar Afektif Bozukluk, Dep: Depresyon, Şiz: Şizofreni, Diğ: Diğer Tanılar, Top: Toplam)

4.6. Psikiyatri Hastalarının Aile Hekiminin Mesleki Becerisi Hakkındaki Düşünceleri

“Aile hekiminin bedensel ve ruhsal hastalıklarla ilgili mesleki becerisini nasıl değerlendirirsiniz” sorusuna verilen cevaplar araştırma merkezlerine, cinsiyete, hastalık tanılarına, yaşa, eğitim seviyesine göre karşılaştırılmıştır.

Araştırma merkezlerine göre aile hekiminin bedensel hastalık becerisi değerlendirildiğinde DYBEAH’ne başvuran hastalar aile hekimlerinin bedensel hastalık becerisini daha iyi bulmuştur (p=0.023). Ruhsal hastalıkla ilgili becerisi her iki merkezde aynıdır. Kadınlar ve erkekler arasında aile hekiminin mesleki becerisiyle ilgili fikirlerinde fark yoktur. Yaşla aile hekiminin mesleki becerisi arasında korelasyon

bulunmamıştır. Daha eğitimli kişiler aile hekiminin bedensel hastalıklar hakkındaki mesleki becerisini daha az bulmaktadır ($p<0.0001$).

4.7. Psikiyatri Hastalarının Aile hekimisi Algısı

Araştırmaya katılan hastalara aile hekimisi ve ruh sağlığı uzmanıyla ilgili tutum ve yargılarını anlamak ve damgalamayı ölçmek için önermeler yöneltilmiş, bu önermelere "Hiç katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, tamamen katılıyorum" şeklinde cevap vermeleri istenmiştir. Hiç katılmıyorum için 1, katılıyorum için 2, kararsızım için 3, katılıyorum için 4, tamamen katılıyorum için 5 puan verilmiştir.

Aile hekimleriyle ilgili tutum ve yargıları içeren bu önermelerde en çok puanı "aile hekimisi mahremiyete saygı gösterir" (4.40) ve "ruhsal şikayetim için aile hekimisine başvurmadan utanmam, çekinmem" (4.27) almıştır. "Aile hekiminin cinsiyeti mesleki becerisini etkiler" (1.79) ve "ruhsal sıkıntılarımı daha yaşlı bir aile hekimisiyle daha rahat paylaşırım" (2.26) ise en az puanı alan önermeler olmuştur.

Her önerme için verilen cevapların ortalaması ve standart sapmasının araştırma merkezlerine göre karşılaştırılması tabloda verilmiştir. HÜTF'ne başvuran hastalar DYBEAH'ne başvuran hastalara göre daha fazla oranda "aile hekiminin dünya görüşünün ruhsal sıkıntılarını paylaşabilmelerini etkilediğini" bildirmişlerdir ($p=0.049$). DYBEAH'ne başvuran hastalar HÜTF'ne başvuran hastalara oranla daha fazla "ruhsal bir sorun için ilk önce aile hekimisine başvururum" cevabını vermiştir ($p=0.006$). Diğer önermeler için araştırma merkezleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur.

"Aile hekiminin ruhsal hastalıklarla ilgili bilgisi yeterlidir", "Ruhsal bir sorun için ilk önce aile hekimisine başvururum" önermelerine katılmayla aile hekiminin ruhsal hastalıklar hakkındaki mesleki becerisini iyi bulma arasında korelasyon vardır.

Tablo 4.13. Aile Hekimleriyle İlgili Tutum ve Yargıların Araştırma Merkezleri Arasında Karşılaştırılması

| | Hacettepe Ort | Dışkapı Ort | P_(MWU) |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Aile hekiminin yaşı arttıkça mesleki becerisi artar. | 3.38 | 3.41 | 0.829 |
| Aile hekiminin cinsiyeti mesleki becerisini etkiler. | 1.78 | 1.79 | 0.872 |
| Ruhsal sıkıntılarımı akranım olan bir aile hekimiyle daha rahat paylaşıyorum. | 2.55 | 2.47 | 0.647 |
| Ruhsal sıkıntılarımı daha yaşlı bir aile hekimiyle daha rahat paylaşıyorum. | 2.34 | 2.15 | 0.181 |
| Ruhsal sıkıntılarımı benimle aynı cinsiyette olan bir aile hekimiyle daha rahat paylaşıyorum. | 2.55 | 2.74 | 0.304 |
| Aile hekiminin dünya görüşü ruhsal sıkıntılarımı paylaşabilmemi etkiler. | 2.71 | 2.33 | 0.049 |
| Aile hekiminin ruhsal hastalıklarla ilgili bilgisi yeterlidir. | 2.84 | 2.93 | 0.367 |
| Aile hekiminin bedensel hastalıklarla ilgili bilgisi yeterlidir. | 3.70 | 3.69 | 0.930 |
| Aile hekimi hastalarına yeterince zaman ayırır. | 3.80 | 4 | 0.082 |
| Aile hekimi mahremiyete saygı gösterir. | 4.35 | 4.46 | 0.178 |
| Ruhsal bir şikayetim olduğunda aile hekimine başvurmaktan utanmam, çekinmem. | 4.19 | 4.37 | 0.240 |
| Ruhsal bir sorun için ilk önce aile hekimine başvururum. | 2.28 | 2.78 | 0.006 |

Kadınlar ve erkekler arasında verilen cevaplar açısından anlamlı farklılıklar vardır. Erkek hastalar daha fazla oranda “ruhsal sıkıntılarını yaşlı bir aile hekimiyle paylaşabileceklerini” ($p=0.002$), kadın hastalar ise daha fazla oranda “ruhsal

sıkıntılarını kendileriyle aynı cinsiyette bir aile hekimiyle paylaşabileceklerini” ifade etmiştir (p=0.001). Kadınlar “aile hekimi mahremiyete saygı gösterir” önermesine erkeklere oranla daha fazla katılmaktadır (p=0.024) ve erkeklere oranla daha fazla oranda “ruhsal sorunlarım için ilk aile hekimine başvururum” cevabını vermişlerdir. Diğer önermeler için erkekler ve kadınlar arasında anlamlı fark bulunmamıştır.

Tablo 4.14. Aile Hekimleriyle İlgili Tutum ve Yargıların Kadınlar ve Erkekler Arasında Karşılaştırılması

| | Erkek Ort | Kadın Ort | P _(MWU) |
|---|-----------|-----------|--------------------|
| Aile hekiminin yaşı arttıkça mesleki becerisi artar. | 3.35 | 3.33 | 0.139 |
| Aile hekiminin cinsiyeti mesleki becerisini etkiler. | 1.76 | 1.80 | 0.689 |
| Ruhsal sıkıntılarımı akranım olan bir aile hekimiyle daha rahat paylaşıyorum. | 2.71 | 2.43 | 0.083 |
| Ruhsal sıkıntılarımı daha yaşlı bir aile hekimiyle daha rahat paylaşıyorum. | 2.60 | 2.09 | 0.002 |
| Ruhsal sıkıntılarımı benimle aynı cinsiyette olan bir aile hekimiyle daha rahat paylaşıyorum. | 2.16 | 2.85 | 0.001 |
| Aile hekiminin dünya görüşü ruhsal sıkıntılarımı paylaşabilmemi etkiler. | 2.65 | 2.50 | 0.533 |
| Aile hekiminin ruhsal hastalıklarla ilgili bilgisi yeterlidir. | 2.80 | 2.92 | 0.241 |
| Aile hekiminin bedensel hastalıklarla ilgili bilgisi yeterlidir. | 3.61 | 3.73 | 0.481 |
| Aile hekimi hastalarına yeterince zaman ayırır. | 3.85 | 3.90 | 0.478 |
| Aile hekimi mahremiyete saygı gösterir. | 4.26 | 4.46 | 0.024 |
| Ruhsal bir şikayetim olduğunda aile hekimine başvurmaktan utanmam, çekinmem. | 4.20 | 4.30 | 0.548 |
| Ruhsal bir sorun için ilk önce aile hekimine başvururum. | 2.20 | 2.64 | 0.013 |

Tablo 4.15 Aile hekimleriyle İlgili Tutum ve Yargıların Hastalık Tanıları Arasında Karşılaştırılması

Tablo 4.15’de aile hekimleriyle ilgili tutum ve yargıların hastalık tanıları arasında karşılaştırması verilmiştir. Hastalık grupları arasında verilen cevaplar açısından farklılık yoktur.

| | Ank | Bab | Dep | Şiz | Diğ | P (KW) |
|---|------|------|------|------|------|--------|
| Aile hekiminin yaşı arttıkça mesleki becerisi artar. | 3.32 | 3.65 | 3.30 | 3.55 | 3.42 | 0.310 |
| Aile hekiminin cinsiyeti mesleki becerisini etkiler. | 1.94 | 1.62 | 1.80 | 1.77 | 1.42 | 0.444 |
| Ruhsal sıkıntılarımı akranım olan bir aile hekimiyle daha rahat paylaşıyorum. | 2.55 | 2.93 | 2.35 | 2.44 | 2.68 | 0.308 |
| Ruhsal sıkıntılarımı daha yaşlı bir aile hekimiyle daha rahat paylaşıyorum. | 2.44 | 2.46 | 2.08 | 2.16 | 2.26 | 0.195 |
| Ruhsal sıkıntılarımı benimle aynı cinsiyette olan bir aile hekimiyle daha rahat paylaşıyorum. | 2.75 | 2.62 | 2.66 | 2.25 | 2.73 | 0.539 |
| Aile hekiminin dünya görüşü ruhsal sıkıntılarımı paylaşabilmemi etkiler. | 2.61 | 2.96 | 2.31 | 2.86 | 2.31 | 0.100 |
| Aile hekiminin ruhsal hastalıklarla ilgili bilgisi yeterlidir. | 2.74 | 3.03 | 2.98 | 3.05 | 2.42 | 0.061 |
| Aile hekiminin bedensel hastalıklarla ilgili bilgisi yeterlidir. | 3.66 | 3.81 | 3.71 | 3.80 | 3.36 | 0.337 |
| Aile hekimi hastalarına yeterince zaman ayırır. | 3.71 | 4.25 | 3.88 | 4.2 | 3.42 | 0.055 |
| Aile hekimi mahremiyete saygı gösterir. | 4.31 | 4.65 | 4.36 | 4.41 | 4.52 | 0.171 |
| Ruhsal bir şikayetimin olduğunda aile hekimine başvurmadan utanmam, çekinmem. | 4.29 | 4.09 | 4.32 | 4.19 | 4.31 | 0.868 |
| Ruhsal bir sorun için ilk önce aile hekimine başvururum. | 2.63 | 2.46 | 2.58 | 2.27 | 2 | 0.358 |

(Ank: Anksiyete Bozuklukları, Bab: Bipolar Afektif Bozukluk, Dep: Depresyon, Şiz: Şizofreni, Diğ: Diğer Tanılar, Top: Toplam)

Hastaların ruh sađlıđı uzmanlarıyla ilgili önermelere verdikleri cevaplar araştırma merkezleri, cinsiyet ve ruhsal hastalık tanıları arasında karşılaştırılmıştır. Tablo 4.16'da verilen cevaplar araştırma merkezlerine göre karşılaştırılmıştır. Verilen cevaplarda her iki merkez arasında anlamlı fark yoktur.

Tablo 4.16. Ruh Sađlıđı Uzmanı ile İlgili Önermelerin Araştırma Merkezleri Arasında Karşılaştırılması

| | Hacettepe Ort | Dışkapı Ort | P_(MWU) |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Ruhsal bir sorun için ilk önce psikiyatru başvururum. | 4.23 | 4.11 | 0.298 |
| Ruhsal bir Őikayetim olduđunda psikiyatru başvurmaktan utanmam, çekinmem. | 4.46 | 4.44 | 0.984 |
| Psikiyatru'nun dünya görüşü ruhsal sıkıntılarımı paylaşabilmemi etkiler. | 2.63 | 2.37 | 0.231 |

Tablo 4.17'de önermelere verilen cevaplar kadınlar ve erkekler arasında karşılaştırılmıştır. Kadınlar ve erkeklerin ruh sađlıđı uzmanı ile ilgili düşüncelerinde fark yoktur.

Tablo 4. 17. Ruh Sađlıđı Uzmanı ile İlgili Önermelerin Kadınlar ve Erkekler Arasında Karşılaştırılması

| | Erkek Ort | Kadın Ort | P_(MWU) |
|---|------------------|------------------|--------------------------|
| Ruhsal bir sorun için ilk önce psikiyatru başvururum. | 4.26 | 4.14 | 0.278 |
| Ruhsal bir Őikayetim olduđunda psikiyatru başvurmaktan utanmam, çekinmem. | 4.34 | 4.50 | 0.191 |
| Psikiyatru'nun dünya görüşü ruhsal sıkıntılarımı paylaşabilmemi etkiler. | 2.54 | 2.50 | 0.793 |

Ruhsal hastalık tanılarına göre verilen cevaplar tablo 4.18’de görülmektedir. Hastalık tanıları arasında karşılaştırma yapıldığında ruh sağlığı uzmanı ile ilgili yargılar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır.

Tablo 4.18. Ruh Sağlığı Uzmanı ile İlgili Önermelerin Ruhsal Hastalık Tanıları Arasında Karşılaştırılması

| | Ank | Bab | Dep | Şiz | Diğ | P (Kruskal-Wallis) |
|--|------|------|------|------|------|--------------------|
| Ruhsal bir sorun için ilk önce psikiyatra başvururum. | 4.20 | 4.25 | 4.09 | 4.22 | 4.31 | 0.874 |
| Ruhsal bir şikayetim olduğunda psikiyatra başvurmadan utanmam, çekinmem. | 4.41 | 4.56 | 4.46 | 4.33 | 4.57 | 0.766 |
| Psikiyatrin dünya görüşü ruhsal sıkıntılarımı paylaşabilmemi etkiler. | 2.49 | 3 | 2.24 | 2.94 | 2.47 | 0.072 |

(Ank: Anksiyete Bozuklukları, Bab: Bipolar Afektif Bozukluk, Dep: Depresyon, Şiz: Şizofreni, Diğ: Diğer Tanılar, Top: Toplam)

Damgalamayı ölçmek için hastalara sunulan önermeler araştırma merkezleri, (Tablo 4.19) kadınlar ve erkekler arasında (Tablo 4.20) karşılaştırılmıştır. Araştırma merkezleri arasında ve cinsiyetler arasında verilen cevaplar açısından fark yoktur.

Tablo 4.19. Damgalama ile İlgili Önermelerin Araştırma Merkezleri Arasında Karşılaştırılması

| | Hacettepe Ort | Dışkapı Ort | P (MWU) |
|---|--------------------------|------------------------|----------------|
| İnsanların bir ruhsal hastalığının olduğunu bilmesi/düşünmesi beni rahatsız eder. | 3.23 | 4.01 | 0.893 |
| Ailem beni ruhsal hastalığının tedavisinde destekler | 4.01 | 3.78 | 0.060 |
| Eskiye göre insanlar ruhsal hastalıkları için doktora giderken daha rahatlar. | 4.01 | 3.86 | 0.146 |

Tablo 4.20. Damgalama ile İlgili Önermelerin Kadınlar ve Erkekler Arasında Karşılaştırılması

| | Erkek Ort | Kadın Ort | P (MWU) |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| İnsanların bir ruhsal hastalığının olduğunu bilmesi/düşünmesi beni rahatsız eder. | 3.40 | 3.14 | 0.258 |
| Ailem beni ruhsal hastalığının tedavisinde destekler | 4.03 | 3.86 | 0.185 |
| Eskiye göre insanlar ruhsal hastalıkları için doktora giderken daha rahatlar. | 3.89 | 3.98 | 0.269 |

Tablo 4.21’de damgalamayla ilgili önermelere verilen cevapların hastalık tanıları arasındaki karşılaştırmaları gösterilmiştir. Damgalamayla ilgili önermelere verilen cevaplarda ruhsal hastalık tanıları arasında farklılık gözlenmiştir. Bipolar afektif bozukluk ve şizofreni tanı grubundaki hastalar daha fazla oranda “insanların bir ruhsal hastalığının olduğunu bilmesi/düşünmesi beni rahatsız eder” cevabını vermişlerdir ($p=0.008$). Diğer iki önerme için hastalık tanıları arasında istatistiksel

anlamli fark bulunmamıştır.

Tablo 4.21 Damgalama ile İlgili Önergelerin Ruhsal Hastalık Tanı Grupları Arasında Karşılaştırılması

| | Ank | Bab | Dep | Şiz | Diğ | P(Kruska II-Wallis) |
|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| İnsanların bir ruhsal hastalığının olduğunu bilmesi/düşünmesi beni rahatsız eder. | 3.05 | 3.78 | 3.05 | 3.83 | 2.78 | 0.013 |
| Ailem beni ruhsal hastalığımın tedavisinde destekler | 3.84 | 4.18 | 3.72 | 4.25 | 4.21 | 0.113 |
| Eskiye göre insanlar ruhsal hastalıkları için doktora giderken daha rahatlar. | 3.92 | 4.03 | 4.01 | 3.72 | 4.05 | 0.274 |

(Ank: Anksiyete Bozuklukları, Bab: Bipolar Afektif Bozukluk, Dep: Depresyon, Şiz: Şizofreni, Diğ: Diğer Tanılar, Top: Toplam)

5. TARTIŞMA

Bu çalışmada, ruhsal şikayetleri olan hastaların ruh sağlığı hizmetlerine ulaşma yolları araştırılmıştır. Üçüncü basamak psikiyatri polikliniklerine başvurmuş olan hastalar üzerinde yürüttüğümüz çalışmada, hastaların bu hizmete ulaşım süreçlerinin yanı sıra ulaşım yolunda aile hekimliği uygulamasını ne oranda kullandıkları incelenmiş, ruhsal şikayeti olan hastaların ruhsal ve bedensel hastalıklarının tedavisi konusunda aile hekimleri ile ilgili yargı ve tutumları değerlendirilmiştir. Bulgularımız, örneklemin özellikleri, ruh sağlığı hizmetine ulaşım yolları, ruhsal hastalığı olanların doktora başvuruda gecikmesi, hastaların aile hekimliği uygulamasını kullanımı ve aile hekimiyle ilgili tutum ve yargılar başlıkları altında incelenecektir.

5.1. Örneklemin Özellikleri

Çalışmamızın örneklemini üçüncü basamak psikiyatri polikliniklerine başvurmuş hastalar oluşturmaktadır. Araştırmamızın yürütüldüğü iki araştırma merkezi hem buldukları semt hem de başvuran kişilerin sosyoekonomik durumları açısından farklılık arz etmektedir. Çalışmamıza katılan hastaların sosyodemografik özellikleri karşılaştırıldığında bu klinik gözlemimizin istatistiksel olarak da desteklendiğini, üniversite hastanesine başvuranların eğitim durumu ve aylık gelir düzeyi açısından daha iyi seviyede olduğunu belirledik. Bu durum büyük olasılıkla iki hastanenin kentin farklı sosyoekonomik kesimlerine hitap etmesiyle ilgilidir. Bu çeşitlilik çalışmamızın örneklemini güçlendirmiş olup çeşitli sosyoekonomik düzeylerde hastalara ulaşma imkanı tanımıştır. İki merkeze başvuranlar arasında farklılıklar bulunması nedeniyle tüm analizlerimizi iki merkez açısından karşılaştırmaya karar verdik.

Örnekleminin cinsiyet dağılımına bakıldığında kadınların erkeklerden iki kat daha fazla sayıda olduğu görülmüştür. Bu duruma ruhsal hastalıkların kadınlarda daha sık görülmesi ve kadınların erkeklere göre ruhsal hastalıkları için daha fazla yardım araması neden olmuş olabilir. Yapılan çalışmalarda kadınların ruhsal sorunları için erkeklere göre daha fazla yardım aradığı belirlenmiştir (32,37). Toplum temelli

çalıřmalar yaygın anksiyete bozukluęu, depresyon, özgül fobiler, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluęu gibi yaygın görölen ruhsal hastalıkların kadınlarda daha sık göröldüęünü ortaya koymuřtur (38). Türkiye Ruh Saęlıęı Profili raporuna göre alkol ve madde kullanım bozuklukları dıřında dięer tüm ruhsal hastalıklar kadınlarda daha sık görölmektedir (15). Giriř bölümünde özetlenen çalıřmaların tümünde ruh saęlıęı hizmetine bařvuran kadınların oranı erkeklerden fazladır.

Çalıřmamızda kadınların eęitim düzeyinin daha düşük olduęu ve gelir getiren iřte çalıřma oranlarının daha az olduęu saptanmıřtır. Her ne kadar düşük eęitimin ruhsal hastalıklar için bir risk faktörü olduęu bilinse de, arařtırmamız epidemiyolojik bir çalıřma olmadıęı için örneklemeimiz toplum genelini veya psikiyatrik hasta grubunun genelini yansıtmaya iddiasında deęildir.

Çalıřmamızda son bir yıl içinde herhangi bir řikayet nedeni ile en az bir kez aile hekimine bařvurusu olanların bařvurmayanlara göre daha yařlı olduęu (ortalama yař=40.7) görölmüřtür. Türkiye’de yapılan çalıřmalarda aile hekimine bařvuranların yař ortalaması 42.8 olup bulgularımıza benzerlik göstermektedir (39,40). Tüm hastalık nedenleri için aile hekimine bařvuran 1697 kiřilik bir çalıřmada kadınların ve yařlıların aile hekimine daha çok bařvurduęu gösterilmiřtir (40). Ayrıca bedensel hastalıęı olanların olmayanlara göre aile hekimine bařvuru oranı da fazladır. Bekleneceęi üzere bedensel hastalıkların yařla beraber artması aile hekimine gitme sayısını artırmaktadır.

Arařtırmamızda toplam 265 hastayla görüřme yapılmıřtır. Bu sayı ruh saęlıęı hizmetlerine ulařım yollarını inceleyen çalıřmaların birçoęuna oranla daha büyük bir örneklemdir. Görüřtüęümüz hastaların tanı daęılımı da birçok çalıřmadakine benzerlik göstermektedir. Her ne kadar örneklemeimiz genel toplumdaki alınmamıř olsa da, örneklemin özelliklerinin birçok çalıřmayla benzerlikler göstermesi, sonuçlarımızı genellemyebileceęimizi düşündürmektedir. Ankara kent merkezinde

yapılmış olması nedeniyle tüm ülkedeki durumu yansıtmıyor olabilir, ancak Ankara'dan farklı sosyoekonomik kesimleri içermesi temsil gücünü arttırmaktadır.

5.2. Hastaların Ruh Sağlığı Hizmetlerine Ulaşım Yolları

Araştırmamıza katılan 265 kişiden sadece 18'i (%6.8) ruhsal sorunları için ilk başvurduğu kişinin aile hekimi olduğunu belirtmiştir. Başvuranların büyük çoğunluğu doğrudan psikiyatri hekimine başvurmuş olup, (%54.3) ikinci sırada ise diğer uzmanlar gelmektedir (%26). Dini şifacılar başvuru oranı ise %12.8 olarak bulunmuştur.

Üçüncü basamak psikiyatri polikliniğine başvuranlarda yapılan bir çalışmada ruhsal hastalık için ilk başvuru noktası olarak aile hekimini tercih eden hastaların oranı %3.8'dir (7). Üçüncü basamağa başvuranlarla yapılan bir diğer çalışmada ruh sağlığı hizmeti için ilk başvuru yeri %4.3 oranında birinci basamaktır (8). Bu oranlar çalışmamızdaki aile hekimine başvuru oranıyla benzerlik göstermektedir. Bu iki çalışmada psikiyatriye ve diğer uzmanlara yapılan başvuru yüzdesi verilmediğinden çalışmamızın diğer verileriyle karşılaştırma yapılamamıştır.

1994 yılında Ankara'da yapılan ruh sağlığı hizmetine ulaşım yolları çalışmasında katılımcıların %50'si psikiyatriye, %42'si başka uzmanlara, %5'i ise pratisyen hekimlere, %1'i polise, %1'i ise dini şifacılar başvurmuştur. Bu çalışmadaki psikiyatriye doğrudan başvuru ve birinci basamağa başvuru oranları çalışmamızla benzerlik göstermektedir (6); ancak başka uzmanlara ve dini şifacılar başvuru oranında farklılıklar vardır. 1998 yılında Erzurum'da yapılan çalışmada ise ilk başvuru merkezi %43.2 başka uzman, %23.5 pratisyen hekim, %18.6 ise psikiyatridir (31). Erzurum ve Ankara çalışmaları arasındaki belirgin fark bölgedeki psikiyatri uzman sayısının başvuru yolunu etkilediğini düşündürmektedir. Ankara kent merkezinde çok fazla hastane olması, psikiyatri doktoruna ulaşmanın kolaylığı, aile hekiminin ilk başvuru noktası olarak tercih edilmemesinin bir nedeni olabilir. Türkiye Ruh Sağlığı Profili çalışmasında ruhsal şikayetler nedeniyle birinci basamağa başvuru oranı

%20.7'dir. Bu çalışma toplum temelli bir çalışma olup örnekleme tüm ülkeyi yansıtmaktadır. Ayrıca çalışmamızın deseni gereği aile hekimlerine başvurup, tedavisini aile hekimiyle sürdüren hastalar hakkında bilgimiz bulunmamaktadır. Gerçekte aile hekimine başvuru oranı daha yüksek olabilir.

Araştırmanın yapıldığı iki hastane arasında ilk başvuru yeri tercihi açısından fark yoktur. İki merkeze başvuran hastaların sosyoekonomik düzeyleri farklı olsa da başvuru tercihi açısından fark olmaması önemlidir. Bu durum başvuru tercihini başka faktörlerin belirlediğini düşündürmektedir. Başvuru tercihi üzerinde eğitim ve cinsiyetin etkisi olup olmadığı da incelenmiştir. İstatistiksel anlamlılığa ulaşmasa da daha eğitilmiş olanların ilk başvuru yeri olarak psikiyatriyi seçme eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir.

İlk başvuru noktası aile hekimi olanlar arasında, kadınların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görülmektedir. Kadınlar ayrıca, erkeklere oranla, diğer uzmanlara da daha fazla başvurumaktadırlar. Bu durumun, kadınlarda anksiyete tanısının daha fazla olması ve anksiyetenin çarpıntı, nefes darlığı gibi bedensel şikayetler oluşturması ile ilgisi olabilir. Anksiyete bozuklukları grubu hastalarının hastalıklarını daha hafif olarak görmesi, daha kolay tedavi edilebilen bir hastalık olarak düşünmeleri, anksiyete hastalıkları konusunda aile hekiminin becerisine güvenilmesi daha çok başvurularını açıklayabilir.

Çalışmamızda "Aile hekiminin ruhsal hastalıklar hakkındaki bilgisi yeterlidir." önermesine tüm tanı grupları benzer cevaplar vermişlerdir. "Aile hekimi hastalarına yeterince zaman ayırır." önermesine, anksiyete bozuklukları hasta grubu, bipolar afektif bozukluk grubundan ve şizofreni grubundan daha az puan vermiştir. Tüm bunlara rağmen anksiyete bozuklukları hastaları aile hekiminden daha çok danışmanlık almıştır. Bu durum anksiyete bozuklukları hastalarının aile hekimine daha çok başvurmasıyla ya da aile hekimlerinin anksiyete bozuklukları konusunda daha fazla bilgisiyle ilgili olabilir.

Diğer hastalık gruplarına göre daha ciddi sayılabilecek şizofreni, bipolar afektif bozukluk gibi ruhsal hastalık gruplarının ilk başvuru noktası olarak aile hekimini seçme oranları çok düşüktür. Şizofreni ve bipolar afektif bozukluk hastalıklarının belirtileri gereği toplum tarafından daha kolay tanınması, psikotik belirtileri olan ya da kendisine ve çevresine zarar verebilecek durumda olan hastaların; ailesi, çevredekiler ya da polis tarafından doktora getirilmesi, bu tanılara sahip hastaların ilk başvurusunun aile hekimine olmamasını açıklayabilir. Nitekim daha önce yapılan bir çalışmada şizofreni hastalarının diğer hastalara göre psikiyatrye doğrudan başvurusunun daha fazla olduğu gösterilmiştir (27). Şizofreni ve bipolar afektif bozukluk hastaları çevresindeki, mahallesindeki insanların hastalıklarını öğrenmesini istemediklerinden aile hekimine başvuruyor olabilirler.

Aile hekimlerinin ilk başvuru merkezi olarak tercih edilmemesinin birçok nedeni olabilir. Urgan ve ark.nın yaptığı çalışmada hastaların yarısı, sadece psikiyatri hekiminin ruhsal sağlık hizmeti verebileceğini söylemiştir. Hastaların %20'si ise aile hekimlerinin ruhsal sağlık hizmeti verebildiğini bilmediğini bildirilmiştir (8). Özden ve ark.nın çalışmasında ise hastaların %52'si ruhsal hastalıkların tedavisinde aile hekimine güvenmediklerini belirtmiştir (7). Benzer şekilde ruhsal hastalıklar konusunda aile hekimine güvenmeme oranı Gültekin ve ark.nın çalışmasında da %58 bulunmuştur (36). Çalışmamızda "aile hekiminin ruhsal hastalıklarla ilgili bilgisi yeterlidir" önermesine verilen cevabın "katılmıyorum" ya da "kararsızım"da yoğunlaşması önceki çalışmaları desteklemektedir. Bu durum, aile hekimine başvuramada, aile hekiminin ruhsal hastalıklar konusundaki mesleki becerisine güvenmemenin önemli bir etken olduğunu göstermektedir. Hastaların aile hekiminin ruh sağlığı hizmeti verdiğini bilmemesi de başvurmaya engel bir nedendir.

Türkiye'de sevk sisteminin olmayışı ve üçüncü basamağa doğrudan başvurabilme, aile hekimine başvuruları azaltmış olabilir. Ruh sağlığına ulaşım yolu çalışmalarında sevk sistemi olmayan ülkelerde psikiyatrye doğrudan başvuru oranı

yüksektir. Sevk sistemi olan İngiltere, Nepal, Kenya ve Çek Cumhuriyeti'nde birinci basamağa başvuru oranı %70-80'lere çıkmaktadır (25,30).

Aile hekimlerinin görev ve sorumluluklarının yeterince açık olmaması, psikotrop ilaç reçetelemeyle ilgili yetkilerinin değişikliklere uğraması hastalarda sağlık sistemi kullanım alışkanlıklarının yerleşmesine engel olmaktadır. Daha önceki çalışmalarda da birinci basamağa başvurunun az olmasının, birinci basamak hekiminin tedaviler konusundaki yetkisinin az ya da belirsiz oluşundan kaynaklandığı belirtilmektedir (30).

İlk başvuru merkezi olarak dini şifacıların %12.8 oranında tercih edilmesi dikkat çekicidir. Şizofreni hastalarının üçte biri ilk başvuru merkezi olarak dini şifacıları tercih etmiş olsa da, ilk başvuru merkezi dini şifacılar olan hastaların tanıları arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. Tüm hastaların yaklaşık üçte birlik kısmı, ruhsal şikayetleri için dini şifacılara başvurmuşlardır. Şizofreni hastaları diğer hastalara göre daha çok dini şifacılara başvurmuştur. Varsanların, dini öğelere benzetilmesi şizofreni hastalarının daha çok dini şifacılara başvurmasını açıklayabilir. Dini şifacılara başvurmayla eğitim, cinsiyet, yaş, aylık gelir arasında ilişkinin olmaması şaşırtıcıdır. Tedaviden fayda görmeyen hastaların alternatif olarak bu yola başvurduğu düşünülmüştür.

5.3. Ruhsal Hastalıklarda Doktora Başvuruda Gecikme

Ruhsal hastalıkların çok yaygın olmalarının yanı sıra toplum üzerindeki hastalık yükünün pek çok bedensel hastalıktan daha fazla olduğu bilinmektedir. Ruhsal hastalıklar ciddi oranda işten güçten kalmaya, hatta ölüme yol açabilmektedir. Bu gerçekler göz önüne alındığında, tedaviye başvurmakta geç kalınmasının hem bireysel, hem de toplumsal düzeyde büyük kayıplara yol açacağı açıktır.

Araştırmamızda hastaların %61'i şikayetleri başladıktan en az bir ay sonra doktora başvurmuştur. Bir ruhsal şikayet ile herhangi bir tedaviciye başvuru için geçen ortalama süre 22 aydır. Bu süre 0-360 ay arası değişmektedir. 23 ülkede yapılan bir çalışmada ülkelerin çoğunda hastalar 3 aydan daha kısa sürede doktora başvurmuşlardır (30). Bu durum ülkemizin ruh sağlığına ulaşımında sorunlar yaşadığını göstermektedir.

Tedaviye başvuru gecikmesi ile araştırmanın yürütüldüğü merkezler, eğitim ve cinsiyetin etkisi arasındaki ilişki incelenmiştir. Her iki çalışma merkezine başvuran hastalar arasında gecikme açısından anlamlı fark saptanmamıştır. İki merkez açısından sosyodemografik farklılıklara rağmen hem ilk başvuru tedavici tercihleri hem de gecikme farkı olmaması, bu konudaki etkili faktörlerin sosyodemografik özelliklerden bağımsız olduğunu düşündürmektedir. Nitekim, eğitim ve gelir düzeyi ile gecikme arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Literatürdeki eğilim kadınların ruhsal şikayetleri için daha erken yardım araması iken, çalışmamızda kadınlarla erkekler arasında başvuruda gecikme arasında fark yoktu.

Doktora başvurudaki gecikme süresi ruhsal hastalık tanısı ile ilişkili bulunmuştur. Bipolar afektif bozukluk ve şizofreni tanısı olan hastaların diğer hastalara göre doktora daha çabuk ulaştığı tespit edilmiştir. Bipolar afektif bozukluk tanılı hastaların doktora başvuruya kadar geçen süre ortalaması 5 ay, şizofreni hastalarının ortalaması 7 ay iken, bu sayı anksiyete bozuklukları için 25 ay, depresyon hastaları için 30 ay, diğer tanı grubu için ise 32 aydır. Daha önce de tartışıldığı gibi şizofreni ve bipolar afektif bozukluk tanılı hastaların doktora erken başvurusunun sebebi hastalığın kolay tanınması, belirtilerinin aciliyet göstermesi, diğer hastalıklara göre daha ağır seyretmesi olabilir. Psikotik ya da manik semptomları olan kişiler, başkaları tarafından hastaneye getirildiklerinden sağlık hizmetlerine ulaşımının daha hızlı olması anlaşılabilir.

Depresyon hastalığının doğası gereği hastanın dışarı çıkmaya, yardım aramaya isteksiz oluşu, depresyon hastalarının başvuruda gecikmesine yol açıyor olabilir. Hem hastanın hem de yakınlarının hastalığı tanımaması ya da hastanın yalnız yaşaması ve sosyal desteğinin olmaması gecikme süresini artırabilir. Hastalığın şiddeti de başvurudaki gecikmeyi etkileyebilir. Günlük işleri etkilemeyecek şiddette olan hastalıkların başvuruda gecikmesi muhtemeldir.

Diğer tanı grubundaki gecikmenin sebebi bu gruptaki hastalarda alkol ve madde kullanım bozukluğu hastalarının olması olabilir. Alkol ve madde bozuklukları doktora geç başvurmaktadır. ABD’de yapılan epidemiyolojik bir çalışmada alkol ve madde bağımlılığı olan hastaların sadece %20’si ilk bir yıl içinde doktora başvururken ortalama gecikme süresi 5 yıl olarak bulunmuştur. Aynı çalışmada özgül fobiler ve sosyal fobinin ortalama gecikme süresi ise 20 yıldır (41).

Anksiyete bozuklukları grubunun içindeki özgül fobi hastaları, fobilerin erken yaşta ortaya çıkma eğilimi ve kişinin günlük yaşamını çok da etkilememesi nedeniyle başvuruda gecikmiş olup, gecikme ortalamasını artırmış olabilirler. Yaygın anksiyete bozukluğu hastaları somatik yakınmalarla başka doktora başvurur ve psikiyatriye ulaşmada zaman kaybeder. Hastalığın tanınması, hem doktor hem hasta açısından zorlayıcı olabilir.

Hastaların belirttiği gecikme nedenlerine baktığımızda hastaların tutumlarının yapısal nedenlerden daha fazla önem taşıdığı görülmüştür. Hastaların yaklaşık yarısı sorununu kendi halletmek istediği için geciktiğini bildirmiştir. “Sorunun kendiliğinden kaybolacağını düşündüm” ise ikinci en sık verilen cevaptır. Tedavinin maddi yük getireceğini düşünmek, ulaşım sorunları, başka bir yere taşınmak gibi yapısal gecikme nedenleri çok az bildirilmiştir. Literatürdeki gecikme nedenlerine bakıldığında sonuçlar bulgularımızla benzerlik göstermektedir. Andrade ve ark.nın 25 ülkede yaptığı çalışmada “sorunu kendim halletmek istedim” cevabını verenlerin oranı %63.8’dir (32).

Araştırma merkezlerine göre gecikme nedenleri karşılaştırıldığında HÜTF'ne başvuranların daha çok gecikme nedeni olarak "randevu alamamak" cevabını verdiği görülmüştür. Sevk sisteminin olmadığı düşünüldüğünde, hastaların doğrudan başvuruları üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde aşırı yük oluşturmaktadır. HÜTF'ne başvuran hastalar "kendi iradem dışında hastaneye yatırılmaktan korkmak" cevabını DYBEAH'ne başvuranlara göre daha fazla bildirmişlerdir. HÜTF'ne başvuranlarda şizofreni ve bipolar afektif bozukluk tanısı daha fazladır. Bu hastaların gerektiğinde vasi tayin edilerek hastaneye yatırılabilir olması bu sonuca neden olmuş olabilir.

Hastalık tanısına göre gecikme nedenleri analiz edilmiş ve "diğer hastalıklar" tanı grubu geri kalan hastalara göre "şikayetim çok da rahatsız etmemesi" cevabını daha çok vermişlerdir. Diğer hastalıklar grubunda alkol ve madde kullanım bozukluğu hastaları mevcuttur. Alkol ve madde kullanım bozukluğunun hastalığın başlangıcında hastayı rahatsız etmemesi ya da bir hastalık olarak görülmemesi bu cevabın daha fazla oranda verilmesine neden olmuş olabilir.

Bir işte çalışanlar çalışmayanlara göre daha fazla oranda gecikme sebebi olarak "tedavinin çok zaman alacağını düşünmek" cevabını vermiştir. Çalışan kişilerin zamanının daha az olabileceği düşünüldüğünde sonuç şaşırtıcı değildir.

5.4. Psikiyatri Hastalarının Aile Hekimliği Uygulamasını Kullanım Durumları

Aile hekimliği uygulamasını kullanan hastaların aldığı hizmetler psikiyatrik ilaçların yazılması, ruhsal hastalık hakkında danışmanlık alınması, bedensel hastalıklar için şeklinde belirlenmiştir. Şizofreni tanı grubunun diğer tanı gruplarına göre ilaç yazdırmak için aile hekimine daha çok gittiği görülmüştür. Kadınlarla erkekler arasında hizmet kullanım açısından fark yoktur. Anksiyete bozuklukları tanı grubu aile hekiminden daha fazla danışmanlık almıştır. Buna neden olabilecek durumlar daha önce tartışılmıştır. Bedensel hastalık için başvurma oranı %76.9 olup karşılaştırılan tanı ve cinsiyet grupları arasında fark yoktur.

5.5 Psikiyatri Hastalarının Aile Hekimi Hakkında Tutum ve Yargıları

Hastaların büyük çoğunluğu, "aile hekimi mahremiyete saygı gösterir" ve "ruhsal bir şikayetim olduğunda aile hekimine başvurmaktan utanmam, çekinmem" önermelerine "katılıyorum" ya da "tamamen katılıyorum" şeklinde cevap vermiştir. Bu durum aile hekimlerine başvurunun az oluşunun damgalamayla ilgili olmadığını düşündürmüştür. HÜTF'ne başvuran hastalar aile hekiminin dünya görüşünün ruhsal sıkıntılarını paylaşabilmelerini etkileyebileceğini DYBEAH'ne başvurularına göre daha fazla bildirmiştir. Kadınlar kendileriyle aynı cinsiyette bir aile hekimiyle ruhsal sıkıntılarını daha rahat paylaşabileceğini bildirirken, erkekler daha yaşlı bir aile hekimiyle ruhsal sıkıntılarını daha rahat paylaşabileceğini bildirmiştir.

6.SONUÇ VE ÖNERİLER

Ruh sađlıđı hizmetlerinin planlanmasında aile hekiminin çok önemli bir yer tuttuđu sadece ülkemizde deđil tüm dünyada sađlık planlayıcılarının üzerinde uzlaştıđı bir konudur. Ülkemizde sađlık bakanlıđının bu konuya verdiđi önem Ulusal Ruh Sađlıđı Eylem Planı'nda ortaya konmuştur. Tüm bu çabalar ve planlara rađmen, ruhsal hastalıđı olan kişilerin ruhsal sorunları için ilk başvuru noktası olarak aile hekimini tercih etmiyor olması, araştırmamızın en önemli bulgularından biridir. Bu bulgu yalnızca araştırmamıza özgü deđildir; geçmişteki çalışmalarda saptanan oranlar da benzer bir tabloyu ortaya koymaktadır. Özellikle kent merkezlerinde, uzman hekim ve psikiyatri hekimine ulaşma imkanlarının nispeten daha kolay olduđu yerlerde, ruhsal hastalıđı olanlar ruhsal şikayetleri için şifacı hocaları aile hekiminden de daha fazla sıklıkla tercih etmektedirler. Bulgularımız, aile hekimine gitme oranının düşük olduğunu göstermemektedir. Nitekim son bir yılda araştırmamıza katılan hastaların büyük bir çođunluđu ilaç yazdırmak için veya bedensel hastalıkları için aile hekimlerine başvurmuştur. Sorun, aile hekiminin ruhsal sorun için ilk başvuru seçeneđi olarak görülmemesidir. Aile hekimine başvuru oranlarının arttırılması gerektiđi açıktır. Bunu sađlayabilmek için aile hekimine başvurmama nedenlerinin iyi bilinmesi gerekir. Nedenleri kesin olarak saptamak için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olsa da, bulgularımız bu konuda ipuçları sađlamaktadır. Ruhsal hastalıđı olan kişilerin, aile hekiminin ruhsal hastalıkların tedavisi konusundaki yetkileri, tedavi yetkinliđi gibi alanlarda yeterince bilgili veya güvenli olmadığı görölmektedir. Aile hekimlerinin ruhsal hastalıkların tedavisi konusunda yetkinleşmesini sađlayacak eğitimlerin sürekliliđinin sađlanması, yasal yetki ve sorumluluklarındaki belirsizliklerin ortadan kaldırılması, aile hekimlerinin ruhsal hastalıklar konusunda güvenle başvurulacak kişiler olduđu bilgisini yerleştirecek bir toplum eğitimi seferberliđinin başlatılması çözüm konusunda ilerleme sađlayabilir.

Tedaviye başvuru gecikmesi konusunda ülkemizdeki durum, birçok Avrupa ülkesine oranla daha kötüdür. Ruhsal hastalıkların ağır toplumsal yükü göz önüne

alındığında tedavideki gecikmenin maliyeti anlaşılabilir. Sevindirici olan, tedaviye gecikme konusunda yapısal nedenlerden çok tutumla ilgili nedenlerin önem taşımasıdır. Bir başka deyişle, tedaviye başvurmada gecikme maddi imkansızlıklara, doktorun olmamasına, zaman olmamasına değil, hastaların ruhsal sorunları bir hastalık olarak adlandırmaması, yani ihtiyaç hissetmemesi, kendi başlarına çözmek istemesi, ya da damgalanmaktan korkmasına bağlıdır. Tutumla ilgili sorunların çözümü yapısal sorunlara oranla daha kolaydır. Bir başka sevindirici bulgu, aile hekimine başvurunun gecikmeyle ilişkisinin olmamasıdır. Yani aile hekimine başvurmak, tedaviyi geciktiren bir faktör değildir. Bu nedenle, ruhsal hastalıkların etkili tedavilerinin olduğu, bu tedavilerin önemli bölümünün birinci basamakta yapılabileceği konusunda toplum eğitime öncelik vermek, aile hekiminin ruhsal tedavi yetkinliklerini arttırmak, bu konudaki yetki ve sorumluluklarını netleştirmek, aile hekimine başvuru konusunda damgalanma korkusunun nedenlerini ortaya çıkararak, bunu azaltıcı önlemler üzerinde çalışmak toplum ruh sağlığına önemli bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz.

7.KAYNAKÇA

1. Wang, P. S., Aguilar-Gaxiola, S., Alonso, J., Angermeyer, M. C., Borges, G., Bromet, E. J., ... & Haro, J. M. (2007). Use of mental health services for anxiety, mood, and substance disorders in 17 countries in the WHO world mental health surveys. *The Lancet*, 370(9590), 841-850.
2. Whiteford HA, Ferrari AJ, Degenhardt L, Feigin V, Vos T. The global burden of mental, neurological and substance use disorders: An analysis from the global burden of disease study 2010. *PLoS One*. 2015;10(2):1–14.
3. Kılıç C, Erol N, Ulusoy M, Keçeci M, Şimşek Z. Türkiye Ruh Sağlığı profili: Erişkin nüfusla ilgili sonuçlar. Türkiye Ruh Sağlığı Profili, Ön Rapor Erol N, Kılıç C, Ulusoy M, Keçeci M, Şimşek ZT Ankara, Aydoğdu Ofset, TC Sağlık Bakanlığı 1997
4. TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sağlığı Politikası. 2006.
5. TC Sağlık Bakanlığı. Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı. 2011.
6. Kılıç, C., Rezaki, M., Üstün, T. B., & Gater, R. A. (1994). Pathways to psychiatric care in Ankara. *Social psychiatry and psychiatric epidemiology*, 29(3), 131-136.
7. Özilice Ö, Uçku R, Akdede BB. Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine ayaktan başvuranların birinci basamak kullanım durumları ve etkileyen etmenler. *Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*. 2017;31(2):63–9.
8. Urgan U, Çağlayan Ç. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Ruhsal Hastalıklar İçin İlk Başvuru Yerlerinin Ve Birinci Basamağı Tercih Etmeme Nedenlerinin Belirlenmesi. *Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilim Dergisi* 2016;4(1):5–10.
9. World Health Organization, World Health Organization, & ... UNAIDS. (2001). *World health report 2001: Mental health: New understanding, new hope*. World Health Organization.
10. World Health Organization. Mental health: a state of well-being. p. http://www.who.int/features/factfiles/mental_health.
11. World Health Organization. (2012). Risks to mental health: An overview of vulnerabilities and risk factors. *Geneva: WHO*.
12. World Health Organization. The Mental Health Context. *Ment Health Policy Service Guidance Package*. 2003;1–46.
13. World Health Organization. (2009). *Improving health systems and services for mental health*.
14. Kessler RC, Angermeyer M, , James C. Anthony , Ron De Graaf, Koen, Demyttenaeres, Isabelle, Gasquet Girolamo, Giovanni de, Semyon Gluzman, Oye Gureje, Haro Josep Maria, Kawakami, Norito, Aimee Levinson, Daphna Medina, Maria Elena Mora, Browne, Mark A., Oakley, Posada-Villa, José, C for the WWMHS. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of mental disorders in the World Health Organization ' s. *World Psychiatry* 2007;6:168-176). 2007;6(October):168–76.

15. Erol N, Kılıç C UM et al. Türkiye Ruh Sağlığı Profili Raporu. TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 1998;
16. Knapp M, Beecham J, McDaid D, Matosevic T, Smith M. The economic consequences of deinstitutionalisation of mental health services: Lessons from a systematic review of European experience. *Health and Social Care in the Community*. 2011.
17. Alataş G, Kahiloğulları AK, Yanık M. Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011-2023). Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı. 2011. 22-25 p.
18. Thornicroft G, Tansella M. The balanced care model for global mental health. *Psychol Med*. 2013;43(4):849–63.
19. Thornicroft G, Alem A, Drake RE, Ito H, Mari J, McGeorge P, et al. *Community mental health: Putting policy into practice globally*. Vol. 29. John Wiley & Sons; 2011.
20. WHO. *Organization of Services for Mental Health. Mental Health Policy and Service Guidance Package*. 2003.
21. Wittchen HU, Mühlig S, Beesdo K. Mental disorders in primary care. *Dialogues Clin Neurosci*. 2003;5(2):115-28.
22. Cimpean D, Drake RE. Treating co-morbid chronic medical conditions and anxiety/depression. *Epidemiol Psychiatr Sci*. 2011;20(2):141–50.
23. Hamilton-Westra K, Batesb A, Hothamc S, Wilson P. Development of a training programme for primary care mental health staff to support management of depression and anxiety in long-term conditions. *Prim Health Care Res Dev*. 2018;1–7.
24. WHO Primary Mental Health Care Factsheet. What is primary care mental health?: WHO and Wonca Working Party on Mental Health. *Ment Health Fam Med*. 2008;5(1):9–13.
25. Gater R, Jordanova V, Maric N, Alikaj V, Bajcs M, Cavic T, et al. Pathways to psychiatric care in Eastern Europe. *Br J Psychiatry*. 2005;186(6):529–35.
26. Bijl R V, de Graaf R, Hiripi E, Kessler RC, Kohn R, Offord DR, et al. The prevalence of treated and untreated mental disorders in five countries. *Health Aff*. 2003;22(3):122–33.
27. Steel Z, McDonald R, Silove D, Bauman A, Sandford P, Herron J, et al. Pathways to the first contact with specialist mental health care. *Aust N Z J Psychiatry*. 2006;40(4):347-354
28. Volpe U, Fiorillo A, Luciano M, Del Vecchio V, Palumbo C, Calò S, et al. Pathways to mental health care in Italy: Results from a multicenter study. *Int J Soc Psychiatry*. 2014;60(5):508–13.
29. Hashimoto N, Fujisawa D, Giasuddin NA, Kenchaiah BK, Narmandakh A, Dugerragchaa K, et al. Pathways to mental health care in Bangladesh, India, Japan, Mongolia, and Nepal. *Asia-Pacific J Public Heal*. 2015;27(2):NP1847-NP1857.
30. Volpe U, Mihai A, Jordanova V, Sartorius N. The pathways to mental healthcare worldwide: A systematic review. *Curr Opin Psychiatry*. 2015;28(4):299–306.
31. Kırpınar İ, Çayköylü A, Kuloğlu M. Erzurum’da ruh sağlığı birimlerine ulaşım

- yolları. Türk Psikiyatı Derg. 1994;5(3):175–81.
32. Andrade LH, Alonso J, Mneimneh Z, Wells JE, Al-Hamzawi A, Borges G, et al. Barriers to mental health treatment: Results from the WHO World Mental Health surveys. *Psychol Med*. 2014;44(6):1303–17.
 33. Wang PS, Angermeyer M, Borges G, Bruffaerts R, Tat Chiu W, DE Girolamo G, et al. Delay and failure in treatment seeking after first onset of mental disorders in the World Health Organization's World Mental Health Survey Initiative. *World Psychiatry*. 2007;6(3):177–85.
 34. Ten Have M, De Graaf R, Ormel J, Vilagut G, Kovess V, Alonso J. Are attitudes towards mental health help-seeking associated with service use? Results from the European study of epidemiology of mental disorders. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*. 2010;45(2):153–63.
 35. Clement S, Schauman O, Graham T, Maggioni F, Evans-Lacko S, Bezborodovs N, et al. What is the impact of mental health-related stigma on help-seeking? A systematic review of quantitative and qualitative studies. *Psychol Med*. 2015;45(1):11–27.
 36. Gültekin, B.K., Söylemez, A., Arslantaş, H., Dişçigil, G., Dereboy, İ.F.(2011).Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine ayaktan başvuran hastaların birinci basamak deneyimleri. *Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*,12(1):25-30.
 37. Mackenzie CS, Gekoski WL, Knox VJ. Age, gender, and the underutilization of mental health services: The influence of help-seeking attitudes. *Aging Ment Heal*. 2006;10(6):574–82.
 38. Boyd A, Van De Velde S, Vilagut G, De Graaf R, O'Neill S, Florescu S, et al. Gender differences in mental disorders and suicidality in Europe: Results from a large cross-sectional population-based study. *J Affect Disord*. 2015;173:245–54.
 39. YILMAZ M, MAYDA AS, YÜKSEL C, Filiz B, SEVAL O, BAYINDIR K, et al. Bir aile hekimliği merkezi'ne başvuran hastalara konulan tanılar. *Düzce Üniversitesi Sağlık Bilim Enstitüsü Derg*. 2012;2(3):7–13.
 40. Çetinkaya F, Baykan Z, Naçar M. Yetişkinlerin Aile Hekimliği Uygulaması ile İlgili Düşünceleri ve Aile Hekimlerine Başvuru Durumu. *Adults Perspect about Fam Med Status Serv Util [Internet]*. 2013 Jan;12(1):49–56.
 41. Wang PS, Berglund P, Olfson M, Pincus HA, Wells KB, Kessler RC. Failure and delay in initial treatment contact after first onset of mental disorders in the national comorbidity survey replication. *Arch Gen Psychiatry*. 2005;62(6):603–13.

8. EKLER

EK-1 ANKET FORMU

“Ruh Saęlıęı Hizmetine Ulařım Yolları, Psikiyatri Hastalarının Aile Hekimlięi Uygulamasını Kullanımı ve Aile Hekimi Algısı”

1. Doęum tarihi:

2. Cinsiyet:

- a. Erkek
- b. Kadın

3. Eęitim durumu:

- a. Okur-yazar deęil
- b. Okur-yazar
- c. İlkokul
- d. Ortaokul
- e. Lise
- f. Üniversite

4. Meslek:

- a. Ev kadını
- b. İşçi
- c. Çiftçi
- d. Memur
- e. Esnaf
- f. Öğrenci
- g. Emekli
- h. İşsiz
- ı. Başka...

5. Gelir getiren bir işte çalışıyor musunuz?

- a. Evet
- b. Hayır

6. Eve giren aylık toplam gelir ne kadar? (TL)

- a. 0-1500 TL

- b. 1501-2000 TL
- c. 2001-3000 TL
- d. 3001-4900
- e. 4901 ve üzeri

7. Hanede kaç kiři yařıyor?.....

8. Medeni durumunuz nedir?

- a. Hiç evlenmemiř
 - b. Evli/Beraber yařama
 - c. Bořanmıř
 - d. Dul
- varsa, çocuk sayısı.....

9. Bir saęlık güvenceniz/sigortanız var mı?

10. Bedensel saęlığınız için ařaęıdakilerden hangisini söyleyebilirsiniz?

- a. Çok iyi
- b. İyi
- c. Orta
- d. Kötü
- e. Çok kötü

11. Boyunuz kaç? (cm)

12. Kilonuz kaç? (kg)

13. Bu geliřiniz hariç son bir yılda kaç kez bir doktora gittiniz?

- a. hiç gitmedim
- b. 1-2 kez
- c. 3-5 kez
- d. 6-10 kez
- e. 10-20 kez
- f. 20'den fazla

14. Son bir yılda kaç kez aile hekiminize gittiniz?

- a. hiç gitmedim
- b. 1-2 kez
- c. 3-5 kez
- d. 6-10 kez
- e. 10-20 kez
- f. 20'den fazla

15. Son 1 yılda hangi řikayetlerle doktora gittiniz? Belirtiniz.

- 1.řikayet:.....
- 2.řikayet:.....
- 3.řikayet:.....

16. Yukarıda belirttięiniz řikayetleriniz ne zaman ortaya çıktı?(Örneęin; Mayıs ayında ortaya çıktı veya 3 ay önce ortaya çıktı gibi...)

1. Şikayet:.....
2. Şikayet:.....
3. Şikayet:.....

17. Yukarıda belirttiğiniz şikayetleriniz ortaya çıktıktan ne kadar süre sonra bir doktora başvurduunuz? (hemen, 1 hafta, 1 ay, 3 ay.... gibi)

1. şikayetim ortaya çıktıktan.....sonra doktora başvurdum.
2. şikayetim ortaya çıktıktan.....sonra doktora başvurdum.
3. şikayetim ortaya çıktıktan.....sonra doktora başvurdum.

18. Yukarıda belirttiğiniz şikayetleriniz için ilk olarak nereye başvurduunuz? (Örneğin; aile hekimi, acil servis, dahiliye, nöroloji, psikiyatri, başka?...Her şikayetiniz için nereye başvurduğunuzu belirtiniz)

1. Şikayetim için,’ya gittim
2. Şikayetim için,’ya gittim
3. Şikayetim için,’ya gittim

19. Yukarıda belirttiğiniz şikayetleriniz için tedavi alıp almadığınızı, aldıysanız ne tedavi aldığınızı yazınız. (Örneğin; Tedavi almadım, ilaç tedavisi aldım-(hangi ilacı aldınız?), başka bir doktora sevk edildim, psikoterapi aldım gibi)

1. Şikayetim için,.....
2. Şikayetim için,.....
3. Şikayetim için,.....

20. Bedensel bir hastalığınız var mı? (Bedensel hastalıklar örneğin; şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı, gastrit, mide veya bağırsak ülseri, tiroid hastalıkları, astım-koah, sinüzit, akne, epilepsi, hepatit/HIV...vb gibi hastalıklardır)

- a. Evet
- b. Hayır (cevabınız hayır ise 26. soruya geçiniz)

21. Bedensel bir hastalığınız varsa, neler? (Bedensel hastalıklar örneğin; şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı, gastrit, mide veya bağırsak ülseri, tiroid hastalıkları, astım-koah, sinüzit, akne, epilepsi, hepatit/HIV...vb gibi hastalıklardır)

1. Hastalık:
2. Hastalık:
3. Hastalık:

22. Yukarıda belirttiğiniz hastalıklarınıza nasıl teşhis konuldu? Her hastalık için belirtiniz.

1. Hastalığınıza nasıl teşhis konuldu?

- a)kendim biliyordum
- b)aile hekimi tarafından
- c)bir uzman doktor tarafından(hangi uzmanlık dalı olduğunu belirtiniz.....
- d)başka?

2. Hastalığınıza nasıl teşhis konuldu?

- a)kendim biliyordum
- b)aile hekimi tarafından
- c)bir uzman doktor tarafından(hangi uzmanlık dalı olduğunu belirtiniz.....
- d)başka?

3. Hastalığınıza nasıl teşhis konuldu?

- a)kendim biliyordum
- b)aile hekimi tarafından
- c)bir uzman doktor tarafından(hangi uzmanlık dalı olduğunu belirtiniz...
- d)başka?

23. Bu hastalıklarınız ne zamandır var? (Örneğin; 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 5 yıl... gibi)

1. Hastalık:
2. Hastalık:
3. Hastalık:

24. Bu hastalıklarınız için halen aldığınız tedaviler neler? (Biliyorsanız ilaçlarınızın adını ve dozunu belirtiniz)

1. Hastalık için
2. Hastalık için
3. Hastalık için

25. Son 1 aydır fiziksel/bedensel sağlık sorunlarınız hayatınızı aşağıdaki açılardan ne kadar etkiledi?

| | Çok aşırı etkilen di | Fazla etkile ndi | Orta derecede etkile ndi | Az etkile ndi | Hiç etkile nmedi |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. Ev işleri yapma, örneğin temizlik, alışveriş, yemek yapma | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b. Yaptığınız işin kalitesi/niteliği | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c. Sosyal hayatınız | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d. Yakın kişisel ilişkileriniz | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

26. Ruh sağlığını nasıl değerlendirirsiniz?

- a. Çok İyi
- b. İyi
- c. Orta
- d. Kötü
- e. Çok kötü

27. Daha önce psikiyatri polikliniğine başvurduunuz mu?

- a) Evet b) Hayır

28. Daha önce psikiyatri polikliniğine başvurduysanız hangi şikayetlerle başvurmuşunuz?

- 1. Şikayet:
- 2. Şikayet:
- 3. Şikayet:

29. Bu gelişinizde Psikiyatri polikliniğine başvuru şikayetiniz/şikayetleriniz nedir? (baş ağrısı, uykusuzluk, iştahsızlık, huzursuzluk, stres, öfke, sürekli ağlama, nefes darlığı, çarpıntı, kendine zarar verme, yükseklik korkusu, unutkanlık...vb gibi)

- 1. Şikayet:
- 2. Şikayet:
- 3. Şikayet:

30. Yukarıda belirttiğiniz şikayetleriniz ne zaman başladı? (1 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl,... gibi)

1. Şikayetim.....önce başladı.
2. Şikayetim.....önce başladı.
3. Şikayetim.....önce başladı.

31. Yukarıda belirttiğiniz şikayetleriniz başladıktan ne kadar süre sonra bir doktora başvurduunuz? (hemen,1 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl sonra...gibi)

1. Şikayetim başladıktansonra başvurdum.
2. Şikayetim başladıktan.....sonra başvurdum.
3. Şikayetim başladıktan.....sonra başvurdum.

32. Eğer şikayetiniz/şikayetleriniz başladıktan sonra hemen doktora gitmediyseniz bu gecikmeyi aşağıdaki durumlar ne derece etkiledi? Aşağıdaki tablodan işaretleyiniz.

| | Çok etkiledi | Orta derecede etkiledi | Az etkiledi | Hiç etkilemedi |
|---|--------------|------------------------|-------------|----------------|
| Tedavinin maddi olarak yük getireceğini düşünmek | | | | |
| Hangi doktora başvuracağına emin olamamak | | | | |
| Randevu alamamak | | | | |
| Ulaşım, çocuk bakımı, zaman planlaması gibi sorunların olması | | | | |
| Tedavinin çok zaman alacağını düşünmek | | | | |
| Tedavinin işe yaramayacağını düşünmek | | | | |
| Sorununu kendi halletmek istemek | | | | |
| Daha önce tedavi alınmış ancak fayda etmemiş olması | | | | |
| Başkalarının tedavi aldığı öğrenmelerinden çekinmek | | | | |
| Kendi iradesi dışında zorla hastaneye yatırılmaktan korkmak | | | | |
| Problemin kendiliğinden kaybolacağını düşünmek | | | | |
| Şikayetimin çok da rahatsız etmemesi | | | | |
| Doktorumun görev yerinin değişmesi | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Başka bir yere taşınma | | | | |
| İlaç kullanmak istememe | | | | |
| Başka?..... | | | | |

33. Bu şikayetlerle kime/kimlere başvurduunuz? (sırasıyla belirtiniz) (aile hekimi, acil servis, dahiliye, nöroloji, psikiyatri gibi)

1. Şikayetim için

1.....

2.....

3..... 'ya başvurdum

2. Şikayetim için

1.....

2.....

3..... 'ya başvurdum

3. Şikayetim için

1.....

2.....

3..... 'ya başvurdum

34. Bu şikayetlerle hangi doktora ne zaman başvurduunuz belirtiniz.

1. Şikayetim için

1. Doktora.....

2. Doktora.....

3. Doktora..... zamanında başvurdum.

2. Şikayetim için

1. Doktora.....

2. Doktora.....

3. Doktora..... zamanında başvurdum.

3. Şikayetim için

1. Doktora.....

2. Doktora.....

3. Doktora..... zamanında başvurdum.

35. Bu şikayetleriniz için hangi doktora gideceğinize nasıl karar verdiniz? Cümleleri uygun seçenikle veya uygun seçenek yoksa kendiniz tamamlayınız. Birden fazla seçenek belirtebilirsiniz.

1. şikayetim için hangi doktora gideceğime.....

- a)kendi kendime karar verdim.
- b)aileme-arkadaşlarıma sordum.
- c)internetten araştırdım.
- d)başka bir doktor yönlendirdi. (doktorun branşını yazınız).....
- e)başka?.....

2. şikayetim için hangi doktora gideceğime.....

- a)kendi kendime karar verdim.
- b)aileme-arkadaşlarıma sordum.
- c)internetten araştırdım.
- d)başka bir doktor yönlendirdi. (doktorun branşını yazınız).....
- e)başka?.....

3. şikayetim için hangi doktora gideceğime.....

- a) kendi kendime karar verdim.
- b) aileme-arkadaşlarıma sordum.
- c) internetten araştırdım.
- d) başka bir doktor yönlendirdi. (doktorun branşını yazınız).....
- e) başka?.....

36. Bu şikayetleriniz için gittiğiniz doktorlar size ne tedavi verdi mi? (Her şikayetiniz için gittiğiniz doktorların önerdiği tedavi seçeneğini aşağıdaki tabloya yazınız)

- a) İlaç (adı/dozu)
- b) Danışmanlık
- c) Psikoterapi
- d) Tedavi vermedi, tedaviye ihtiyaç olmadığını söyledi.
- e) Tedavi vermedi, başka doktora yönlendirdi. (hangi doktora yönlendirildiğinizi yazınız.....

| | İlk başvuru doktor | 2. başvuru doktor | 3. başvuru doktor |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1.şikayet için: | | | |
| 2.şikayet için: | | | |
| 3.şikayet için: | | | |

37. Bu şikayetleriniz için doktorların size verdiği tedavilere uyabildiniz mi? (seçeneğinizi aşağıdaki şikayet/doktor tablosuna yazınız)

- a. Önerileri harfiyen uyguladım
- b. Ara-sıra uyguladım
- c. Çok az uyguladım
- d. Hiç uygulamadım

| | İlk başvuru doktor | 2. başvuru doktor | 3. başvuru doktor |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1.şikayet için: | | | |
| 2.şikayet için: | | | |
| 3.şikayet için: | | | |

38. Eğer tedaviyi bıraktınızsa sebebi nedir? (seçeneğinizi aşağıdaki şikayet/doktor tablosuna yazınız. Birden fazla seçenek yazabilirsiniz)

- a. Doktorun mesleki bilgisine duyulan güvensizlik
- b. Doktor/hemşireyle iletişimsizlik-anlaşamama-tartışma
- c. Başkalarının tedavi aldığınızı öğrenmesinden çekinme
- d. Tedaviden fayda görmeme
- e. Maddi sebepler
- f. Zaman/randevu bulamama
- g. Başkalarının (aile-eş-arkadaş) müdahalesi
- h. Tedavisiz iyileşeceğine inanmak
- ı. İyileşme

j. Başka varsa belirtiniz.....

| | İlk başvuru doktor | 2. başvuru doktor | 3. başvuru doktor |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1.şikayet için: | | | |
| 2.şikayet için: | | | |
| 3.şikayet için: | | | |

39. Belirttiğiniz şikayetleriniz için gittiğiniz doktorların verdiği tedaviler sizi nasıl etkiledi? (seçeneğinizi aşağıdaki şikayet/doktor tablosuna yazınız)

- a. Tedaviyle şikayetlerim kötüleşti
- b. Tedavinin herhangi bir etkisi olmadı
- c. Tedaviden çok az fayda gördüm
- d. Tedaviyle şikayetlerim geçti

| | İlk başvuru doktor | 2. başvuru doktor | 3. başvuru doktor |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1.şikayet için: | | | |
| 2.şikayet için: | | | |
| 3.şikayet için: | | | |

40. Psikiyatri polikliniğine başvuru yolunuz nedir?

- a. aile hekimi tarafından yönlendirme
- b. başka bir uzmanlık alanından yönlendirilme (hangisi yazınız.....)
- c. aile isteğiyle direkt olarak
- d. kendi isteğiyle direkt olarak
- e. birinin zorlamasıyla
- f. hukuk yoluyla
- g. başka?.....

41. 40. soruya cevabınız aile hekimi tarafından yönlendirilme ise bu şikayetiniz/şikayetleriniz sebebiyle aile hekiminize kaç kez gittiniz?

- a)1 kez b)2-3 kez c)4-5 kez d) 6-7 kez e) 8-9 kez f) 10 kez ve üzeri

42. Bu şikayetiniz/şikayetleriniz sebebiyle aile hekimi tarafından tedavi verildi mi, verildiyse neler? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

- a) Tedavi verilmedi. Tedaviye ihtiyaç olmadığını söyledi.
- b) Tedavi verilmedi. Başka bir doktora yönlendirdi.
- c) İlaç tedavisi verildi, tedavi etkili oldu.
- d) İlaç tedavisi verildi, tedavi etkisiz/yetersiz olunca başka bir doktora yönlendirdi.
- e) İlaç tedavisi verildi, tedavi etkisiz/yetersiz olunca kendim başka bir doktora gittim.
- f) Psikoterapi uyguladı.
- g) Hastalığım hakkında danışmanlık verdi.
- h) Başka?...

43. Geçmişte bir doktor ya da sağlık görevlisi sizde aşağıdakilerden birinin olduğunu söyledi mi?

| | Evet | Hayır |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a. Hiperaktivite (DEHB)? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b. Depresyon? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c. Panik atakları veya anksiyete nöbetleri? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d. Fobiler ya da belirli nesne veya durumlardan aşırı korku? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| e. Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| f. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), takıntı hastalığı? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| g. Yaygın anksiyete bozukluğu, veya aşırı kaygılı, endişeli olmak? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| h. Mani, manik depresif bozukluk, bipolar bozukluk? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| i. Öfke kontrolüyle ilgili sorunlar? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| j. Şizofreni? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| k. Başka herhangi bir tip psikoz? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| l. Başka ciddi duygusal sorun? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| m. Alkol kullanımı ile ilgili sorunlar? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| n. Madde kullanımıyla ilgili sorunlar? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

44. Ailenizde hiç ruhsal hastalık tanısı almış biri var mı? Varsa kim, tanısı ne?.....

45. Tanıdıklarınızdan ruhsal hastalık tanısı almış biri var mı? Varsa kim, tanısı ne?.....

46. Daha önce ruhsal hastalık tanısı aldıysanız tedavi sürecinde aile hekimine gittiniz mi, gittinizse sebebi nedir?

1. Evet gittim, sebebi:

- a) ruhsal hastalığım için ilaç yazdırmak,

- b) ruhsal hastalığım hakkında soru sormak/danışmanlık almak,
- c) başka bir hastalık sebebiyle
- d) başka, belirtiniz....

2. Hayır gitmedim sebebi.....

47. Ruhsal hastalık tanısı aldıysanız, hiç bu sebepten hastaneye yatışınız oldu mu?
(Cevabınız hayırsa 50. Soruya geçiniz)

- a)Evet
- b)Hayır

48. Bu sorunlar için hastaneye yattığınızda kaç yaşındaydınız?:

49. Son bir yılda, bu sorunlar nedeniyle kaç geceyi hastanede geçirdiniz?

50. Ruhsal sorunlarınız veya alkol/madde kullanımınız için geceyi hastanede geçirdiğinizde en son kaç yaşlarındaydınız?

51. Daha önce hiç bir psikiyatr/psikolog veya başka bir sağlık mensubundan terapi aldınız mı? Aldınızsa kaç seans aldınız.

- a) Hayır
- b)Evet..... seans aldım.

52. Daha önce hiç ruhsal sorunlar veya madde kullanımıyla ilgili sorunlar nedeniyle bir din adamına, hocaya, şifacıya gittiniz mi? Gittiyseniz ilk kez kaç yaşında gittiniz? Son bir yılda kaç kez gittiniz?

- a) Hayır
- b) Evet, ilk kez yaşında gittim. kez gittim.

53. Hayatınızda hiç kendine yardım-destek grubuna veya internet üzerinden ruh sağlığı-madde kullanımı tedavi programlarına katıldınız mı? Katıldıysanız son bir yılda kaç seansa katıldınız?

- a. Hayır
- b.Evet seansa katıldım .

54. Őu anda ruhsal sorunlarınız iin bir ila/ilalar aliyor musunuz?

a. Hayır b. Evet (ilaların adını ve dozunu belirtiniz.)

1. İla:.....

2. İla:.....

3. İla:.....

55. Cevabınız evetse ilacı/ilaları kim verdi?

- a. kendim aldım
- b. psikiyatr
- c. arkadaşım-tanıdıklar
- d. aile hekimi
- e. başka bir hekim (hangisi yazınız.....)
- f. eczacı
- g. başka?.....

56. İlacı/ilaları ne kadar zamandır kullanıyorsunuz?

1. İla.....

2. İla.....

3. İla.....

57. İlalardan fayda gördünüz mü?

1. İlala;

- a. Daha kötü oldum
- b. Hibir etkisi olmadı.
- c. Biraz fayda gördüm.
- d. ok fayda gördüm.
- e. Tamamen iyileŐtim.

2. İlaçla;

- a. Daha kötü oldum
- b. Hiçbir etkisi olmadı.
- c. Biraz fayda gördüm.
- d. Çok fayda gördüm.
- e. Tamamen iyileştim.

3. İlaçla;

- a. Daha kötü oldum
- b. Hiçbir etkisi olmadı.
- c. Biraz fayda gördüm.
- d. Çok fayda gördüm.
- e. Tamamen iyileştim.

58. Son bir ayda, ruhsal sağlık sorunlarınız hayatınızı aşağıdaki açılardan ne kadar etkiledi?

| | Çok aşırı derecede | Çok | Biraz | Az | Hiç etkilemedi |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. Ev işleri yapma, örneğin temizlik, alışveriş, yemek yapma | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b. Yaptığınız işin kalitesi/niteliği | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c. Sosyal hayatınız | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d. Yakın kişisel ilişkileriniz | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

59. Sağlıkla ilgili bilgileri nereden edirsiniz? Aşağıdaki tablodan işaretleyiniz.

| | Çok fazla | Biraz | Az | Hiç |
|--------------------------|-----------|-------|----|-----|
| Ailemden/tanıdıklarımın | | | | |
| İnternet | | | | |
| Sağlıkla ilgili kitaplar | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| Televizyon | | | | |
| Bir sađlık personeli | | | | |
| Bařka?... | | | | |

60. Ruh sađlığı ile ilgili bilgileri nereden edirsiniz? Ařađıdaki tabloya iřaretleyiniz.

| | Çok fazla | Biraz | Az | Hiç |
|--------------------------|-----------|-------|----|-----|
| Ailemden/tanıdıklarım | | | | |
| İnternet | | | | |
| Sađlıkla ilgili kitaplar | | | | |
| Televizyon | | | | |
| Bir sađlık personeli | | | | |
| Bařka?... | | | | |

61. Sizce aile hekiminiz sizinle ne kadar ilgili?

- a) Hiç ilgili deđil
- b) Az ilgili
- c) Yeterince ilgili
- d) Çok ilgili

62. Aile hekiminizin bedensel hastalıklar konusunda mesleki becerisini nasıl deđerlendirirsiniz?

- a) Çok iyi
- b) İy
- c) Yeterli
- d) Kötü
- e) Fikrim yok

63. Aile hekiminizin ruhsal hastalıklar konusunda mesleki becerisini nasıl deđerlendirirsiniz?

- a) Çok iyi
- b) İy
- c) Yeterli
- d) Kötü
- e) Fikrim yok

Aşağıdaki cümlelere ne oranda katıldığınızı belirtiniz.

| | Hiç katılmıyorum | Katılmıyorum | Kararsızım | Katılıyorum | Tamamen katılıyorum |
|---|------------------|--------------|------------|-------------|---------------------|
| 64. Aile hekiminin yaşı arttıkça mesleki becerisi artar. | | | | | |
| 65. Aile hekiminin cinsiyeti mesleki becerisini etkiler. | | | | | |
| 66. Ruhsal sıkıntılarımı akranım olan bir aile hekimiyle daha rahat paylaşıyorum. | | | | | |
| 67. Ruhsal sıkıntılarımı daha yaşlı bir aile hekimiyle daha rahat paylaşıyorum. | | | | | |
| 68. Ruhsal sıkıntılarımı benimle aynı cinsiyette olan bir aile hekimiyle daha rahat paylaşıyorum. | | | | | |
| 69. Aile hekiminin dünya görüşü ruhsal sıkıntılarımı paylaşabilmemi etkiler. | | | | | |
| 70. Aile hekiminin ruhsal hastalıklarla ilgili bilgisi yeterlidir. | | | | | |
| 71. Aile hekiminin bedensel hastalıklarla ilgili bilgisi yeterlidir. | | | | | |
| 72. Aile hekimi hastalarına yeterince zaman ayırır. | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 73. Aile hekimi mahremiyete saygı gösterir. | | | | | |
| 74. Ruhsal bir şikayetim olduğunda aile hekimine başvurmadan utanmam, çekinmem. | | | | | |
| 75. Ruhsal bir sorun için ilk önce aile hekimine başvururum. | | | | | |
| 76. Ruhsal bir sorun için ilk önce psikiyatru başvururum. | | | | | |
| 77. Ruhsal bir şikayetim olduğunda psikiyatru/psikoloğa başvurmadan utanmam, çekinmem. | | | | | |
| 78. Psikiyatru/Psikoloğumun dünya görüşü ruhsal sıkıntılarımı paylaşabilmemi etkiler. | | | | | |
| 79. İnsanların bir ruhsal hastalığının olduğunu bilmesi/düşünmesi beni rahatsız eder. | | | | | |
| 80. Ailem beni ruhsal hastalığının tedavisinde destekler | | | | | |
| 81. Eskiye göre insanlar ruhsal hastalıkları için doktora giderken daha rahatlar. | | | | | |

EK-2 ETİK KURUL ONAYI



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Sayı : 16969557 - 1746

Konu :

ARAŞTIRMA PROJESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Toplantı Tarihi : 19 ARALIK 2017 SALI
Toplantı No : 2017/27
Proje No : GO 17/981 (Değerlendirme Tarihi: 19.12.2017)
Karar No : GO 17/981- 32

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cengiz KILIÇ' ın sorumlu araştırmacı olduğu, Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN ile birlikte çalışacakları ve Arş. Gör. Dr. Elif Hilal ÜNVERDİ' nin uzmanlık tezi olan, GO 17/981 kayıt numaralı, "*Ruh Sağlığı Hizmetine Ulaşım Yolları, Psikiyatri Hastalarının Aile Hekimliği Uygulamasını Kullanımı ve Aile Hekimi Algısı*" başlıklı proje önerisi araştırmannın gerekçe, amaç, yaklaşım ve yöntemleri dikkate alınarak incelenmiş olup, etik açıdan uygun bulunmuştur.

- | | |
|---|--|
| 1. Prof. Dr. Nurten AKARSU (Başkan) | 10 Prof. Dr. Oya Nuran EMİROĞLU (Üye) |
| 2. Prof. Dr. Sevda F. MÜFTÜOĞLU (Üye) | 11 Yrd. Doç. Dr. Özay GÖKÖZ (Üye) |
| 3. Prof. Dr. M. Yıldırım SARA (Üye) | 12. Doç. Dr. Gözde GİRGİN (Üye) |
| 4. Prof. Dr. Necdet SAĞLAM (Üye) | 13. Doç. Dr. Fatma Visal OKUR (Üye) |
| 5. Prof. Dr. Hatice Doğan BUZOĞLU (Üye) | 14. Doç. Dr. Can Ebru KURT (Üye) |
| 6. Prof. Dr. R. Köksal ÖZGÜL (Üye) | 15. Yrd. Doç. Dr. H. Hüsrev TURNAGÖL (Üye) |
| 7. Prof. Dr. Ayşe Lale DOĞAN (Üye) | 16. Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR (Üye) |
| 8. Prof. Dr. Elmas Ebru YALÇIN (Üye) | 17. Öğr. Gör. Dr. Meltem ŞENGELEN (Üye) |
| 9. Prof. Dr. Mintaze Kerem GÜNEL (Üye) | 18. Av. Meltem ONURLU (Üye) |