

**CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ \* FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**AŞAĞI GEDİZ HAVZASI VEJETASYON EKOLOJİSİ**

**DOKTORA TEZİ**

**Araş. Gör. Cenk DURMUŞKAHYA**

**Anabilim Dalı : Biyoloji**

**Programı : Botanik**

**MANİSA 2005**

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ \* FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

AŞAĞI GEDİZ HAVZASI VEJETASYON EKOLOJİSİ

DOKTORA TEZİ

Araş. Gör. Cenk DURMUŞKAHYA

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 6 Eylül 2005

Tezin Savunulduğu Tarih : 6 Ekim 2005

Tez Danışmanı : Prof..Dr. Yusuf GEMİCİ

Diğer Jüri Üyeleri : Prof.Dr. Hüseyin GÜNER

Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK

Prof.Dr. Özcan SEÇMEN

Prof.Dr. Asaf KOÇMAN

MANİSA 2005

## Dizin

İçindekiler.....	I
Şekil listesi.....	III
Harita listesi.....	IV
Tablo listesi .....	V
Fotoğraflar.....	VI
Teşekkür.....	VII
Özet.....	VII
Abstract .....	IX
1.GİRİŞ .....	1
2. ÇALIŞMA ALANIN GENEL ÖZELLİKLERİ.....	11
2.1 Coğrafi Konum.....	11
2.2 Topoğrafya.....	13
2.2.1 Yüksek Alanlar.....	15
2.2.2 Boğazlar .....	15
2.2.3 Ovalar.....	16
2.3 Yapısal Özellikler .....	17
2.3.1 Paleozoik / Metamorfik Formasyonlar.....	17
2.3.2. Mesozoik / Kristalize Kireçtaşı ve Mermerler.....	19
2.3.3. Neojen ve Plio –Kuaterner Örtü Depoları .....	19
2.3.4. Volkanik Formasyonlar .....	20
2.3.5. Kuaterner Alüvyonlar.....	20
2.4.Hidrolojik Özellikler .....	23
2.5 İklim Özellikleri.....	25
2.5.1.Ortalama Sıcaklıklar.....	26
2.5.2 Don Olaylı Günler .....	27
2.5.3 Toprak Altı Sıcaklıkları.....	28
2.5.4 Nemlilik.....	29
2.5.5.Yıllık Ortalama Yağış ve Yağış Rejimi.....	30
2.5.5.1Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı.....	30
2.5.6 Biyoiklimsel Sentez .....	32
2.6 Toprak.....	34
2.6.1 Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları (N).....	35
2.6.2 Kireçsiz Kahverengi Topraklar (U).....	35
2.6.3.Redzina Topraklar (R) .....	36

2.6.4 Kahverengi Orman Toprakları (M) .....	36
2.6.5 Kırmızı Akdeniz Toprakları (T) .....	37
2.6.6 Kestane Rengi Topraklar (C) .....	37
2.6.7 Tuzlu, Tuzlu – Alkali Topraklar (Ç).....	38
2.6.8 Regosol Topraklar (L).....	39
2.6.9 Alüvyal Topraklar (A) .....	39
2.6.10 Kolüvyal Topraklar (K).....	40
3. ÖZDEK VE YÖNTEM.....	42
3.1 Özdek .....	42
3.2 Yöntem.....	42
3.2.1 Flora Araştırmaları ile İlgili Yönetimler.....	42
3.2.2 Vejetasyon Çalışmaları.....	43
3.2.3 Toprak Analiz Yöntemleri .....	43
4.BULGULAR.....	44
4.1 Flora.....	44
4.1.1 Bitki Toplanan Lokaliteler	44
4.1.2 Bitki Listesi.....	47
4.2 Genel Vejetasyon Yapısı .....	93
4.3. Vejetasyonu Oluşturan Toplulukların Fitososyolojik Yapısı.....	100
4.3.1 Sucul ve Bataklik Vejetasyonu.....	100
4.3.1.1 Ceratophylletum demersi (Hild 1947)Birliđi.....	100
4.3.1.2 Phragmitetum communis (Schmale 1939) Birliđi.....	103
4.3.1.3 Arthrocnemo- Halocnemetum strobilacei (Oberd 1957) .....	106
4.3.1.4 Tamaricetum symrnensi (Seçmen& Leblebici 1994) Birliđi .....	109
4.3.2. Çalı Vejetasyonu .....	111
4.3.2.1 Paliuro – Quercetum cocciferae (Çetin, 2003) Birliđi.....	111
4.3.2.2. Asphodelo – Sarcopoterium spinosi ass.nova Birliđi.....	115
4.3.3. Orman Vejetasyonu.....	119
4.3.3.1. Lino- Pinetum brutiae ass.nova Birliđi .....	119
4.3.3.2 Phlomo – Quercetum macrolepi ass.nova Birliđi.....	122
5. SONUÇ VE TARTIŞMA.....	126
5.1 Flora .....	126
5.2 Endemizm.....	128
5.3 Vejetasyon.....	133
5.2.1 Ceratophylletum demersi (Hild 1947) Birliđi .....	134

5.2.2 Pragmitetum communis (Schumale 1939) Birliđi .....	135
5.2.3 Arthrocnemo- Halocnemetum strobilacei Birliđi .....	137
5.2.4. Tamaricetum symrnensi (Seçmen& Leblebici 1994) Birliđi.....	138
5.2.5 Paliuro-Quercetum cocciferae (Çetin 2003) Birliđi.....	139
5.2.6. Asphodelo – Sarcopoterium spinosi Birliđi .....	142
5.2.7. Lino- Pinetum brutiae ass.nova Birliđi	145
5.2.8. Phlomo – Quercetum macrolepi ass.nova Birliđi .....	147
6.ÖNERİLER.....	150
KAYNAKÇA .....	152
Ek : Araştırma Alanına Ait Genel Görüntüler.....	163
Özgeçmiş .....	166

**Şekiller**

Şekil 1 : İstasyonlarda Yıllık Yağış Rejiminin Mevsimlik Dağılımı.....	31
Şekil 2 : İstasyonlara ait iklim diyagramlar.....	33
Şekil 3: Orta Ege'de Vejetasyon Katları .....	94
Şekil 4: Flora bileşenleri .....	126
Şekil 5: Flora elementlerinin karşılaştırılması .....	127
Şekil 6: Familyalara göre endemik türlerin dağılışı.....	130

**Haritalar**

Harita 1: Aşağı Gediz Havzası'na ait uydu görüntüsü.....	11
Harita 2: Aşağı Gediz Havzası Türkiye'deki konumu ve fiziki haritası .....	11
Harita 3: Gediz Nehri ve Kolları .....	13
Harita 4 : Jeoloji Haritası .....	22
Harita 5 : Toprak Haritası .....	41
Harita 6 : Bitki örtüsü haritası .....	99

## Tablolar

Tablo 1: İstasyonların Yıllık Ortalama, En Yüksek ve En Düşük Sıcaklıklar...	27
Tablo 2: Nisbi nem miktarları .....	30
Tablo 3: Yıllık ortalama yağışlar.....	30
Tablo 4 : Biyoiklim katları .....	32
Tablo 5: Ceratophylletum demersi (Hild 1947 ) Birliđi .....	102
Tablo 6 : Phtagmitetum communis (Schmale 1939 )Birliđi .....	105
Tablo 7: Arthrocnemo – Halocnemetum strobilacei Birliđi (Oberd 1957)...	108
Tablo 8: Tamaricetum symrnensi Birliđi (Seçmen&Leblebici 1994).....	110
Tablo 9:Paliuro- Quercetum cocciferae Birliđi (Çetin2003).....	113
Tablo 10: Asphodelo - Sarcopoterietum spinosi Birliđi ass.nova.....	117
Tablo 11 : Lino-Pinetum brutiae Birliđi ass.nova .....	121
Tablo 12: Phlomo- Quercetum macrolepi ass.nova Birliđi .....	124
Tablo 13 : Araştırma alanına yakın bölgelerde yapılmış flora çalışmalarının karşılaştırılması.	127
Tablo 14: En fazla takson içeren 10 cinsin yakın bölgelerde yapılmış flora çalışmalarının karşılaştırılması .....	128
Tablo 15: Aşağı Gediz Havzası ve yakın çevresinde yapılan araştırmalarda endemizm oranı .....	129
Tablo 16 : Endemik taksonların risk gruplarına göre dağılımı .....	131
Tablo 17 : Aşağı Gediz Havzası Endemik Bitkileri ve Tehlike Kategorileri ...	131



**Fotoğraflar**

Fotoğraf 1 : Ceratophylletum birliğinden bir görünüm .....	101
Fotoğraf 2: Ayvacıkta bulunan Phragmitetum birliğinden bir görünüş.....	104
Fotoğraf 3 : Gediz Deltası'nda bulunan Arthrocnemo – Halocnemetum strobilacei birliğinden genel görünüş.....	107
Fotoğraf 4: Turgutlu – Derbent'de bulunan Paliuro – Quercetum cocciferae birliğinin genel görünüşü .....	114
Fotoğraf 5: Gediz Deltası Poyraz Tepe'de bulunan Asphodelo – Sarcopoterium spinosi birliğinden genel görünüş.....	116
Fotoğraf 6 : Emiralem –Süleymanlı Köyü'nde bulunan Phlomo- Quercetum macrolepi birliğinden genel görünüş.....	125

## TEŞEKKÜR

Bu proje, Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığınca FEF 2002\ 112 nolu proje olarak desteklenmiştir. Bu nedenle başta Celal Bayar Üniversitesine, toplanan örneklerin muhafaza ve tayin edilmesinde kullandığım Ege Üniversitesi Herbarium Merkezine ve tüm çalışanlarına, arazi çalışmalarında bana destek veren; Manisa İl Çevre Müdürlüğü Doğa Koruma Şubesi ve İzmir İl Çevre Müdürlüğü Doğa Koruma Şubesi'nin tüm çalışanlarına, toprak analizleri konusunda yardımcı olan Gediz Planlama Müdürlüğü'ne, doktora çalışmam sırasında, araştırma yapma imkanı sağlayan Herbarium and Plant Science of Reading University'sine ve bu bilimsel faaliyeti destekleyen TÜBİTAK'a teşekkürlerimi sunuyorum.

Ayrıca danışmanlığımı üstlenen değerli hocam Prof.Dr. Yusuf GEMİCİ'ye başta olmak üzere, bilgi ve tecrübeleriyle bana destek olan Prof Dr. Özcan SEÇMEN'e, Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK'e ve Dr. Semra SÜTGİBİ'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

**ÖZET****AŞAĞI GEDİZ HAVZASI VEJETASYON EKOLOJİSİ****DURMUŞKAHYA, Cenk****Doktora Tezi, Biyoloji Bölümü****Tez Yöneticisi: Prof.Dr. Yusuf GEMİCİ****Eylül 2005**

Bu çalışma Batı Anadolu'da bulunan İzmir ve Manisa il sınırları içerisinde yer alan Aşağı Gediz Havzası'nın flora ve vejetasyonu içermektedir.

Flora çalışmaları sonucunda bölgede 99 familyaya ait 1065 takson tespit edilmiştir. Saptanan taksonların 44 tanesi endemik olup toplam floraya oranı % 4,2'tir.

Bu çalışmada, 8 bitki birliği tespit edilmiş olup, bunlardan 3 tanesi yeni tanımlanmıştır. Bu birlikler ve ait oldukları sintaksonomik kategoriler aşağıdaki gibidir.

- Ceratophyllum demersi (Hild 1947)
- Pragmitetum communis (Schumale 1939)
- Paliuro-Quercetum cocciferae (Çetin 2003)
- Asphodelo- Sarcopoterietum spinosi ass.nova
- Arthrocnemo- Halocnemetum strobilacei (Oberd 1957)
- Tamaricetum symrnensi (Seçmen&Leblebici 1994)
- Lino- Pinetum brutiae ass.nova
- Phlomo- Quercetum macrolepi ass.nova

Sonuç olarak, Akdeniz vejetasyon katında bulunan Aşağı Gediz Havzası vejetasyonu antropojenik etkiler nedeniyle büyük ölçüde tahribe uğramıştır. Doğal vejetasyon bugün sadece havzayı sınırlayan dağların yamaçları ile tarıma uygun olmayan Gediz Deltasında korunmaktadır. Doğal vejetasyonun büyük bir kısmını Palamut meşesi toplulukları, Kızılcım toplulukları ve frigana toplulukları oluşturmaktadır.

**Anahtar Sözcük:** Flora, Vejetasyon Ekolojisi, Aşağı Gediz Havzası, Türkiye

**ABSTRACT****VEGETATION ECOLOGY OF LOWER GEDİZ BASIN (MANİSA – İZMİR)  
DURMUŞKAHYA, Cenk**

**PhD Thesis, Biology Department  
Supervisor : Prof.Dr. Yusuf GEMİCİ  
September 2005**

This study consist of flora and vegetation of Lower Gediz Basin where located in İzmir and Manisa Province.

At the end of the flora studies, 1065 taxa belonging 99 families have been identified in this region. 44 of them are endemic and the ratio of the total flora is % 4,2.

In this study, 8 plant associations have been found and 3 of them have been described in the first time. These associations and the syntaxonomic catagories they belong are as follow:

- *Ceratophyllum demersi* (Hild 1947)
- *Pragmitetum communis* (Schumale 1939)
- *Paliuro-Quercetum cocciferae* (Çetin 2003)
- *Asphodelo- Sarcopoterietum spinosi* ass.nova
- *Arthrocnemo- Halocnemetum strobilacei* (Oberd 1957)
- *Tamaricetum symrnensi* (Seçmen&Leblebici 1994)
- *Lino- Pinetum brutiae* ass.nova
- *Phlomo- Quercetum macrolepi* ass.nova

As a result, Lower Gediz Basin was heavily destroyed by antropojenic effets, which is in the Mediterrenian vegetation step. Today, natural vegetation is keeping on the lands which non convenient for farming in the Gediz Delta and slopes of the mountains which are boarded the basin. A big part of the natural vegetaion is formed by valonia oak, red pine and frigana associations

**Key Word:** Flora, Vegetation Ecology, Lower Gediz Basin, Turkey

## 1. GİRİŞ

Çalışmamız Ege Bölgesi'nde yer alan Gediz Havzasının Aşağı kısmı olarak nitelendirilen Demirköprü Barajı – Gediz Deltası arasındaki alanı kapsamaktadır. Bu çalışmada öncelikle Akdeniz bitki örtüsü ile kaplı bulunan araştırma alanının flora ve vejetasyon ekolojisi araştırılmış, vejetasyonun sintaksonomik durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır.

Havza çalışmaları ülkemizde son yıllarda gündeme gelen önemli çalışmalardır. Çünkü ülkemiz florasında önemli bir yer tutan, ancak bugüne kadar çok az çalışılmış olan havza ekosistemleri sahip oldukları jeolojik yapı ve mikroiklimler nedeni ile biyoçeşitliliğin yüksek olduğu alanlardır. Ancak bu önemli yaşam alanları, giderek ağırlaşan çevre sorunları karşısında günden güne tahrip olmaktadır. Havzalarda akarsuların deşarj kanalı olarak kullanılması ve çeşitli organik-inorganik atıkların bu alanlara tahliye edilerek hem suyun kirlenmesine, hem de çevrenin kirlenmesine yol açması önemli sorunlar doğurmaktadır. Bu bağlamda Aşağı Gediz Havzası Vejetasyon Ekolojisi adlı çalışmamız, günden güne kirlenerek kaybettiğimiz havza ekosistemlerinin sahip olduğu biyolojik değerlerin önemini ortaya koyması açısından oldukça önemlidir.

Ayrıca Aşağı Gediz Havzası'nın önemini arttıran diğer bir özellik ise uluslar arası bir öneme sahip ve Ramsar Sözleşmesi kapsamında korunması gerekli olan, İzmir Tuzla Kuşçenneti'ni de içermesidir. Bugün hızla doldurulmaya ve yok edilmeye çalışılan bu değerli sulak alanın ekolojik özelliklerinin ortaya konması, bu alanın önemini daha da artıracak ve daha detaylı koruma planlarının yapılabilmesi için kaynak oluşturacaktır.

Havzalarda biyoçeşitliliğin fazla olmasının temel nedeni yaşam alanları yani habitatların çeşitliliğidir. Bu çalışmada en önemli gerekçesi, seçilen inceleme alanında çok sayıda habitatın bir arada bulunması ve bunun sonucunda tür çeşitliliğinin fazla oluşudur. Araştırmanın yapıldığı Aşağı Gediz Havzası'nda bulunan yaşam alanları; nehir kenarında yer alan karasal ekosistemler, Gediz Nehri'nin hemen yanında, kısmen içinde ve nehirin denize yakın yerlerde oluşturduğu deltanın bir kısmında yer alan tatlı su ekosistemleri, yine deltada bulunan ve deniz suları ile iç içe geçmiş tuzcul bataklık ve tuzcul çayır ekosistemleri, nehir boyunca tatlı suyun birikmesi sonucu oluşan tatlı su bataklık ekosistemi ve Gediz'in taşıdığı alüvyonların birikerek deltada oluşturduğu kıyı-kumul ekosistemleridir. Tüm bu farklı yaşam alanları Aşağı Gediz Havzası'nın sahip olduğu vejetasyonunu ilginç kılmaktadır.

Çalışmamızda Aşağı Gediz Havzası'nda yaklaşık 500 m yüksekliğe kadar olan kısmı kapsayan Akdeniz Katı (Akman v.d.1979) esas alınmıştır. Gerçekte, Kuzey ve Güney Ege ile ilgili somut vejetasyon kademelenmesi verilmekle birlikte, Orta Ege için bu eksik bırakılmıştır. Bu büyük oranda dikey kademelenmenin net görünmemesinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca bu çalışma ile daha önce Günel (2003) tarafından yapılan "Yukarı Gediz Havzası Bitki Coğrafyası" ve Uğurlu (2005) tarafından yapılmış olan "Orta Gediz Havzası Flora ve Vejetasyonu" çalışması ile birlikte, tamamlayıcı bir çalışma olarak, tüm Gediz Havzası'nın vejetasyonu bakımından bütünlüyci olacağı kanaatindeyiz.

Bitkiler yerkürede yaşayan ve diğer canlılarında varolmasına imkan sağlayan primer canlı grubudur. Bakteri, virus, mantar gibi alçak organizasyonlu canlıların dışında bitkiler diğer tüm canlılar için primer üreticileridir. Bu durumda bitkilerin değeri bir kat daha artmaktadır. Besin zincirinde ki bu önemlerinden ötürü bitkiler insanların varlık nedenidir. Çünkü insan yaşamı için gerekli tüm ihtiyaçlar doğrudan veya dolaylı olarak bitkilerden karşılanmaktadır. Günümüzde her ne kadar sentetik ürünler bitkilerin yerini almaya başladıysa da, bitkilerin insanlar için olan önemi hiçbir zaman azalmayacaktır.

Tüm bu ihtiyaçlardan dolayı insanoğlu doğduğu günden beri bitkilere ilgi duymuş ve onları tanımaya çalışmıştır. Botanik biliminin tarihi bu nedenle uygarlık tarihi kadar eskidir. Ancak bilimsel olarak konu ele alındığında, bitkiler ile ilgili ilk kitap Midilli adasında doğmuş olan Theophrastus (MÖ. 372-287) tarafından yazılmıştır. Theophrastus'un ilk kitabı "Bitkilerin Tarihi" anlamına gelen *Historia Plantarum* olup, orijinal olarak 10 cilttir. Bu kitapta Midillili doğa bilgini, bitkileri sınıflandırarak o yıllarda kullanılan bitkilerin hangi bölgelerde yetiştiğini kaleme almıştır. Teofrastus'un önemli ikinci eseri ise, "Bitkilerin Sebepleri" anlamını taşıyan *De Caucis Plantarum*'dur. Bu kitapta ise Theophrastus 500 kadar bitkiyi sınıflandırmış ve bu bitkilerin nerelerde kullanıldıklarını anlatmıştır. Botanik biliminin babası sayılan Theophrastus 'tan sonra gelen önemli bir botanikçi de Dioscorides'tir. (MS.40-90) Nero'nun saygı duyduğu kişilerden olan Dioscorides Roma'da yaşamış bir hekim, eczacı ve doğa bilgini olup; özellikle tıbbi bitkiler ile ilgilenmiş ve bu konu ile dünya genelinde bir ilk olarak kabul edilen, *Materia Medica*'yı (Tıbbi Materyaller) yazmıştır.

Antik Çağda yer alan bu botanik çalışmaları İlkçağda yavaş bir seyir ile ilerlerken Ortaçağa gelindiğinde büyük bir ivme kazanmıştır. Ortaçağda yeni toprakların keşfedilmesi ve bu yeni ülkelerden getirilen bitkilerin Avrupa'da yetiştirilmesi üzerine toplam bitki türleri artmış ve bunların sınıflandırılması ihtiyacı doğmuştur. Bunun üzerine sistematik botanik çalışmaları

hızlanmıştır. XVIII. Yüzyılda Carl Von Linneus adı verilen İsveçli bilim adamı ikili isimlendirme (Binomial Nomenclature) sistemini kullanarak bugünkü sistematik botaniğin temelini atmıştır.

Ortaçağa kadar insanlar genellikle bitkiler ile tekil olarak ilgilenmiş, onların ne işe yaradıklarını ve nasıl yetiştirebileceklerini öğrenmeyi amaçlamışlardır. Bitki örtüsü ile ilgili çalışmalar ise, ancak XIX. yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır. Bu yıllara kadar bitkiler tek başlarına yaşayan canlılar olarak nitelendirilmiş ve onların da diğer canlı gruplarında olduğu gibi grup halinde yaşayacakları düşünülmemiştir. Bu düşünce, yani bitkilerin gruplar halinde yaşaması ve diğer canlı ve cansız etkenler ile etkileşim içerisinde olduğu düşüncesi yeni bir bilim dalı olan Vejetasyon Biliminin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Vejetasyon, kutuplardaki buz tabakaları dışında, yeryüzünü kaplayan en önemli özellik olup kısaca bir bölgedeki çeşitli türlerden veya aynı türün çok sayıdaki bireylerinden oluşmuş bitki topluluğunu ifade etmektedir. (Seçmen 2000) Bitkilerin ve bitki topluluklarının yapısı, birleşimleri, gelişimleri, yaşadıkları ortam ile ilişkilerinin incelenmesi ve sınıflandırılması vejetasyon biliminin konularını oluşturmaktadır.

Bitki sosyolojisi veya sintaksonomi, diğer adıyla vejetasyon ekolojisi; bitki birliklerini araştıran bir bilim dalıdır. Bitki birliği doğada türlerin tesadüfen bir araya geldikleri bir birim değildir. Aksine, bir kısım ekolojik faktörlerin etkisi altında floristik yapısı az çok tayin edilmiş, iklimle denge halinde olan, az çok değişmeyen ve bir kısım karakteristik türlerle tayin edilmiş bir birim olarak kabul edilir (Akman v.d. 1992).

Ülkemizde bitki örtüsü ile ilgili araştırmalar ilk defa 1656 yılında J. Pitton de TOURNEFORT ile başlamıştır. Daha sonra Boissier (1865-1885)'in "Flora Orientalis" isimli eseri Türkiye florası konusunda en kapsamlı ilk eseri oluşturmuştur. Bu eserin yayınlandığı 1800'lü yıllarda Türkiye vejetasyonu sadece genel yapı olarak ortaya konulmuştur. Bu bağlamda çalışmalar öncelikle flora alanında yoğunlaşmıştır. Türkiye Florası alanında halen en kapsamlı eser Davis (1965-1985)'in editörlüğünde hazırlanan eseridir. Bu eser Davis vd. (1988) ve Güner vd. (2000) tarafından hazırlanan tamamlayıcı nitelikteki iki ciltle birlikte 11 cilde ulaşmıştır.

Bitki birlikleri ya da genel anlamda vejetasyon ile ilgili yapılan çalışmalara bakacak olursak, bu konu ilk kez 1807 yılında Alman botanikçi Von Humboldt tarafından ele alınmıştır. Humboldt konuya daha çok bitki coğrafyası anlamında yaklaşmıştır. Bu tarihten sonra Ch. Flahault ve Scröter 1910 yılında Brüksel'de toplanan botanik kongresinde Bitki Birliği ve Bitki Grubu tanımlarını kavramları ile ilgili gerekli bilimsel açıklamayı getirmişlerdir. Böylece modern bitki sosyolojisinin temeli atılmıştır. Brüksel'de yapılan botanik kongresinden 5 yıl sonra 1915

yılında Braun-Blanquet, bitki birliđi için fizyonomik özelliklerden uzak daha açık bir tanımlama getirmiştir. Buna göre bitki birliđi, yetiştirildiđi çevrede denge halinde olan ve az çok deđişmeyen, karakteristik bir kısım türler ile floristik yapısı tayin edilmiş, belirli bir ekolojinin varlığını ortaya koyan bir bitki grubudur şeklinde tanımlanmıştır (Akman v.d. 1992).

Nihayet 1935 yılında Amsterdam'da toplanan VI. Uluslararası Botanik kongresinde *Bitki Birliđi* terimi, bitki sosyolojisinin temel kategorisi olarak kabul edilmiştir. 1955 yılında ise M. Guinochet bitki birliđi terimini tamamen floristik bir tanıma dayandırarak, bitki birliđinin, alınan örneklik alanların tümünden oluşan türlerin toplamı ile karakterize edileceđini söylemiştir.

Türkiye vejetasyonu konusundaki çalışmalara bakılacak olunursa vejetasyon bilimi ülkemizde son 40 yıl içersinde hız kazanmıştır. Floraya nazaran bu çalışmalar daha az tartışmalı olmasına karşın, "Türkiye Florası" kadar kapsamlı deđildir.

Vejetasyon alanında Walter (1956, 1968) ve Regel (1965)'in çalışmaları Türkiye'nin fitocoğrafik özellikleri konusunda oldukça ayrıntılı bilgiler içermektedir. Zohary (1973) ise, Anadolu'nun büyük kısmını da içeren çalışmasında Orta Dođunun vejetasyonunu jeobotanik bakış açısıyla incelemiş ve floristik bileşimlerine göre bir çok vejetasyon tipini tanımlamıştır. Buna karşılık Türkiye vejetasyonu konusunda fitososyolojik çalışmalar, Zohary ile eş zamanlı olarak Quézel tarafından başlatılmıştır. İsraili araştırmacı Zohary'nin jeobotanik ve fitocoğrafik (bitki coğrafyası) yaklaşımına karşı Quézel asosiasyon (birlik) kavramını esas almış ve belirlediđi asosiasyonlar sınıf, ordo, alyans gibi üst ünitelerde toplayarak, sintaksonomik olarak sınıflandırmıştır.

Vejetasyon ekolojisinin temel birimi olan bitki birlikleri, orman, çayır, maki, bataklık vb. gibi bitki formasyonlarına verilen isimler ile karıştırılmaması gerekmektedir. Bu birimlere genellikle bitki grubu adı verilmektedir. Bitki birlikleri ise, tıpkı sistematikteki tür gibi soyut bir kavramdır. (Akman, 1995) Bitki birliđi deđişik şekillerde tarif edilebilir. Buna paralel olarak basit bir bitki birliđi tanımı verecek olursak, bitki birliđi; bazı ayırt edici ve karakteristik türlerle floristik yapısı tayin edilmiş ve yaşadığı çevre ile denge halinde olan, az çok deđişmeyen bir topluluktur. Bitki sosyolojisi sistematiiđinde bitki birliklerinin alt ve üst birimleri de mevcuttur. Buna göre, örneđin sınıfın üzerinde yer alan katagoriye üst sınıf, altında yer alan katagoriye ise alt sınıf adı verilmektedir.

Zürih – Montpellier ekolüne karşın, daha çok İskandinavya ülkelerinde kullanılan yaklaşımda ise Komünite temel ünite olarak alınmaktadır. Bu aynı zamanda "Habitat yaklaşımı" olarak da isimlendirilebilir.



Komünite (İng. Community, Fr. Communauté) sözcüğü Türkçe “Topluluk” anlamına gelmektedir. Bazı kitaplarda “Biyolojik Komünite” kavramı kullanılmışsa da bu pek de geçerli değildir ve sadece komünite demek yeterlidir.

Biyolojik olarak komünite, en genel biçimiyle “belli bir alan ya da habitatta yaşayan popülasyonların tümü” olarak ifade edilebilir. Komünite, benzer çevresel isteklere sahip ve birlikte yaşayabilme yeteneği gösteren popülasyonlar kümesidir.

Doğal komünitelerin sınırını çizmek oldukça zordur. Genellikle bunlar iç içe girmiş durumdadırlar. Hayvanlar aleminde bazı komüniteler, özellikle besin zinciri bakımından komşu komünitelerden nispeten belirgin olarak ayrılmaktadır. Buna karşılık komüniteler, bakteriden ağaca değin yüzlerce ve hatta binlerce farklı popülasyondan oluşmuştur. Ancak her komünite için asıl belirleyici unsur, temel örtüyü oluşturan ve besin zincirinin ilk basamağında yer alan bitkilerdir. Bu nedenle de komüniteler çoğunlukla baskın bitki tür ya da türlerine göre ayrılırlar. Örneğin kızılçam ormanı, sedir ormanı, *Artemisia santolina* (pelinotu) stepi, *Quercus coccifera* (kermes meşesi) garigi gibi. Sucul komünitelerde ise ayırım; hızlı akan dere, kıyı çamur, kıyı kumul, tuzlu bataklık gibi genellikle fiziki faktörlere göre olmaktadır. Komünite ve birlik (asosiasyon) kavramları sıklıkla birlikte kullanılırsa da aralarında yaklaşım farkı vardır ve bu konu aşağıda işlenmiştir.

Komüniteyi ve daha genel anlamda ekosistemi oluşturan tüm canlılar eşit öneme sahip değildir. Burada asıl olan komünitenin kararlılığı için önemli canlı türlerini belirlemektir.

Komünitelerdeki canlılar arası enerji akışı, komüniteyi oluşturan türlerin birlikte yaşama nedenleri, popülasyonlar arası ilişkiler ve ekosistem bağlamında çevre baskısı ekolojinin önemli konuları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, komünitedeki enerji akışının araştırılması, komüniteyi tanımlamak için çoğu kez yeterli olabilmektedir. Bu çerçevede, özellikle karasal komünitelerde baskın bitki türleri, yüksek hayvan gruplarına ait popülasyonlar büyük önem taşımaktadır. Komünite analizleri yıllar boyu süren gözlemleri gerekli kılmaktadır. Ancak bu şekilde komüniteyi oluşturan popülasyonların dinamiği, komünitedeki enerji akışı vb. sorunlar tam olarak anlaşılabilir. Özellikle enerji akışının belirlenmesi, komünitelerin desteklenebilmesinde büyük önem taşımaktadır.

Komünitelerde bir diğer önemli etken de insan baskısı ve insanların doğal komüniteleri denetleme çabalarıdır. Son yıllarda popülasyonları denetlemek yerine, yaşama ortamlarının, diğer bir deyişle habitat ve biyotoplarını denetleyerek o popülasyonu kontrol altında tutma yaygın bir yaklaşım biçimi durumuna gelmiştir.

Komünite karşılığı kullanılan bir diğer kavram da asosiasyon (İng. & Fr. Association), Türkçe karşılığı ile “Birlik” Asosiasyon aynı zamanda sönoz (coenose) anlamına da gelmektedir. Gerçekte komünite ve asosiasyon kavramları, izlenen farklı araştırma yöntemlerini ifade etmektedir. Zira Anglo-Sakson ekolü, genelde varyans analizine göre komüniteleri tanımlarken; Braun-Blanquet (1932)’ in başı çektiği Zürih-Montpellier ekolüne göre, karakteristik ve ayırt edici türlere bağlı olarak birlikler betimlenmektedir. Bu bağlamda birlik “üniform bir fizyonomiye, özgün ekolojik koşullara ve belirli bir floristik bileşime sahip sosyolojik üniteler “ olarak tanımlanmaktadır. Nitekim Braun-Blanquet (1915) Bitki Birliğini “belirli bir ekolojinin varlığını ortaya koyan, bazı karakteristik veya sadece o birliğe ait bir kısım türlerle tayin edilen, yaşadığı çevre ile dengede olan ve nispeten değişmez bir bitki grubudur“ diye tanımlanmıştır (Akman v.d., 1992). Bu tanıma göre, karakteristik türler ve floristik bileşim aynı zamanda ekolojik parametrelerin de bir göstergesidir. Bu nedenle de floristik analiz, ekolojik analizden daima önce gelir. Karakteristik ve ayırt edici türler yardımıyla birlikler alyans, ordo, sınıf gibi ekolojik ve coğrafik ünitelerin bünyesinde toplanmaktadır. Karakteristik türlere dayalı bu sınıflandırma “sintaksonomi“ adını almaktadır. Zürih-Montpellier ekolü daha çok Akdeniz ülkelerinde kullanılmaktadır. Yöntem heterojen komünitelerde olumlu sonuç vermektedir. Ayrıca uygulanması kolay, kısa süreli ve pratiktir. Bu bağlamda, vejetasyonun, özelde bitki komünitelerinin yapısını genel olarak ortaya koyabilmek için tercih edilen oldukça uygun bir yöntemdir ve Türkiye’de de yaygın olarak kullanılmaktadır. Zürih-Montpellier ekolü tarafından yayınlanan ve gerçekte bu ekol için bağlayıcı olan “Uluslar Arası Bitki Sosyolojisi Adlandırma Kodu (Barkman vd., 1986) yayınlanmıştır. Koda göre “kuramsal olarak bitki komüniteleri gerçekte istatistik birimlerdir ve bu nedenle tekil raporlara değil, çok sayıda örnek alanı içeren tablolara dayanmaktadır.

Bu nedenle de bu ekole göre birlikler “floristik-istatistik“ birimlerdir. Tablolarda tür listelerin yer alması ve karakteristik türlere göre betimleme ve sınıflandırma yapılması, yöntemi, salt istatistiğe dayanan Anglo-Sakson ekolünden farklı kılmaktadır. Braun-Blanquet yöntemi uyarınca yapılan çalışmalarda birlikler bu koda belirtilen kurallara uygun olarak betimlenip, sınıflandırılmadıkça geçerli kabul edilmez.

Botanikçiler komünite ya da birlikleri daha çok yapı ve sistematik durumları ile, bunların alan ve zamandaki değişimleri ile ilgilenirken; zoologlar ise öncelikle işlevsel ilişkileri, yani beslenme ve enerji akışını dikkate almaktadırlar. Bu iki farklı yaklaşım komüniteyi ya da birliği betimlemek için yeterli görünmemektedir. Komünite analizlerinde *bütünsel yaklaşım ve tümünden gelim ilkesi*, günümüzde ekologlarca en fazla benimsenen yaklaşımlardır.

Komünite ve birlikle kavramlarının yanı sıra, genel olarak bu kavramlara eşdeğer farklı kavramlarda kullanılmaktadır. Örneğin İskandinav ülkelerinde, İsveçli Du Rietz (1921) tarafından geliştirilen yöntem uyarınca, bitki birlikleri “sosiasyon, konsosiasyon ve formasyon” gibi farklı isimler arasında belirlenir. (Akman v.d., 1992) Bu kısaca İsveç ya da Upsala ekolünün benimsediği yaklaşımdır. Yöntemin kullanıldığı ülkelerde (ki bunlar arasında kuzey Avrupa ülkeleri ve İngiltere’yi de sayabiliriz) flora fakir, vejetasyon ise homojen olduğundan, karakteristik ya da ayırt edici türlere dayalı komünite betimleri güçleşmektedir. Ekolde komüniteler ya da birlikler baskın (dominant) ve devamlı (constant) türlere dayandırılmaktadır. Böylelikle betimler floristik olmaktan çok fizyonomik bir özellik taşımaktadır.

Bir bakıma habitat yaklaşımı baskın türlere dayalı sosiasyon ve konsosiasyonları belirlemeyi amaçlamaktadır. Sosiasyon ve konsosiasyonu oluşturan türler, yukarıdan aşağıya, örnek alanlardaki bulunuş sayısına (frekans) göre sıralanmaktadır. Her bir habitatın fiziki özellikleri ve floristik bileşimi varyans analizlerine tabi tutularak, bunları oluşturan türler ve fiziki özellikler x, y, z boyutlarını içeren bir grafik üzerinde gösterilerek sosiasyon ve konsosiasyonlar tanımlanmakta, sosiasyon ve konsosiasyonlar arasındaki ilişkiler, genellikle, dendrogram şeklinde gösterilmektedir. Habitat yaklaşımına göre aynı komünite içerisinde çok sayıda sosiasyon ve konsosiasyon belirlenmektedir.

Bir komüniteyi üç boyutlu olarak düşündüğümüzde çok sayıda ekosistem bulunduğunu görürüz. Bu durumda, habitat yaklaşımını, sosiasyon adı altında hemen tüm ekosistemleri ayırmak anlamına da gelmektedir.

Asosiasyon (birlik) yaklaşımında ise ayırım “ karakteristik türlere göre yapılmaktadır. Her birlik karakteristik ve ayırt edici türlere göre tanımlanmaktadır. Zira Braun-Blanquet (1932)’ e göre doğada türler rasgele bir araya gelmezler, aksine ekolojik istekleri aynı olan türler bir arada yaşarlar ve oluşan topluluk kendi ekolojik koşullarını oluşturarak, başka türlerin de bünyesine katılmasına olanak verir. İşte bunlar karakteristik veya ayırt edici türlerdir. Bu türlerin belirlenmesinde kullanılan “sadakat skalası” ve Braun-Blanquet (1932) yöntemiyle ilgili bilgiler Materyal ve Yöntem kısmında verilmiştir.

Daha sonra birlikler alyans, ordo ve sınıf gibi üst ünitelerde toplanır. Burada temel kategori olan birlik, bir bakıma, Bitki Taksonomisinde temel kategori olan türe eşdeğerdir. Birlik, alyans, ordo ve sınıfların isimlendirilmesi “Uluslar arası Bitki Sosyolojisi adlandırma Kodlarına” uygun olarak yapılmalıdır. Birlik, alyans, ordo ve sınıflara karşılık gelen topluluklar sintakson olarak isimlendirilir. Bunlardan birlik floristik, alyans floristik-ekolojik, ordo ekolojik ve sınıf coğrafik ünitelerdir.

Türkiye vejetasyonuna ilişkin ilk sistemli çalışmalar 1900' lü yıllarda başlamıştır (Davis, 1965). Bunlardan Handel-Mazetti (1909) Doğu Karadeniz Bölgesi, Krause (1915-1932) İç, Batı ve Kuzey Anadolu Bölgelerinde; Türkiye genelinde ve İç Anadolu' da, Walter (1956-1962) Anadolu' nun genelinde ve İç Anadolu' da, Regel (1959) Türkiye genelinde, Yaltırık (1964) İstanbul Belgrad Ormanın' da çalışmalarda bulunmuşlardır. 1900-1960 yılları arasında gerçekleşen bu çalışmalarda genel vejetasyon yapısı ve fitocoğrafik özellikler ortaya konulmuştur. Schavers (Schavers 1935) ise Batı Anadolu' da, özellikle İzmir civarında Braun-Blanquet (1932)' nin "bolluk-yoğunluk ve sosyabilite" skalalarını kullanarak, fitososyoloji konusunda araştırmalarda bulunan ilk kişidir. Yine bu dönem içerisinde Regel (Regel, 1959) Türkiye' nin fitocoğrafik analizini sağlıklı biçimde ortaya koymuştur. Davis (1965) tarafından kullanılan fitocoğrafik ayırım Regel (1959)' inki ile aynıdır. Ayrıca Davis (1965), dip not olarak " siyasi amaç gütmeyişini ifade ederek, Anadolu'yu Lazistan, Ermenistan, Kürdistan gibi, 1923'te imzalanan "Lozan Anlaşmasına" rağmen etnik kökene dayalı bölgelere ayırmıştır. Batılı Botanikçilerin nedeni belirsiz bir hevesle benzer ayırmaları içeren haritalar kullanması halen devam etmekte olup, Türk botanikçiler tarafından çok sert eleştirilere neden olmaktadır. Ancak tüm itirazlarımıza karşın, bu ayırmadan vazgeçmemesi düşündürücüdür. Davis (1965-1985), Davis ve arkadaşları (1988) 10 ciltlik eserin son ciltlerinde bu tür ayırmalardan vazgeçmişlerdir. Son ayırmalar Güner ve arkadaşları (2000) tarafından da kullanılmıştır. Ancak vazgeçilen tüm bu ayırmalarda fitocoğrafik bölgelerin alt birimlerini oluşturan alanlar isimlendirilmemiştir. Çalışmalarımızda bu isimler belirlenerek, Türk Dil ve Tarih Kurumu'nca da onaylanmıştır.

1960' lı yıllardan sonra Türkiye vejetasyonuna ilişkin çalışmalar hız kazanmıştır. Bu çalışmalarda Akdeniz Havzası'ndaki diğer ülkelerce de benimsenen Braun-Blanquet (1932) yöntemi kullanılmıştır. (bk. Özdek ve Yöntem). Bu alanda özellikle 1960' lı ve 1970' li yıllarda Çetink (1985)' in çabaları yadsınamaz. Bu dönemde yapılan çalışmalar baskın türlere dayalı olup, örnek alanlarda bulunan türler, Braun-Blanquet (1932)' nin skalaları kullanılarak, yukarıdan aşağıya, baskınlık ve bulunuş sayılarına göre listelenmiştir. Bir diğer deyişle birlikler değil, sosiasyonlar ve konsosiasyonlar belirlenmiştir. Bununla birlikte, bu çalışmalar sayesinde Türkiye vejetasyonu nicel olarak ortaya konulabilmiştir. Zohary (1973)' ün çalışmaları da benzer niteliktedir. Aynı dönemde Fransız fitososyoloji uzmanı Quézel (1973) Toros Dağları' nda yüksek dağ vejetasyonu üzerinde, sintaksonomik kurallara uygun vejetasyon çalışmalarında bulunmuştur. Daha sonra Adil Pamukçuoğlu ile birlikte Kuzeybatı Anadolu' nun yüksek dağ vejetasyonu (1970) ve Torosların bazı orman gruplarının fitososyolojik ve biyoklimatolojik özelliklerini çalışmışlardır (1973).

Türkiye Vejetasyon Ekolojisi ve Sintaksonomi alanındaki asıl atılımı Yıldırım Akman' ın devreye girmesi ile gerçekleştirmiştir. 1970' li yılların sonlarından başlayarak; Akman, Barbero

ve Qu zel (1978, 1979) Anadolu' nun Akdeniz kesimi Maki ve Orman Vejetasyonlarını Akman, Barbero ve Qu zel (1978, 1980) sırasıyla Dođu Akdeniz ve Kuzey Anadolu Orman Vejetasyonunu alıřmıřlardır. Akman, Ketenođlu, Demir rs ve Qu zel (1984) İ Anadolu Vejetasyonunu; Akman, Barbero, Qu zel, Barbero, Ketenođlu ve Aydođdu (1991) Antitorosların vejetasyonunu sintaksonomik olarak sınıflandırarak, adeta T rkiye vejetasyonunun atısını kurmuřlardır. Bu arada Alman arařtırıcı K rschner (1982, 1984, 1986), bařta İ Anadolu ( zellikle Erciyes Dađı) olmak  zere G ney Anadolu vejetasyonu  zerine alıřmalar gerekleřtirilmiřtir.

Arařtırma b lgemize yakın evrede ise, Semen (1977) Nif Dađı (İzmir) Vejtasyonunu, Bekat (1980) Bozdađ Vejetasyonunu, Gemici (1981) Yamanlar Dađı (İzmir) Flora ve Vejetasyonunu, G rk (1982) Eđrig z Dađı (Emet) ve evresinin Flora ve Vejetasyonunu, Duman (1985) Spil Dađı (Manisa) Flora ve Vejetasyonunu, Gemici (1986) Akdađ ve evresinin (Denizli) Flora ve Vejetasyonunu, řık (1992) Yunt Dađı Flora ve Vejetasyonunu, Gemici (1994, 1999) "Batı ve G ney Anadolu Y ksek Dađ Flora ve Vejetasyonunu, Vural vd. (1995) K yceđiz – Dalyan ve evresi'nin Vejetasyonunu, elik (1996) Aydın Dađları'nın Flora ve Vejetasyonunu,  zel (1998) Kaz Dađları'nın Orman Vejetasyonunu, Oluk (1999) Baba Dađı'nın (Denizli) Flora ve Vejetasyonunu, etin (2003) Boncuk Dađları'nın (Burdur) Flora ve Vejetasyonunu, G nal (2003) Yukarı Gediz Havzası'nın bitki cođrafyasını ve son olarak Uđurlu (2005) Orta Gediz Havzası'nın Flora ve Vejetasyonunu alıřmıřtır.

T m bu alıřmalarda Braun-Blanquet ekol ne bađlı kalmakla birlikte, K rschner ve  đrencilerinin alıřmaları T rk fitosoyologları tarafından benimsenmemiřtir. Bu alıřmaların dıřında, son eyrek y zyılda T rkiye genelinde pek ok lokal vejetasyon alıřmaları gerekleřtirilmiřtir.

alıřmalarımızın  nemli bir kısmını oluřturan vejetasyon ekolojisi ve sintaksonomi, genel olarak, yukarıda tartıřılan literat r bilgisi iřıđında deđerlendirilmiřtir.

Burada alıřmamızla ilgili olarak bazı konuları netleřtirmemiz uygun olacaktır. Yakın zamana kadar "Bitki Ekolojisi ve Cođrafyası" botanik biliminin temel alıřma alanlarından biriydi. Bu bađlamda flora ve vejetasyon alıřmaları bu kapsamda deđerlendirilmekteydi. Malesef  zelde Bitki Cođrafyası, genelde Biyocođrafya, son d zenlemelerde sosyal bilimlerden Cođrafya' ya dahil edilmiřtir. Oysa Fransız bilim adamı Lem e' nin de belirttiđi  zere "biyocođrafyanın objesi canlılardır ve bu nedenle Biyoloji ierisinde yer alması gerekir". Zira fiziki cođrafyacılar sadece vejetasyon tipleri ile ilgili genel bilgileri ortaya koyarlar. Onlar iin asıl olan formasyonlardır. Oysa biyocođrafya flora ve faunanın gemiřteki ve g ncel yayılıřının yanı sıra;

ekosistem, kommünite, birlik gibi kavramların ayrıntılı dökümanını vermektedir. Bu kavram kargaşasını gidermek için, bitki coğrafyası yerine, onunla aynı anlama gelen, ancak botanik biliminin temel dallarından birini oluşturan “Jeobotanik” bilim dalını kullanmak daha uygun olacaktır. Ekoloji önceden Bitki ve Hayvan Ekolojileri olarak ayrılmış olmasına karşın, şimdi biyoloji biliminde salt Ekoloji olarak geçmektedir. Gerçekte Hayvan Ekolojisi daha çok davranış ve adaptasyonu içeren Ekofizyoloji olarak algılanmalıdır. Buna karşılık Ekoloji Bilimi, temel örtüyü oluşturan bitkilere öncelik tanıdığı için Botanik Bilimi’ nin bir kolunu oluşturmaktadır. Pratikte vejetasyon ekolojisi, sintaksonomi gibi alanlar ekoloji biliminin temellerini oluşturmaktadır.

Ülkemizde bir diğer sorun da, tıpkı yeni tür belirlemelerinde olduğu gibi, ayrıntılı değerlendirmeler yapılamaksızın yeni asosiasyonların belirlenmesidir. Bu durum, “Uluslar arası Bitki Adlandırma Koduna (2000 versiyonu)”uyulmakla kısmen denetim altına alınmakla birlikte, henüz arzu edilen düzeye ulaşamamıştır.

Çalışmamızda bu durumlar gözetilerek, yanlışlığı payı asgariye indirilmeye çalışılmıştır.


## 2. ÇALIŞMA ALANININ GENEL ÖZELLİKLERİ

### 2.1. Coğrafi Konum

Gediz Nehri ve Havzası Batı Anadolu'da yer alan ülkemizin en büyük akarsuyu ve havzalarından biridir. Havza coğrafi bakımdan  $38^{\circ} 04' - 39^{\circ} 13'$  kuzey enlemleri ile  $26^{\circ} 42' - 29^{\circ} 45'$  doğu boylamları arasında kalmaktadır.



Harita 1: Aşağı Gediz Havzası'na ait uydu görüntüsü



Harita 2: Aşağı Gediz Havzası: Türkiye'deki konumu ve fiziki haritası

Gediz Nehri, Anadolu'da Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nden sonra ikinci büyük akarsudur. İç Batı Anadolu'daki Murat ve Şaphane dağlarından inen suların birleşmesiyle oluşan Gediz Nehri, batıya doğru ilerlerken, kuzeyden Kunduzlu, Selendi, Deliniş ve Derme Çaylarını, güneyden ise Kula volkanik yöresinden gelen küçük dereleri sularına katar. Nehir, Salihli ilçesinin kuzeydoğusundan Gediz Ovası'na girer ve güneyden Bozdağlar'dan gelen çok sayıda akarsularla, Kemalpaşa Ovası'ndan gelen Nif Çayı'nı da sularına katarak Foça Tepeleri'nin güneydoğusundan İzmir Körfezi'ne dökülür. Nehrin toplam uzunluğu 401 km olup su toplama havzası ise 17.500 km<sup>2</sup> dir. Taşkın dönemlerinde sık sık yatak değiştiren Gediz Nehri, yaklaşık 40.000 ha'lık bir delta oluşturmuştur. Zaman içerisinde İzmir Körfezi'ndeki bazı adalar da kara ile birleşmiş ve delta ovası içerisinde kalmıştır.

Gediz Havzası, büyüklüğü nedeni ile coğrafi ve ekolojik özellikleri göz önünde tutularak genel olarak üç kısımda incelenmektedir. Buna göre havza, Yukarı Gediz Havzası, Orta Gediz Havzası ve Aşağı Gediz Havzası olarak 3 kısma ayrılmaktadır. Bu bağlamda proje sahası olan Aşağı Gediz Havzasının sınırları batıda Menemen ve Aliğa, güneyde; Emiralem, Manisa Spil Dağı, güney doğuda Turgutlu, doğuda; Salihli, Demirköprü Barajı, Marmara Gölü ve kuzeybatısında; Yuntdağı, kuzeyinde ise Helvacı, Üçpınar ve Paşaköy ile Saruhanlı ilçesi ile sınırlandırılmıştır. (Harita 2)

Gediz havzası Türkiye'nin batısında Ege Bölgesi'nde yer alan, sularını Gediz ve kolları aracılığı (Harita 3) ile Ege Denizi'ne boşaltan, Ege, Susurluk ve Küçük Menderes Havzaları arasındaki sahayı kapsamaktadır.

Gediz Havzası, kuzeyde Ege ve Susurluk havzalarının güney sınırını teşkil eden Kara, Dumanlı, Kılıç, Karacaoğlan, Demirci, Simav, doğuda Murat, Koca, Kışla, Umurbaba, Uysal, güneyde Çal, Çulha, Bozdağ, Çatma, Çallıbaba, Mahmut, Nif ve Yamanlar Dağı arasında kalmaktadır. Gediz Havzası toplam olarak 1.721.895 hektar sahayı kaplamakta olup Türkiye'nin genel yüz ölçümünün % 2,2 sini teşkil etmektedir. Havza ulaşım yönünden iyi imkanlara sahiptir. Manisa, İzmir, Uşak, Balıkesir illeri asfalt yol ile birbirine bağlı olup, havzanın merkezi konumunda olan Manisa ili İzmir, Balıkesir ve Ankara illerine demiryolu ile de bağlıdır.





**Harita 3:** Gediz Nehri ve Kolları

Aşağı Gediz Havzası'nın araştırma alanı olarak seçilmesinde başlıca etken, bu sahada doğal bitki örtüsü hakkında kapsamlı bir çalışmanın yapılmamış olmasıdır. Bölgede şimdiye kadar çok sayıda çalışma yapılmasına rağmen yapılan çalışmalar genellikle küçük ölçekli olup bütün havza özelliklerini kapsamamaktadır. Bu nedenle Aşağı Gediz Havzası vejetasyon ekolojisi konulu çalışmada şimdiye kadar yapılmış flora vejetasyon çalışmalarından da faydalanarak alanın bir bütün olarak vejetasyonu ortaya konulup bölgenin ekolojik özellikleri de araştırılarak hem doğal bitki örtüsü hemde doğal olmayan (tarım alanları vs.) bitki örtüsünün günümüzdeki durumu tespit edilmiştir. Bu nedenle de bu çalışma uzun süreli ve titiz bir arazi çalışmasını gerektirmiştir.

## 2.2 Topoğrafya

Türkiye'nin batı kesiminde Ege denizine dikey olarak uzanan Batı Anadolu dağları arasında bulunan Gediz Havzası topografik bakımından iki durum arz etmektedir. Bunların birincisi havzanın çevresinde yer alan dağların oluşturduğu yüksek alanlar ve bu dağların eteklerinden oluşan eğimli araziler, ikincisi ise havzanın tabanında bulunan düzlük topografyadır. Bunlardan birincisi havzanın kuzey ve güneyinde, doğu-batı istikametinde uzanan ve Menemen'e kadar devam eden dağlık ve sarp kısımlardır. Bozdağ, Çal, Manisa, Yamanlar, Nif, Dumanlı, Yunt Dağları bu kısma giren yüksek alanlardır. Bu dağların etekleri kireç ve çakılca zengin gevşek topraklarla örtülüdür. Bundan dolayı erozyona çok müsaittirler. Bir çok yerde doğal örtüyü teşkil eden fundalıklar tarla açma nedeniyle tahrip edildiğinden erozyona fazla uğramış ve yan dereler vasıtası ile de ovaya yakın yerlerde büyük zararlar

görerek arazilerin verimsiz hale dönüşmesinde büyük rol oynamışlardır. Bu durum özellikle Turgutlu- Salihli arasındaki arazilerde bariz bir şekilde görülmektedir. İkinci grup ise Menderes masifinden olan ve III. zamanın sonlarına doğru meydana gelen tektonik çöküntünün havzada mevcut akarsuların taşıdığı sedimentler ile IV. Zamanda meydana gelen ovalardır. Gediz ovaları havzanın yukarısında nehir boyunca dar bir şerit şeklinde olmasına rağmen havzada denize doğru gidildikçe ovalar genişlemektedir. Araştırma alanında yer alan Adala, Akhisar, Salihli, Turgutlu, Ahmetli, Menemen Ovaları bu gruba girmektedir. Bu ovalar genellikle doğu-batı istikametinde dağlar arasında uzanmakla birlikte, değişik yönlerde özellikle kuzey ve güney yönünde uzanan ovalarda mevcuttur.

Batı Anadolu'da menderes masifi dahilinde kabaca doğu-batı yönünde uzanan ve içlerinden nehirlerin geçtiği 60-120 km kadar uzunlukta, birkaç bin metre genişlikte ve deniz seviyesinden 200 m kadar yükselen, tabanı alüvyonlarla örtülü olan dar ve derin oluklar bulunmaktadır. Araştırma alanı olan Gediz Havası da bu oluşumun içerisinde yer almaktadır.

Neojen'de bir peneyen halinde uzanan Menderes masifi, sonradan kuzeyde ve güneyde bükülerek merkezi kısımda ise yükselmek suretiyle kubbeleşmiştir. Böylece, Neojen'de uzun bir aşınım safhası başlamış ve bunun sonucunda, bir taraftan pre-Neojen peneyenler oluşmaya başlamış, bir taraftan da bu şiddetli aşındırmanın ürünü olan enkaz, kalın Neojen depoları halinde çevre kısımlarda depo edilmişlerdir. Neojen'i takiben bölge ikinci defa kuvvetli tektonik karakterler sahne olmuş, bunun sonucunda parçalanmış ve muhtelif fay blokları halinde yükselmiştir. Kısa süren aşınma devresini takiben Kuaterner başlarında masif yükselmiş ve masifin yükselen kısmından alınan enkaz, masifin kenarlarında kaba unsurlu malzemeler halinde çökmüş ve böylece Tmolos depoları oluşmuştur. (Atalay 1987) Pleistosen'in ileri bir devresinde masif faylar ile parçalanmış, Bozdağ ve Aydın dağlarına rastlayan yüksek bloklar ile Küçük Menderes ovasının bulunduğu çökmüş bir fay bloğu oluşmuştur. Bu arada masifin kenarları da çökmüş ve bu alanlarda da Gediz ve Büyük Menderes ovaları gelişmiştir. Başlangıçta kapalı havza halinde bulunan Gediz depresyonu kopma ile Menemen boğazının açılması sonucunda dış dreja bağlanmıştır.

Özetle, yukarıda açıklandığı gibi oluşan Gediz Havzasının çalışma alanını oluşturan Aşağı Gediz Havzası'nda başlıca üç tip jeomorfolojik ünite ayırt etmek mümkündür. Bunlar yüksek alanlar, boğazlar ve ovalardır.

### 2.2.1 Yüksek alanlar

Havzanın çevresinde, yüksekliği yaklaşık 1000-1500 m arasında olan dağlar bulunmaktadır. Bunlar araştırma alanının doğusunda yer alan Çal dağı, Dibek dağı, güneyinde Manisa dağı, Yamanlar dağı, kuzeyinde Yunt dağı, kuzey doğusunda Dumanlı dağ ve Foça tepelikleridir. Yüksek alanlar iklim üzerinde yaptıkları etkileriyle önemlidir. Bu yüksek alanlar hava akımlarını etkiledikleri için havzanın taban kısmında lokal bir mikro klima yaratmaktadır. Bunun dışında yüksek alanlar bitki çeşitliliği bakımından da önem arz etmektedir. Genel olarak alçak kesimlerde maki türleri ve meşe çalılıkları görülürken, yüksek alanlarda çoğu kez bu topluluklar yerlerini kızılçam, karaçam ve meşe ormanlarına bırakmaktadır. Bu ormanlar da yaklaşık 1000-1200 m lardan sonra yerlerini otsu ve yarı çalı bitki türlerine bırakmaktadır. Ayrıca bu tip yüksek alanlarda rüzgarların etkisiyle topraklarda tuzlanma, kar baskısı nedeniyle bitkilerin formlarında da önemli değişiklikler görülmektedir. Bu ve benzer nedenlerden ötürü bu tip alanlarda genel olarak havzaların taban ve alçak kısımlarında görülen bitki topluluklarından farklı özelliklere sahip topluluklar görülmektedir. Araştırma alanının çevresinde yer alan Manisa ve Yamanlar dağı bitki örtüsü bakımından zengin bölgelerdir. Her iki dağda kızılçam ve karaçam ormanları hakim durumdadır. Yine araştırma alanı çevresinde yer alan Çal dağı, Dibek dağı, Yunt dağında meşelikler hakimdir. Foça tepelikleri ise zaman içerisinde büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Bu sebeple günümüzde kısmen maki toplulukları görülse de büyük ölçüde frigana ile kaplıdır.

### 2.2.2 Boğazlar ve Geçitler

Bu bölüme giren bölgeler, Aliğa geçidi ve Menemen Boğazıdır. Havzanın geri kalan kısmı daha geniş bir tabana sahip olduğu için bu tip geçitlere sahip değildir. Foça tepelikleri doğuda kesintiye uğrar ve burada Dumanlı Dağ ile Foça tepeleri arasında kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan geniş bir koridor yer alır. Bu koridora Aliğa geçidi adı verilmektedir. Gediz deltasına açılan bu vadimsi geçidin zemini alüvyal nitelikli sedimanlar ile doludur. Bu vadinin doğu yamaçlarında Dumanlı Dağ'dan inen derelerin az eğimli birikinti konileri yer alır.

Menemen Boğazı, Gediz Nehri'nin getirdiği alüvyonları elemesi dolayısıyla Gediz Deltasının oluşumunda çok büyük rol oynamıştır. Menemen boğazı doğuda Manisa havzası, batıda İzmir körfezi ve Gediz Deltasına açılan tektonik kökenli bir boğazdır. Menemen'e doğru giderek daralan delta ovası, daha doğuda geniş bir vadi tabanı görünümünü alır. Bu şekilde

Emiralem'e kadar sokulan taban buradan itibaren birden daralır ve dar bir boğaz şeklini alır. Emiralem – Ayvacık istikametinde uzanan boğaz Muradiye'de yeniden genişleme başlar ve Manisa ovasına açılır. Gediz boğazının oluşumunu Erinç (1955) şöyle açıklamaktadır. Yörede görsel Neojen tortulların birikim safhasını izleyen dönemde meydana gelen epirojenik stildeki genç tektonik hareketlerle ortaya çıkan yeni eğim özelliklerine bağlı olarak Pliosen'den Pleistosen başlarına kadar devam eden süreçlerle geniş bir aşınım yüzeyi meydana gelmiştir. Daha genç tektonik hareketler bu yüzeyi de etkileyip parçalanmasına neden olmuştur. Orta yükseklikte plato halinde görülen bu aşınım yüzeyi parçaları bugün İzmir Körfezi çevresinde ve Gediz Boğazı kuzeyinde görülmektedir. Bütün bu hareketler sonucundaki bugünkü depresyonlar ve bunları ayıran blok ve eşikler ortaya çıkmıştır. Manisa ve İzmir depresyonlarının da bu hareketlerle meydana geldiğini kabul eden Erinç, bu iki depresyonun Menemen doğusunda bir eşikle ayrıldığını düşünmektedir. Erinç'e göre Manisa Havzası bu dönem içinde bir göl bulunan kapalı bir havza durumundadır. Aynı dönemde İzmir Körfezine doğru olan kesim, Pleistosen ortalarına doğru sokulan deniz suları ile kaplı geniş bir körfezdir. İşte bu dönemde depresyonları ayıran Menemen doğusundaki eşiğe yerleşen iki akarsudan biri İzmir Körfezine, diğeri Manisa depresyonuna doğru akış gösteriyordu. Bu akarsulardan İzmir körfezine doğru olan küçük akarsuyun derine ve özellikle geriye aşındırması, son buzul döneminde deniz seviyesinin -90 m lere kadar alçalmasıyla oldukça hızlanmıştı. Buna bağlı olarak akarsu Manisa havzasına akan eşiğin doğusundaki akarsuyu kapmış ve buradaki kapalı havzada dış drenaja açılmıştır (Erinç, 1955). Bu şekilde menemen boğazı ortaya çıkmıştır. Son buzul dönemini izleyen Holosen transgresyonu ile yükselen deniz suları körfezi kaplamıştır. Erinç, Gediz Nehrinin ilk deltasının, son buzul dönemindeki alçak deniz seviyesine bağlı olarak gelişmesi nedeniyle bugünkünden daha batıda ve o zamanki kıyı bölgesinde olması gerektiğini ifade etmiştir.

### 2.2.3 Ovalar

Aşağı Gediz havzasında yer alan ovalar, Akhisar Ovası, Salihli-Turgutlu Ovaları, Menemen Ovası ve ovalara ek alçak alanlar olarak kabul edilen Gediz Deltasıdır. Araştırma alanın kuzeydoğusunda kalan Akhisar havzası bulunmaktadır. Havzanın en yüksek yeri, kuzeydoğudaki Göremez Dağı (Yayla Tepe 1280 m), en alçak yeri ise ortalama 60 m ile Kumçayı boğazının tabanıdır. Suları Kumçayı aracılığıyla Gediz'e boşalan ve böylece dış drenaja bağlanan Akhisar Havzası'nın temelini Paleozoik yaşındaki metamorfik ve bazı kısımlarda metamorfik olmayan çeşitli şistlerle, kristalize kalker ve mermerler oluşturmaktadır. Bu temel üzerinde kalker ve kristalize kalkerlerin egemen olduğu Mezozoik formasyonları diskordant olarak bulunurlar. Bunların üzerine ise yine diskordant olarak yer yer volkanik ara tabakalı karasal Neojen formasyonları (kalker, marn, kilitaşı, konglomera vs.) gelir. Bütün bu

formasyonlar, tektonik hareketler sonucu kıvrılmış, kırılmış veya çeşitli yönlere doğru eğilmişmiştir. Akhisar Havzası içinde, Batı Anadolu veya Ege Bölgesi'nin yoğun tarımsal faaliyetleri yapılan Akhisar Ovaları yer almaktadır. Çevrelerindeki nispeten yüksek alanlardan akarsularla taşınmış çeşitli boyuttaki unsurların, bu genç çöküntü havzasında birikimi sonucunda oluşmuş bulunan bu alüvyal ovaları Selendi, Mecidiye, Selçikli ve Bükmüş ovaları oluşturur. Aşağı Gediz havzasının başlangıcı olarak kabul edilen Demirköprü Barajından sonra yer alan Salihli ve Turgutlu Ovaları'nın oluşumu Akhisar ovalarına benzetmekle birlikte Havzanın güney sınırını teşkil eden Bozdağ ve Bozdağ'dan inen küçük çayların getirdiği alüvyalların birikmesi sonucunda oluşmuş birikinti ovaları şeklindedir.

Gediz nehrinin getirip kıyıda biriktirdiği kum kil ve siltlerden oluşan Gediz Deltası'ise ülkemizin 4. büyük deltası olup 70-80 km<sup>2</sup> lik bir alanı kaplamaktadır. Gediz deltası güneyde İzmir Körfezi kuzeyinde başlamakta, kuzeyde Eski Foça – Buruncuk paraleline kadar uzanmaktadır. Kuzeyde Eski Foça sırtları, kuzeydoğuda Dumanlı dağı (1098m) ve doğuda Yamanlar Dağı (1075 m) ile çevrilidir. Merkezi kısımdaki yüksekliği 4-5m kadar olan (Menemen'de 20 m) delta üzerinde pek çok kopmuş menderes halkaları bulunmaktadır. Bunlar, Gediz'in terk ettiği eski yataklarıdır. 1886 yılına kadar güneydeki İzmir körfezine akan Gediz, getirdiği alüvyonlarla burayı hızlı bir şekilde doldurmaya başlayınca, yatağı önüne setler çekilmek suretiyle değiştirilerek batıya doğru yöneltmiştir. Bugün, Eski Foça güneyindeki Kırdenez'de son bulmaktadır .

### 2.3 Yapısal Özellikler

Araştırma alanı olan Aşağı Gediz Havzasının jeolojik temelini Paleozoik yaşlı Menderes masifi oluşturmaktadır. Bu kütlede, Mesozoik yaşlı kristalize kireçtaşı, Neojen ve Pliokuaterner depoları, Kuaternere ait alüvyaller ve volkanik kayalar yer almaktadır. ( Harita 4)

Menderes masifinin yaşı hakkında kesin bir bilgi mevcut olmamakla birlikte bunun kuvarsitler, filladlar ve şistlerden ibaret olan bir kısmının Silüriyen'den eski olduğu tahmin edilmektedir. Gediz çöküntüsünü güneyden; bazı kesimlerde de kuzeyden çevreleyen Neojen devri araziler bulunmaktadır. Oldukça kalın tabakalar meydana getiren ve çoğunlukla bağıntısız çakıl, kum ve kilden ibaret olan bu seri geniş ölçüde havzayı tesiri altında bulundurmaktadır. Erozyona çok uygun olan bu materyaller sularla taşınarak ovada yan alüvyal denilen toprakları meydana getirmektedir. Gediz vadisini dolduran sedimentler şüphesiz Kuaterner devrine aittir.

Havzayı etkisi altında bulunduran Menderes masifi petrografik bakımından şiddetli değişikliğe uğramış kristalin şistleri barındırır. Bunlar yer yer mikalı ve grenatlı gnayslarla, distenli şistler ve amfibolitlerden ibaret olup bazen mermerlere de rastlanmaktadır. Manisa ovasının kuzey batısında bazalt ve andezitlerden ibaret kütleler uzanmaktadır. Menderes masifi tektonik bakımdan Hersenien kıvrımlarından daha eski olduğu kabul edilmekte ve Prekambriyen veya en eski Paleozoik kıvrımları ile ilişkili olduğu görülmektedir.

Havzada görülen jeolojik formasyonlar beş grup altına toplamak mümkündür. Bunlar: Paleozoik-metamorfik formasyonlar, Mesozoik/ kristalize kireçtaşı ve mermerler, Neojen ve Pliokuaterner örtü depoları, volkanik kayalar ve Kuaterner alüvyonlardır.

### **2.3.1. Paleozoik / Metamorfik Formasyonlar**

Aşağı Gediz Havzası'nın temelini oluşturan en yaşlı birimi Menderes masifinin bir parçası olan Bozdağ kütlesi ile kuzeyde Dibek dağı oluşturmaktadır. Araştırma alanı genel olarak Bozdağ ile Yunt dağı arasından uzanıp, Ege Denizi'ne kadar uzanmaktadır. Bozdağ metamorfik kütlesi Paleozoik şist serisi ile bunlardan daha yaşlı kompleks gnayslardan oluşmuştur (Koçman,1989). Bu granitik gnayslar pembe, beyaz kristalli olup Menderes masifinin çekirdeğini temsil eden gözlü gnays, biyotitli gnayslarla yanal ve dikey geçişli olup, kuvars damarlı olanlarda mevcuttur. Gnays serisi ince taneli ve mikalı gnays, bantlı gnays, granitik gnays gibi kaya birimlerinden oluşmaktadır. Belirtilen çekirdeği örten şistler ise daha çok mikaşist, fillit ve mermeri içermektedir. Bunlar Bozdağların orta ve kuzey kesimlerinde yaygındır. Yine Dibek dağı'nın batı ve orta kesimlerinde Gölarmara çevresinde örtü şistleri ile birlikte bulunan mermerleri görmek mümkündür (Çukur, 1992).

Masifin çekirdek kısmını oluşturan kayaların Prekambriyen, örtü şistlerinin Alt Paleozoik, mermerlerin ise Üst Paleozoik olduğu belirtilmiştir. (Koçman, 1987)

### **2.3.2. Mesozoik / Kristalize Kireçtaşı ve Mermerler**

Alanda Mesozoik birimleri fosil tanımlarına göre Kretase beyaz, gri-esmer masif kireçtaşı ve mermerler meydana getirmektedir. Mesozoik yaşlı bu seriler, Paleozoik üzerine uyumsuz (diskordant) olarak gelirler. Bu seri içinde kristalize kireçtaşı hakim olmak üzere mermer, marn,

kumtaşı, grovak radyolorit ve bunlarla birlikte ofiyolitler yer almaktadır. Mesozoikte oluşan bu birimler, Alp orojenezi sırasında çarpılması, kıvrımlanması ve neotektonik rejimin etkisiyle kırıklar gelmesi ile karışık bir görünüm almıştır. Kıvrım eksenleri genellikle kuzeybatı-güneydoğu, yer yer doğu-batı yönlüdür (Çukur, 1992). Kristalize kireçtaşları alanın batı kesimindeki Karadağ'ın güney taraflarında, Gölarmara ilçesinin kuzey kesimini içine alan depresyonun her iki tarafında, Çal dağı zirvesinin doğusunda, Manisa'nın doğusunda ve Nif dağı'nın eteklerinde bulunmaktadır. Gri, esmer renkli bu kristalize kireçtaşları nadiren tabakalı, kompakt yapılı olup, sert keskin kırıklıdır. İçlerinde nadiren dolomit kristalleri ve yer yer mikro kristalli yapılar içinde radyolarit bulunmaktadır. Belirtilen bu yapılar Jura-Kretase yaşlıdır. Bu yapıların hemen çevresinde bunlarla yanal geçişli olan bir seride kumtaşı, grovak, marn ve radyolaritlerin ardalanmasından meydana gelen seri yer almaktadır. Buldukları kesimlerde genellikle plato görünümü sergileyen bu yapılar Çal dağı batısında kırmızı renkli marnlarla sarı renkli kumtaşından meydana gelir. Ayrıca buna benzer yapıdaki kumtaşları Koyundere'nin doğusunda Asarlık köyünde ve Domuzderesi civarında da görülmektedir. Bu kumtaşları orta ve kalın katmanlı olup, katman kalınlığı 10-15 m. arasında değişir. Kumtaşlarının dışında Gölarmara ve çevresinde ofiyolitler, peridotitler ve piroksenitler de yer almaktadır.

### 2.3.3. Neojen ve Plio –Kuaterner Örtü Depoları

Bozdağ kütlesi ve yakın çevresinde Kretase kireçtaşlarının oluşumundan sonra Alt Tersiyer'e ait formasyonlara rastlanılmamaktadır. Ancak neojende meydana gelen dislokasyonlar, Gediz çöküntü havzasının oluşmasına yol açmıştır. Zamanla bu havzaya, değişik iklim şartlarının etkisi altında gölsel ve karasal sedimanter malzemeler, yani Miosen, Pliosen, Alt Pleistosen örtü formasyonları bu çevreyi drene eden akarsular tarafından doldurulmuştur. Mesozoik kireçtaşları, metamorfik şist serilerine ait parçalar içeren konglomera, marn, kumtaşı, gölsel kireçtaşları yaygındır. Karasal kökenli olan bu formasyonlar monoklinal, kıvrımlı ve yer yer kırıklı bir yapı göstermektedir.

Araştırma alanının batı kesiminde Manisa dağı'nın doğu yamaçları önünde, Bozdağlar'ın Gediz grabenine inen kuzey yamaçları boyunca özellikle Turgutlu –Salihli arasında uzanan kesimde kalınlığı yer yer 400-500 m.'yi bulan Pliokuaterner Bozdağ depoları bulunmaktadır. Gölarmara yerleşim alanının kuzeybatı kesiminde, Çal Dağı'nın güney, güneydoğu kesimlerinde çoğunlukla gölsel kireçtaşları bulunmaktadır. Kireçtaşları ile arakatkılı olarak konglomera, kumtaşı, kiltası, kum ve killer gelmektedir. Bu yapılar, Manisa çevresinde, Dibek

dağının kuzey kesminde yer alan Gölarmara doğusunda, Menemen'in kuzeydoğusunda, Çaldağı'nın çevresinde ve Akhisar'ın kuzeydoğusunda görülebilmektedir

Araştırma alanındaki kumtaşı miltaşından oluşan ve Üst Miosen olarak tanımlanan birimin alt kesimlerinde fosiller mevcuttur. Salihli yakınlarında yapılan çalışmalarda Üst Miosen yaşlı flüviyal çökeller; altta konglomera ile başlamakta, yukarıya doğru taneli yapı giderek incelerek kumtaşı ile tamamlanmaktadır. Miosendeki bu depolanma Pliosende de gözlenmiştir. Pliokuaterner'e ait sedimanterler özellikle Orta Gediz grabeninin güney kesiminde, Pliosene'e ait olanlar ise kuzeyde yaygın olup temeli uyumsuz olarak örtmektedir. (Çukur, 1992)

#### **2.3.4. Volkanik Formasyonlar**

Aşağı Gediz havzasında yer alan volkanik formasyonlar havzanın doğusunda özellikle Kula ve çevresinde yer almaktadır. Bu volkanik formasyonlar çoğunlukla bazalt, dasit ve riyolit gibi kayalar ile temsil edilmekle birlikte Pleistosen ve Holosen başlarında meydana gelmiştir. Araştırma alanının dopusunda yer alan Demirköprü Barajı'nın güneyinde Gediz nehri yatağında geniş bir alana bazaltların yayıldığı görülmektedir. Demirköprü yakınındaki bu bazaltlar son döneme aittir. Doğu-batı uzanışlı Gediz grabeninin Salihli'den sonraki doğu kesimi, kuzeybatı – güneydoğu uzanışlı Alaşehir depresyonuna geçilir. Bu depresyonun kuzeyinde Pliosene sonrasında gerçekleşen neotektonik hareketlerle kuzey-güney, kuzeybatı-güneydoğu, kuzeydoğu-güneybatı gibi birbirini kesen faylar meydana gelmiştir (Çukur,1992).

Havzada yer alan bir diğer volkanik birim Foça tepelerinin batı ve orta kısımlarında, Dumanlı Dağ, Yamanlar Dağının yüksek kısımlarında görülmektedir. Yamanlar Dağının zirvesine yakın yerde konumlanan Karagöl'de volkanik bir göl özelliğini taşımaktadır. Bu birim başlıca tüf, aglomera ve andezitten oluşmaktadır. (AK. 1992)

#### **2.3.5. Kuaterner Alüvyonlar**

Aşağı Gediz Havzası'nda Kuaterner, alüvyonlarla temsil edilmekte olup bunlar, ova tabanlarında, tabanlı vadilerde ve yamaçlar üzerinde düz ya da oluşu andıran kesimlerde ve Gediz Deltası'nda bulunur. Ayrıca çevredeki yüksek reliyeflerden akarsularla taşınan



malzemenin ova tabanına yaklaştığı kesimlerde, yamaç önlerinde biriktirmesi sonucu koni ve yelpazeler oluşturmaktadır.

Alüvyonu oluşturan malzemenin boyutlarında fluvial birikme sürecine uygun olarak, Gediz nehri yatağına doğru bir incelmeye görülmektedir. Ancak bu derecelenme ve kademelenme düzgün değildir. Neojen depolarını örten Kuaterner alüvyonları heterojen bir karakter gösterir. Ancak havzanın doğusundan batısına, havza kenarından merkezine doğru gidildikçe örtü kalınlığı artmaktadır. Buna göre havzanın başlangıcında alüvyon örtünün yaklaşık kalınlığı 50 m. iken Gediz Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü Menemen çevresinde yaklaşık 200 m. civarındadır.

Alüvyaller yer yer kil mercekleri, ince silt seviyeleri ile şist, gnays, kalker ve kuvarsit çakılları karışımından meydana gelmiştir. Aşağı Gediz Havzası'nda yer alan ve alüvyaller ile örtülü Salihli, Turgutlu, Akhisar, Manisa, Menemen ovaları tarım potansiyali çok yüksektir. Bu nedenle de alüvyallerle kaplı olan bu bölge ekonomik açıdan büyük bir öneme sahiptir.

Jeoloji Haritası

## 2.4. Hidrolojik Özellikler

Gediz Havzası'nın yağış alanı yaklaşık olarak 17.000 Km<sup>2</sup>. su verimi 2270 x 10<sup>6</sup> m<sup>3</sup> ve yıllık ortalama su kalınlığı 126 mm dir. Havzanın yüzey suları akarsular ve göller olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. (T.C. Çevre Bakanlığı Raporu 1999)

Havzanın ana su kaynağı Gediz Nehri'dir. Gediz Nehri, Gediz ilçe merkezinin 26 km kadar doğusundan Çukurviran köyü civarı ve Murat Dağı'nın yamaçlarında doğar. Kuzeyden Selendi, Kocaçay, Demirci ve Kumçayları'nı, güneyden de Alaşehir ve Nif çaylarını alır. Gedize katılan yan derelerin en önemlileri ise Kurşunlu, Tabak, Sart, Gencer, Yeniköy, Karaçalı, Irlamaz ve Keçilidere'dir. Bütün bu yanderelerin sularını aldıktan sonra Gediz, Salihli ve Menemen ovalarını baştan başa katederek Foça ile Çamaltı Tuzlası arasından Ege Denizi'ne dökülür. DSİ'nin yaptığı etüdlere göre, Gediz Nehri'nin ortalama yatak genişliği 100 m, kapasitesi 300 m<sup>3</sup>/sn ve derinliği ise 2 m olduğu tahmin edilmiştir.

Gediz Havzasında yer alan ve çalışma sahası içine giren iki adet göl bulunmaktadır. Bunlar Göl marmara ve Demirköprü barajıdır. Marmara Gölü 4 x 11 Km çapında ve tektonik depresyon sahasında oluşmuş bir göldür. Gölün en derin yeri 130 m kadar olup 367 x 10<sup>6</sup> m<sup>3</sup>. su depo edebilecek kapasitedir. Demirköprü Barajı, Hidroelektrik santrali olarak yapımına 1954 yılında başlanmış ve 1960 yılında tamamlanmıştır. 77 m yükseliğinde toprak dolgu olarak inşa edilen bu barajdan enerji, zirai sulana ve taşkın kontrolünde yararlanmaktadır. Baraj gölü yılda 1666 x 10<sup>6</sup> m<sup>3</sup>. su üretmektedir. Yıllık ürettiği enerji miktarı ise 193 milyon KWH'dir. (Toprak Su Genel Müd. Raporu, 1974)

Gediz Havzası'nın 5.616 km<sup>2</sup>'lik akaçlama sahasına ait veriler Manisa yakınlarında Gediz Nehri üzerinde bulunan akım ölçüm istasyonunda kayıt edilmiştir. Buna göre Gediz Nehri'nin yıllık ortalama akımı 46.53 m<sup>3</sup>/sn olup Ocak ayında 84.72 m<sup>3</sup>/sn ile maksimum ortalama akım meydana gelmektedir. Aralık ayındaki 75.42 m<sup>3</sup>/sn 'lik ortalama akım Kasım ayınının 31.77 m<sup>3</sup>/sn'lik akımına göre oldukça yüksektir. Havzadaki yağış durumu göz önüne alındığında bu normal bir sonuç olarak görülür. Mart ayında yağışlarda belirgin bir azalma görülürken akımdaki azalma çok daha az olmaktadır. Bu durum Gediz Nehri'nin Mart ayında havzanın kuzey ve güneyinde bulunan yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle oluşan sular ile beslendiğini ortaya koymaktadır. Diğer yandan, havzadaki yağış minimumu Ağustos ayına rastlarken Gediz Nehri'nde en az akım 18.36 m<sup>3</sup>/sn ile Haziran ayında olmaktadır. Gediz Nehri kollarında ise en

az akış yağışa paralel olarak Ağustos ayında gerçekleşmektedir. Ana koldaki akımın Haziran ayında minimum değere inmesi ise Gediz Ovası'nda akarsu boyunca yapılan tarımsal sulamalarla ilgilidir. Gediz ovasında ekimi yapılan tarım ürünlerinin su ihtiyacı yağışların azaldığı Haziran ayında artmakta ve bu durum Gediz Nehri'nden ya da baraj gölünden su alınarak giderilmektedir.

Gediz Nehri'nin Kasım ve Mart ayları arasında hesaplanan sediman deşarjı  $2,5 \text{ kg/m}^3$  'tür. Bu değer kabaca yıllık sediman deşarjının  $190 \text{ kg/m}^3$  olduğunu gösterir. (T.C. Çevre Bakanlığı Raporu, 1999)

Gediz Havzası'nın sahip olduğu yer altı sularını inceleyecek olursak havzanın yer altı suyu bakımından en zengin yöresi, kuarterner kil, kum ve çakıl formasyonuna sahip Turgutlu ve Akhisar ovalarıdır. Turgutlu 'nun güneyinde kalan paleozoik yaşlı metamorfik formasyonlu dağlık saha, Saruhanlı'nın kuzey kısımlarını kapsayan Neojen kalker marn formasyonu ike Sarıgöl'ün güneyinden Kula'nın 1-15 km kadar kuzeyine uzanan permien metamorfik seriler yer altı suyuna sahiptirler. Menemen Ovası ile Kemalpaşa civarı Kuaterner kil, kum ve çakıl, formasyonuna sahip olup orta derecede verimli yer altı sularına sahiptirler. Yalnız Emiralem'in güneyinde kalan dağlık araziler ile Yamanlar Dağı ve Manisa ile Kemalpaşa arasındaki permien, mesozoik ve Neojen kalkerli dağlık kısımlar yer altı suyu bakımından oldukça fakirdirler.

Genel olarak havzanın kenar kısımlarında kaba (çakıl ve kum) malzemeler, ortasına doğru ise ince (kil ve silt) malzemeler yer almaktadır. Bu durum ise yer altı suyunun kenarlardan beslenip topografik meyil boyunca havzanın ortasına doğru hareket etmesini sağlamaktadır. Ayrıca Gediz vadisi boyunca doğudan batıya doğru da akış halindedir.

Havzada çıkan yer altı sularının kaliteleri de değişiklik arz etmektedir. DSİ tarafından Menemen Ovası'ndan alınan su örnekleri analizlerine göre en iyi kaliteli sular Menemen ilçesinin kuzeyindeki ova sınırına yakın olan yerden çıkmaktadır. Güneye doğru gidildikçe suyun kalitesi bozulmaktadır. Salihli civarında ise kalitesi oldukça düşük sular bulunmaktadır. Genellikle kuzeyden güneye doğru su da izlenen klor miktarı da artmakta olup, güneyde deniz suyuna benzer yakın değerler kazanmaktadır. Bu duruma yüzeyden derine gidildikçe rastlanmaktadır. Derinlerdeki sularda yukarıdaki sulara nazaran daha fazla tuz bulunmaktadır. Seyreköy civarında ise durum tam tersine dönmektedir. 25 m den itibaren su kalitesi gittikçe düzelmekte ve normal yer altı suyu özelliğini kazanmaktadır.

Sonuç olarak Gediz Havzası'nda taban suyu ve az derindeki sular genel olarak derindeki sulardan çok daha tuzludur. Bu tuzlu su zaman zaman toprağında tuzlandırılmaktadır. Havzada yer altı sularının kalite bakımından en iyi olduğu ovalar Akhisar, Manisa ve Kemalpaşa'dır.

Aşağı Gediz Havzası, maden suları ve kaplıcalar bakımından zengindir. Bunlardan Alaşehir Sarıkız maden suları ile Sart, Kurşunlu ve Ahmetli jeotermal suları en önemlilerdir.

## 2.5. İklim Özellikleri

Çalışma alanının da içinde olduğu Ege Bölgesi'nin iklim olayları Karadeniz ve Doğu Akdeniz havzalarında gelişen geniş alanlı aksiyon merkezleri ve cephe sistemleri tarafından kontrol edilmektedir. Bununla birlikte, bölgede iklim olaylarını yöneten bu hava akımları, yeryüzünde relief şekillerinin düzeni nedeniyle termik ve dinamik değişmelere uğramaktadır. Ege ovalarında termik bilançonun hemen her ayda pozitif değerler gösterdiği belirlenmiştir (Koçman 1993). Termik bilançonun pozitif olması, Ege ovalarının "solar iklim" bakımından son derece elverişli konumda olduğunu göstermektedir. Sıcaklık koşullarının bu elverişliliği hem insan yaşamını hem de tarımsal faaliyetleri de teşvik etmektedir. Bu bölgede yılın uzun bir dönemi yağışsız ve bol güneşli olup bağıl nemin de düşük olması nedeniyle yaşam ve biyokonfor bakımından rahatlatıcı bir ortam gözlenmektedir.

Ege Bölgesi'nde tarla ve bahçe tarımı temelde iklim koşullarına göre düzenlenmiştir. Yağış, sıcaklık ve rüzgarlar bu konuda en etkileyici ve belirleyici unsurlardır. Bu yüzden de bu bölgede, kışın düşük sıcaklıklara dayanabilen buna karşılık yazın yüksek sıcaklıklara karşı hoşgörülü olan ürünler yetiştirilmekte ve su ihtiyacı da sulama yolu ile karşılanmaktadır.

İklim koşullarının bu elverişliliğine karşın, çalışma alanı olan Gediz Havzası'nın etrafının yüksek dağlar ile kuşatılmış olması (yaklaşık 1000 m) yatay hava akımlarını ve dikey sıcaklık değişmelerini etkilemektedir. Dolayısıyla topografik özellikler sirkülasyon koşullarını etkileyerek havzada don olayı ve yoğunlaşma gibi olaylara neden olmaktadır. Örneğin, relief özelliklerine bağlı olarak zaman zaman oluk biçimindeki depresyonların tabanlarını dolduran soğuk hava o sırada üstünde bulunan hava tabakalarından ağır olduğu için yükselme olanağı bulamamaktadır.

Aşağı Gediz Havzası, kuzeybatıda Yunt Dağı – Dumanlı Dağ kütlesi ile, batıda Manisa Dağı -Yamanlar volkanik kütlesi ve güneyde Bozdağlar ile çevrilidir. Aşağı Gediz havzasında yer alan ovalar (Salihli, Turgutlu ve Manisa ovaları), Dumanlı ve Yamanlar Dağı eteklerine kadar devam eder. Aşağı Gediz yöresinin kuzeyinde bulunan Akhisar ovası, Kumçayı boğazı aracılığı ile Manisa Dağı (1573 m) karşısında Manisa Ovası'na açılır. Gediz Nehri, Dumanlı ve Yamanlar dağı arasında dar bir yarma vadi oluşumundaki Menemen boğazını geçtikten sonra Ege denizi kıyısında oluşturduğu geniş delta ovası üzerinde akarak denize ulaşır.

Ege Ovaları, akarsuların çevredeki yüksek relieftan getirdikleri malzeme ile oluşmuşlardır. Aşağı Gediz Havzası'nda yer alan ovalarda benzer şekilde ortaya çıkmışlardır. Söz konusu alanlar, çöküntü çukurlarına alüvyonların dolmasından sonra şimdiki ova görünümü meydana gelmiştir. Bu ovalarda primer bitki örtüsü Akdeniz vejetasyonu olmakla birlikte bölgenin yerleşme tarihi eski olduğu için erken çağlarda ortadan kaldırılmış, yerine tarla ve bahçe kültürü gelişmiştir. Bugün Aşağı Gediz Havzası'nda çeşitli kültür ağaçları, özellikle zeytin, üzüm, narenciye en yoğun şekilde üretilirken, tarla kültürü içinde endüstri bitkileri (özellikle pamuk ve tütün), çeşitli sebzeler ve tahıl tarımı yapılmaktadır (Manisa Tarım İl Müdürlüğü Raporu 2004).

### 2.5.1. Ortalama Sıcaklıklar:

Aşağı Gediz Havzasında yer alan istasyonlardan alınan ve 25 yılı aşan verilere göre ortalama sıcaklıklar Manisa'da 16,9°C, İzmir'de ise 17,6 °C dir. (Tablo 1) Bu ortalama sıcaklıklar ülke geneli ile karşılaştırıldığında alanda görülen denizsel etkilerin havza boyunda iç kısımlara doğru ilerlediğini göstermektedir. Havzanın çevresinde yer alan plato ve dağların yamaçları üzerinde yüksekliğe bağlı olarak sıcaklık değerlerinin düşeceği ve bu kesimlerle ova tabanları arasında 4-5 °C lik sıcaklık farkının olacağı kestirebilir.

Aşağı Gediz Havzası'nda sıcaklık derecesinin yeterli olması sıcaklık ihtiyacı fazla olan bazı kültür bitkilerinin (pamuk, tütün, narenciye, zeytin vb.) yetişmesine imkan vermektedir. Bütün istasyonlarda sıcaklık Nisan ayından itibaren hızla yükselerek Mayıs'ta 18-20°C yi aşmakta, en yüksek değerlere Temmuz'da ulaşmaktadır. Temmuz ortalama değerlerine göre çok az bir farkla Ağustos ayından itibaren tedrici olarak azalmaya başlayan sıcaklık yaklaşık olarak Ekim sonuna kadar yıllık ortalamaların üstünde kalmaktadır. Kasım'dan itibaren yıllık ortalamaların altında seyreden değerler Nisan'a kadar hiçbir ayda kuvvetli düşüş göstermemektedir. Sıcaklığın yıl içindeki değişimlerinde aldığı değerler dikkate alınır. Buna

göre Aşağı Gediz Havzası'nda yazları sıcak, kışları soğuk geçmeyen bir termik rejim tipinin etkili olduğu sonucu çıkar. Bu yılın 4-5 ayında ortalama sıcaklığın 20°C nin üstünde kaldığı "Akdeniz termik enerji tipi " dir.

**Tablo 1:** İstasyonların Yıllık Ortalama, En Yüksek ve En Düşük Sıcaklıkları

İstasyon	Meteorolojik unsur	Aylar												Yıllık
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI	
Salihli	Ort. Sıcaklık	6,4	7,5	10,4	15,3	20,4	24,6	26,7	26,0	22,2	16,1	11,2	7,9	16,2
	En Yüksek sıcaklık	10	12,7	16,2	21,6	27,1	31,8	34,1	33,6	30,2	23,6	17,6	12,7	22,7
	En Düşük Sıcaklık	2,4	3,1	4,9	8,8	12,6	15,8	17,4	17,2	13,7	9,6	6,0	3,9	9,6
Turgutlu	Ort. Sıcaklık	7,1	8,5	10,5	16,2	20,0	20,5	27,4	27,0	23,1	16,6	11,0	5,1	16,4
	En Yüksek sıcaklık	11,5	12,8	16,7	23,0	27,0	32,0	34,9	34,7	38,8	23,2	17,1	11,6	21,9
	En Düşük Sıcaklık	2,7	2,9	5,3	10,4	14,0	18,4	20,9	20,6	16,7	11,5	8,4	3,6	11,2
Akhisar	Ort. Sıcaklık	6,0	7,4	9,5	14,3	19,1	24,2	26,6	26,2	22,1	16,6	11,6	7,8	16,0
	En Yüksek sıcaklık	22,3	24,7	30,3	33,6	39,2	42,8	44,3	44,6	40,7	37,5	30,7	26,2	44,6
	En Düşük Sıcaklık	-13,6	-9,2	-7,4	-3,0	3,0	6,0	9,2	8,4	4,8	-3,0	-10,7	-10,8	-13,6
Manisa	Ort. Sıcaklık	6,6	8,0	10,2	14,7	19,7	24,4	27,0	27,2	22,9	17,6	12,4	8,3	16,6
	En Yüksek sıcaklık	23,3	24,8	33,5	34,6	39,5	41,8	44,0	44,5	40,1	36,0	29,7	26,4	44,5
	En Düşük Sıcaklık	-17,5	-10,9	-6,7	-2,7	2,0	7,4	10,5	11,2	3,3	-0,9	-7,3	-9,9	-17,5
İzmir	Ort. Sıcaklık	8,5	9,5	11,2	15,4	20,5	25,0	27,5	27,2	23,2	18,4	14,2	10,2	17,6
	En Yüksek sıcaklık	21,4	23,9	30,2	32,5	37,6	40,3	41,9	42,7	38,7	33,4	30,3	24,7	42,7
	En Düşük Sıcaklık	-8,2	-5,2	-3,8	0,7	4,3	9,5	15,4	15,0	10,0	3,6	-2,9	-4,7	-8,2
Menemen	Ort. Sıcaklık	7,4	8,9	10,9	14,6	19,8	24,6	26,7	25,8	22,1	17,4	13,7	10,4	16,9
	En Yüksek sıcaklık	11,2	13,5	16,0	20,8	26,4	31,0	33,0	32,8	29,5	24,2	19,2	14,0	22,6
	En Düşük Sıcaklık	4,2	5,2	6,4	8,6	12,4	16,5	18,9	18,4	15,3	12,0	9,5	7,1	11,2

### 2.5.2 Don Olaylı Günler :

Don olayı ve süresi ile donlu günlerin erken veya geç başlaması ve son bulması çeşitli tarım etkinlikleri bakımından son derece önemlidir. Aşağı Gediz Havzasında, don olayının oluşmasında, genel olarak iki etken rol oynamaktadır. Bunlardan biri, bölge üzerindeki soğuk hava kütlelerinin etkin olduğu durumlarda sıcaklığın hızla düşmesi, diğeri de havanın açık ve bağıl nemin düşük olduğu durumlarda toprak yüzeyinde ışıma yolu ile ısının kaybolmasıdır. Don olayının başlama ve son bulma zamanları daha çok soğuk hava kütlelerinin etkinlik sürelerine bağlı olarak yıldan yıla çok değişmektedir. Aşağı Gediz Havzasının da içinde bulunduğu Ege ovalarında don olayına neden olan soğuk hava kütlelerinin etkinliği ortalama olarak Kasım ayının ikinci yarısından itibaren başlamakta ve yine ortalama olarak Mart ayının ilk yarısında son bulmaktadır. (Koçman, 1993) Yapılan istatistiki çalışmalara göre İzmir'de don olayının 6,3 gün olan ortalama süresi Manisa'da 27,1 gün, Akhisar'da 36 gündür. Bu bilgiler doğrultusunda da deniz kıyısından içeriye doğru gidildikçe don görülen günlerin sayısının arttığı ortaya çıkmaktadır.

Don olayı vejetasyon için oldukça önemli bir parametredir. Özellikle don olayının mevsimi bitkiler için büyük önem arz eder. Özellikle erken çiçek açan badem ağaçları için, havzada yaygın olarak yetiştirilen asmalar için zamanından önce veya sonra görülen donlar büyük zarar vermektedir. Bu tip durumlarda don etkisi altında kalan çiçekler donarak düşmekte ve bu da meyve veriminin azalmasına neden olmaktadır. Sonbaharın başlarında görülen donlar da özellikle zeytin ağaçları üzerinde zararlı olmaktadır.

### 2.5.3 Toprak Altı Sıcaklıkları :

Toprak örtüsünün sıcaklığı ve bunun yıl içindeki değişimleri toprakta cereyan eden bütün olayların, özellikle ekolojik olayların üzerinde önemli etkilere sahiptir. Toprağın sıcaklık rejimi, hava sıcaklıklarının yıl içindeki değişimleri ile birlikte, toprağa ait bazı özellikler (toprağın yapısı, toprak nemi ve mineral kompozisyon gibi) tarafından etkilenmektedir. Toprak sıcaklığı güneşten alınan ve absorbe edilen bir enerji olarak tüm ekolojik olaylar üzerinde etkilidir. Toprak sıcaklığı, bitki tohumlarının çimlenmesi, bitkilerin büyüme ve gelişme dönemleri hava sıcaklığından çok toprak altı sıcaklığı tarafından kontrol edilmektedir. (Koçman, 1993) Toprak sıcaklıklarını etkileyen iki önemli faktör, hava sıcaklığı ile güneşten alınan radyasyon miktarıdır. Toprakta sıcaklık rejimi bakımından en önemli nokta toprak yüzeyinde (yaklaşık 20-30 cm kadar) sıcaklıkların çabuk değişmesi, derinlerde ise bu değişimin çok yavaş olmasıdır. Derinlik arttıkça hava sıcaklığında aylara göre değişimler fazla olmasına rağmen toprakta bu değişim fazla hissedilmemektedir. Ortalama yüksek toprak altı sıcaklıkları yüzey tabakalarında, genel olarak Haziran ayı ortalarından başlayarak ağustos ayının sonuna kadar sürmektedir. Toprak ısısında görülen en düşük sıcaklıklara Ocak – Şubat ayında rastlanmaktadır. Genel bir değerlendirme ile, Ege bölgesinde Ekim – Mart ayları arasında toprak altı sıcaklıklarında yüzeyden derine doğru bir artış gözlenirken, Nisan – Eylül arasında ise azalma görülmektedir.

Toprak altı sıcaklıkların biyolojik olarak önemine gelince; bu değerler özellikle tohumların çimlenmesi ve toprak altında yer alan organların gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Bunun dışında toprak altı ısı toprak altında yaşayan faunayı da önemli derecede etkilemektedir. Bu anlamda optimum değerlerde toprak altı faunası da (örnek; solucanlar, nematodlar, çeşitli böcekler ve mikroorganizmalar) iyi bir gelişim göstererek yoğun faaliyetlerde bulunacaklardır. Böylece toprak altında gelişen bu olaylar çerçevesinde toprağın havalanması sağlanarak bitki gelişime daha uygun bir özellik kazanacaktır. Toprak altı sıcaklıklarının düşük olması koşulunda toprakta bulunan bu organizmalar yeterince aktif olmayacağı için toprakta meydana gelecek



fiziksel deęişmelerde az olacak ve bunun sonucunda da toprak yüzünde bitki gelişimi de yavaşlayacaktır.

Toprak sıcaklığını etkileyen bir önemli faktörde alanda görülen rüzgarlardır. Çalışma alanımız havza olduğu için büyük bir kısmı çok genişlemiş tabanlı vadi şeklindedir. Özellikle Manisa Dağı ve Yunt Dağı arasında yer alan Manisa ilini ve daha sonra Yamanlar ile Dumanlı Dağ arası bir boğaz şeklini kazanmıştır. Bu jeomorfolojik özelliklerden dolayı bu bölgelerde hava akımı daha şiddetli bir şekilde yer değiştirmekte ve bu da toprak yüzeyinin ısınısını önemli derecede etkilemektedir. Keza Gediz Deltası'nda ve özellikle denize yakın kısımlarda denizden gelen rüzgarlar nedeniyle toprak yüzey ısısı sıklıkla değişebilmektedir. Düz alanlarda özellikle steplerde görülen toprak yüzey ısısının hızla değişmesi bu tip bölgelerde bitki gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz şartlar özellikle tek yıllık bitkilerin gelişmesinde etkili olmaktadır. Tek yıllık bitkiler belli ve kısa bir dönemde çimlenmek zorunda oldukları için bu süre içinde meydana gelebilecek ısı değişimleri çimlenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle bu tip ortamlarda vejetasyon belli başlı karakteristik türlerden oluşmaktadır. Gediz deltasında görülen vejetasyon şeklinin yukarıda anlatılanlara benzer şekilde olması sadece toprak sıcaklığına bağlanamaz. Burada rüzgarlar ve taban suyu ile ortaya çıkan tuzlanmanın da etkisi büyüktür.

#### **2.5.4 Nemlilik :**

Araştırma alanında bağıl nemliliğin yıllık deęişmelerinde kış aylarında yüksek, yaz aylarında ise düşük oranlarda olduğu görülüyor (Tablo 2). Bölgede sıcaklığın yüksek, zeminin kuru ve bulutluluğun son derece az olduğu yaz aylarında nisbi nem oranı düşmektedir. Buna karşılık, sıcaklığın daha düşük olduğu kış aylarında nemli hava akımlarının etkin olması nem derecesini yükseltmektedir. Ayrıca kış aylarında özellikle Muradiye ve Manisa merkezde Gediz Nehri'nin geçtiği bölgelerde yoğunlaşmadan dolayı nem oldukça artmaktadır. Su buharı basıncına gelince, havadaki nem miktarını belirleyen bu unsurun yıl içindeki deęişmeleri sıcaklık koşullarına ve özellikle buharlaşma imkanına bağlıdır. Buna göre yapılan rasatlardan elde edilen bilgiler ışığında su buharı basıncı Ocak ayında en düşük düzeydeyken Temmuz ve Ağustos ayında en yüksek deęerlere ulaşır.

**Tablo 2:** Nisbi nem miktarları

İstasyon	Meteorolojik unsur	Aylar												Yıllık
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI	
Salihli	Nisbi nem	72	68	49	59	57	48	45	48	52	62	70	73	59
Turgutlu	Nisbi nem	71	66	45	57	56	47	46	47	50	61	69	76	58
Akhisar	Nisbi nem	70	65	46	58	55	46	47	48	51	59	68	75	57
Manisa	Nisbi nem	75	71	66	61	57	48	44	45	51	62	73	76	61
Izmir	Nisbi nem	74	71	69	65	62	55	54	54	59	67	73	74	65
Menemen	Nisbi nem	54	63	62	58	54	49	47	50	54	60	65	66	57

### 2.5.5.Yıllık Ortalama Yağış ve Yağış Rejimi :

Araştırma alanında yer alan meteoroloji istasyonlarının verilerine göre ortalama yıllık yağış tutarları 468.8,4 mm (Turgutlu) ile 763,1 mm (Manisa) arasında değişmektedir (Tablo 3). Bölgede yıllık yağışların rasat dönemi içinde (1941-2000) belirlenen değerlere göre yıldan yıla önemli farklar göstermektedir. Ayrıca, bölge içinde relief ve bakı koşulları bakımından değişik konumlar gösteren yerler arasında yıllık yağış miktarı bakımından önemli farklar mevcuttur.

**Tablo 3:** Yıllık ortalama yağışlar


İstasyon	Meteorolojik unsur (mm)	Aylar												Yıllık	Yağış Rejimi
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Salihli	Ort. Yağış	79,5	67,9	59,2	39,2	33,5	17,3	5,8	4,4	10,6	34,9	55,8	82,5	490,6	KİSY
Turgutlu	Ort. Yağış	83,2	71,9	68,2	66,5	45,4	13,0	10,3	12,0	16,4	37,3	72,4	95,1	468,8	KİSY
Akhisar	Ort. Yağış	119,7	109,9	85,1	62,9	48,7	34,2	14,3	4,2	5,0	11,2	38,7	76,1	610,0	KİSY
Manisa	Ort. Yağış	148,2	129,4	112,7	77,9	55,9	42,5	18,5	9,3	7,2	20,0	49,8	91,7	763,1	KİSY
Izmir	Ort. Yağış	139,7	99,9	72,6	43,2	30,6	9,3	1,8	2,4	9,6	37,4	89,3	155,1	691,1	KİSY
Menemen	Ort. Yağış	96,5	80,4	85,8	42,4	29,0	8,5	1,8	3,0	13,7	37,2	65,9	112,2	555,4	KİSY

Araştırma alanı üzerinde yıl içinde egemen olan sirkülasyon sistemine bağlı olarak yaz mevsiminin kurak, kış mevsiminin de yağışlı geçtiği aylık yağış tutarlarından veya mevsimlere düşen yağış oranlarından kolayca anlaşılır (Şekil 1). Bütün havzada, en yağışlı ve en kurak geçen aylar hemen hemen aynıdır. Bunun böyle olması da bölgede aynı yağış rejim tipinin egemen olduğunu ortaya koyar. Buna göre yağış Ekim ayından itibaren düşmeye başlar ve artarak en yüksek değerlere Aralık ayında ulaşır. Buna karşılık ilkbahar ortalarından itibaren başlayan azalma Temmuz ve Ağustos'da en düşük değerleri bulur (Tablo 3).

#### 2.5.5.1 Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı :

Çalışma alanı, yıllık yağış miktarlarının dağılışı bakımından orta derecede yağışlı alanlar arasında kabul edilebilir. Erinç'e göre 400-700 mm arasında yağış alan yerler orta derecede yağışlı sayılır (Erinç 1957). Bölgede batı-doğu doğrultusunda uzanan dağ sıraları ile bunların

arasında kalan havzaya düşen yıllık yağış miktar bakımından önemli farklılık gösterir. Çalışma alanında yıllık yağış miktarı kıyı kuşağındaki delta düzlüklerinden iç kısımlarda kalan çukur ovalara doğru azalma göstermektedir.



**Şekil 1** : İstasyonlarda Yıllık Yağış Tutarlarının Mevsimlik Dağılımı

### 2.5.6 Biyoiklimsel Sentez

Emberger'in (1952) yaz kuraklık indisine (S) göre PE/M değerleri (PE: yaz ayları yağış toplamı, M :en sıcak ayın ortalama sıcaklığı) çalışma alanı içinde yer alan 6 istasyonda da 5'ten küçüktür. En az yağış alan aylar yaz aylarıdır ve yaz ayları yağış toplamı 200 mm'den küçüktür. Kısacası tüm istasyonlar Akdeniz iklim tipine sahiptir. Emberger'in (1952) yağış-sıcaklık indisi  $Q_2 = 2000 P/M^2 - m^2$  formülüne göre (P: yıllık yağış toplamı, M: mutlak sıcaklık cinsinden en sıcak ayın en yüksek sıcaklık ortalaması, m: mutlak sıcaklık cinsinden en soğuk ayın en düşük sıcaklık ortalaması)  $Q_2$  Salihli için, 56,3, Turgutlu için, 63,2, Akhisar için 65,1, Manisa için 81,4, İzmir için 72,1 ve Menemen için 68,6 dır. Buna göre, Salihli, Turgutlu ve Akhisar "Kışı Serin Yazı Kurak Akdeniz Katı", Manisa, İzmir ve Menemen ise, "Kışı ılık Yarı Nemli Akdeniz Katı" sınıflandırmasına girmektedir (Tablo 4).


Ayrıca Gaussen (1954)'e göre çizilen ombro-termik iklim diyagramlarında yaz kuraklığı periyodu Akhisar ve Manisa istasyonlarında; Mayıs - Ekim ayları arasında, İzmir istasyonunda Nisan - Ekim ayları arasında, Menemen ve Salihli istasyonlarında, Nisan - Eylül arasında ve son olarak Turgutlu istasyonunda Mayıs- Eylül arasında gözlenmektedir (Şekil 2).

Aşırı yağışlar araştırma alanımız içerisinde yer alan İzmir, Menemen, Salihli ve Turgutlu istasyonlarında; Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında görülürken, Manisa ve Akhisar istasyonlarında Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında görülmektedir.

Ortalama sıcaklığın 0 °C nin altına düştüğü ve don olaylarının görüldüğü aylar ise genelde tüm istasyonlarda Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat'tır. Ayrıca nadiren de olsa bazı yıllarda Mart ve Nisan ayında da don olayı gözlenmektedir.

**Tablo 4 :** Biyoiklim katları

İstasyon	Yükseklik	P	PE	M	m	S	$Q_2$	Yağış Rejimi	Biyoiklim katı
Salihli	110	490,6	27,5	34,1	2,4	1,0	56,3	KISY	Kışı Serin Yarı Kurak Akdeniz
Turgutlu	78	468,8	35,3	35,1	2,8	0,8	63,2	KISY	Kışı Serin Yarı Kurak Akdeniz
Akhisar	93	610	52,7	44,6	6	0,7	65,1	KISY	Kışı Serin Yarı Kurak Akdeniz
Manisa	71	763,1	26,9	44,5	6,6	0,8	81,4	KISY	Kışı ılık Yarı Nemli Akdeniz
İzmir	25	691,1	13,5	42,7	8,5	0,6	72,1	KISY	Kışı ılık Yarı Nemli Akdeniz
Menemen	20	555,4	13,3	33	7,4	0,3	68,6	KISY	Kışı ılık Yarı Nemli Akdeniz



**Şekil 2** : İstasyonlara ait iklim diyagramları

## 2.6 Toprak

Gediz Havzası genelinde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklim hüküm sürmektedir. Ortalama yağış ise, 450mm-1060 mm arasında değişmektedir. Ancak yağışın özellikle fazla meyle sahip yukarı havzada artış göstermesi, erozyonu hızlandırarak litozolik karakterli sığı toprakları oluşturmaya yol açmıştır. Bunun sonucu olarak da doğal bitki örtüsü iyi bir gelişme gösterememiştir. Toprakların oluşumunda diğer önemli bir etken ise doğal ana maddedir. Çeşitli fiziksel ve kimyasal etkiler ile oluşan topraklar büyük ölçüde ana kayaya bağlı bir gelişme göstermektedir. Gediz havzası topraklarının oluşumundaki diğer etkenler doğal bitki örtüsü ve topoğrafyadır. Doğal bitki örtüsü olarak orman ve funda vejetasyonu esas olarak yukarı havzada yer alır. Gediz havzası genelinde orman vejetasyonunun pek çok olduğu yerlerde Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları, makinin yer aldığı yerlerde ise kalkersiz kahverengi ve regosol topraklar, her iki örtünün de bulunduğu yerlerde ise Kırmızı Akdeniz, kahverengi orman ve redzina topraklarının olduğu görülür. Bu yerler aynı zamanda fazla meyil ve engebeli topoğrafyaya sahip olup fazla yağış da aldığından yüzey akış çoğalmakta ve bunun sonucu olarak topraklar aşınarak sığlaşmaktadır.

Aşağı Gediz havzasında yapılan toprak etüdüleri sonucunda bölgede 10 adet büyük toprak grubu tespit edilmiştir. (Harita 5)

N Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları

U Kireçsiz Kahverengi Topraklar

R Redzina Topraklar

M Kahverengi Orman Toprakları

T Kırmızı Akdeniz Toprakları

C Kestane Renkli Topraklar

Ç Tuzlu Alkali Topraklar

L Regosoller

A Alüvyal Topraklar

K Kolüvyal Topraklar

### 2.6.1 Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları (N)

Bu tip topraklar havzanın özellikle yüksek kısımlarında ve ortalama yağışın fazla olduğu yerlerde görülmektedir. Çalışma alanında kireçsiz kahverengi orman toprakları, Kemalpaşa-Turgutlu ve Demirci bölgelerinde kahverengi orman, redzina ve kireçsiz kahverengi topraklar ile birlikte görülürler. Ayrıca bu toprak grubuna Foça tepeliklerinin kuzey batısında, Dumanlı Dağda ve Yamanlar Dağı'nın yükseltisinin arttığı yerlerde rastlanmaktadır. Bu topraklarda yayılış gösteren doğal bitki örtüsü, meşe türleri karaçam ve kızılçamdır. Bu toprağı oluşturan ana madde üçüncü zamanın volkaniklerinden andezit, bazalt, serpantin, peridotit ve dasittir. Ayrıca metamorfik kayalardan gnays, mikaşist, amfibolit ile paleozoik metamorfikler üzerinde rastlanır. Kireçsiz kahverengi orman toprakları genellikle meyil fazlalığı ve toprak sığılığı nedeniyle tarıma elverişli olmadıklarından orman ve maki örtüsü altındadır. Bu grup toprakların bir kısmında kuru tarım ile bağ-bahçe tarımı yapılmaktadır. Bu yerler toprak şartlarının sürüme elverişli olduğu orman sahalarından açılmışlardır.

Kireçsiz kahverengi orman toprakları, ABC horizonlu zonal topraklardır. Profilde serbest  $\text{CaCO}_3$  'a hiç rastlanmaz veya pek az görülür. Bu nedenle kireçsiz topraklardır. Kireçsizlik genellikle yıkanmaktan veya ana maddeden ileri gelmektedir. Ormanın çok kapalı yerler hariç organik horizon pek görülmez. Bu toprakların önemli sorunları meyil, derinlik, taşlılık ve erozyondur.

### 2.6.2 Kireçsiz Kahverengi Topraklar (U)

Kireçsiz kahverengi topraklar çoğunlukla havzanın batı, güney doğu ve orta kısımlarında bulunurlar. Bu grup topraklar genellikle kireçsiz kahverengi orman, kahverengi orman ve redzina toprakları ile birlikte bulunurlar. Bu topraklar çoğunlukla orta derece yağışlı sıcaklığı yüksek bölgelerde bulunur. Bu grubun doğal bitki örtüsü ise, tek yıllık otsu türler, ot – çalı karışımı açık makilikler ile bozuk meşeliklerdir.

Genellikle dalgalı, tepelik ve arızalı topoğrafyalarda yer alan kireçsiz kahverengi toprakların bir kısmında kuru tarım yapılırken bir kısmında bağ-bahçe ve zeytinlik olarak kullanılmaktadır.

Kireçsiz kahverengi topraklar ABC horizonlarına sahip zonal topraklardır. Profil serbest  $\text{CaCO}_3$  ihtiva etmez. Bu toprakların A horizonu 20-30 cm olup rengi nemli iken kahverengi- koyu kahverengi olup kuru iken açık gridir. Bünye killi tın olup yapı orta derecede oluşmuş kaba bloktur. Toprak kuru iken hafif sert, yaşlı iken hafif yağışkan-plastiktir. Bu horizonta kök dağılımı çoktur. Az da olsa çakıllara rastlanır.

B horizonu 30-35 cm kalınlığında, nemli iken kahverengi kuru iken soluk kahverengidir. Bünye killi tın, yapı kuvvetli oluşmuş kaba blok olarak görülür. Kıvam kuru iken sert, yaş iken çok yapışkan ve çok plastiktir. A horizonunda görülen çakıllar bu bölgede daha iridir. Kök dağılımı azdır. C horizonu püskürük kayalardan andezitin ayrışmasından oluşmuştur. Renk ana maddeye bağlı olarak nemli ve kuru iken beyazdır. Bünye kil veya killi tın olup agregasyon mevcut olmadığından masiftir. Toprak kuru iken sert nemli iken dağılır.

### **2.6.3. Redzina Topraklar (R)**

Redzina toprakların oluşumunda esas faktör kireçli ana kayadır. Bu topraklar alanımızda Neojen yaşlı kalkerlerle marnlar üzerinde oluşmuştur. Bu yüzden  $\text{CaCO}_3$  oranı yüksektir. Redzinalar ana kaya etkisi ile açık renklidirler. Marnlar genellikle yumuşaktır. Topoğrafya dalgalı ve tepelik bir görünüm içerisindedir. Redzina topraklarının yarısından fazlası orman- maki örtüsü altında olup açık olan kısımları kuru tarım arazisi olarak kullanılırken az bir kısmı da bağ- bahçe ve zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Bu toprakların doğal örtüsü ise, palamut meşesi, meşe, karaçam ve kızılçamdır. Bu topraklar AC horizonlu interzonal topraklardır. A horizonu 13-15 cm kalınlığında, nemli iken koyu gri, kuru iken grimsi kahverengidir. Bünye killi tın olup yapı kuvvetli oluşmuş, orta büyüklükte bloktur. Kök dağılımı çok olup kireçlilik kuvvetlidir.

C horizonu içerisinde yer yer sertleşmelerin bulunduğu yumuşak marndan oluşmaktadır. Renk nemli iken açık kahverengimsi gri, kuru iken açık gri ve beyaz olarak görülür. Bünye kil olup yapısızdır. Toprak kuru iken sert, nemli iken dağılır. Redzina topraklarının kullanımını orta derecedeki eğim (%6-12) orta derinlik (50-90 cm) taşlılık ve erozyon sınırlandırmaktadır.

### **2.6.4 Kahverengi Orman Toprakları (M)**



Bu toprak grubu sert kalker, kumtaşı, fliş, konglomera gibi ana kayalar üzerinde oluşmaktadır. Genellikle redzinalar ile birlikte bulunan bu toprakların doğal bitki örtüsü, karaçam, kızılçam, bozuk baltalık meşeler, üvez ve ardıç olarak görünmektedir. Daha çok dalgalı, tepelik ve dağlık topoğrafyanın hakim olduğu yerlerde görülen kahverengi orman toprakları, üzerinde bulunan bitki örtüsü kaldırılarak kuru tarım yapılmaktadır. Kahverengi orman toprakları, ABC horizonlu topraklar olup yüksek derecede kirece sahip ana madde üzerinde oluşmuşlardır. Bu toprakların A horizonunun üzerinde yaklaşık 2 cm kalınlığında organik bir kat bulunmaktadır. Rengi nemli iken koyu kahverengi, kuru iken grimsi kahverengi olan organik kat kısmen veya tamamen ayrılmış bitki artıklarından ibarettir. A horizonu 14-16 cm kalınlığında nemli iken koyu kahverengi, kuru iken kahverengidir. Bünyesi kil, yapısı kuvvetli oluşmuş orta büyüklükte bloktur. Kök dağılımı çok,  $\text{CaCO}_3$  azdır. B horizonunun kalınlığı 8-10 cm rengi nemli iken kahverengi, kuru iken sarımsı-kahverengidir. Bünyesi kil, yapısı kuvvetli oluşmuş orta büyüklükte bloktur. Kök dağılımı çok, kireçlilik ortadır. C horizonu 125-130 cm kalınlığında, nemli iken sarımsı kahverengi, kuru iken çok soluk kahverengindedir. Bünye killi tın veya kil olup yapı yukarılarda zayıf oluşmuş orta büyüklükte blok, derinlerde masif olarak görülür. Bu horizonun alt kısımlarında toprağı oluşturan kireçli kil taşı ana maddesi görülmektedir.

#### **2.6.5 Kırmızı Akdeniz Toprakları (T)**

Terra Rosa adı da verilen bu toprak grubu, Marmara Gölü'nün kuzey ve batısında, Akhisar'ın doğu ve kuzey batısında, Manisa'nın güneyinde yaygın olarak yer alır ve genellikle kahverengi orman toprakları ile bir arada bulunurlar. Kırmızı Akdeniz topraklarının buldukları yerlerde yıllık ortalama yağış 600-1000 mm arasında olup doğal bitki örtüsü, bodur meşeler ve çalılıklardır. Kırmızı Akdeniz toprakları ikinci zamana ait kristalin kalker kayası üzerinde oluşmuşlardır. Topoğrafyanın dik olduğu, dağlık ve arızalı alanlarda görülür. Bu özelliklerinden dolayı tarıma pek uygun değildir. ABC horizonları bulunan kırmızı Akdeniz toprakları çok eğimli yerlerde bulunmaları ve ana kayanın sert oluşu nedeniyle genellikle sığ ve çok taşlı bir karaktere sahiptirler. Bu topraklarda yıkanma fazla olduğu için kireç oranı düşüktür. Bu toprakların A horizonu, 25-30 cm kalınlığında ve nemli iken koyu kırmızımsı kahverengi, kuru iken kırmızımsı kahverengindedir. Bünyesi killi tın, yapısı orta derecede oluşmuş kaba bloktur. Kök dağılım çok olup, serbest  $\text{CaCO}_3$  oranı ortadır. A horizonu içinde köşeli çakıl ve iri taşlar bulunmaktadır. Bu toprakların sorunları, sığlık, taşlılık, eğimin fazla olması ve erozyondur.

#### **2.6.6 Kestane Rengi Topraklar (C)**

Bu topraklar havzada yer alan en küçük toprak gruplarından birisidir. Kestane rengi topraklar, Manisa'nın kuzeyinde, Akhisar'ın güney batısında yer alır. Çoğunlukla kahverengi orman ve redzinalar ile birlikte bulunurlar. Marn tabakasının üzerinde oluşan bu topraklar, dalgalı ve tepelik alanlarda ve orta eğimli arazilerde bulunur. Bu toprakların doğal bitki örtüsü, tek yıllık otsu türler, çalılar ve makiliklerdir. Kestane rengi topraklar, A,B,C horizonlu zonal topraklardır. Bu topraklara has olan kireç birikmesi genellikle ince iplikcikler halinde olup B horizonunun alt kısımlarında bulunur. Kireç birikmeleri sertleşerek konkresyonlar da meydana getirebilmektedir. Bu toprakların A horizonu 30-35 cm kalınlığında, nemli iken koyu sarımsı kahverengi, kuru iken kahverengindedir. Bünyesi killi tın olup, yapı orta derecede oluşmuş orta büyüklükte granüler veya bloktur. Bu topraklarda A horizonu ile B horizonu arasında 2,5 cm ye varan bir geçiş zonu vardır. B horizonu, 50-6 cm kalınlığında, nemli iken kahverengi, koyu kahverengi, kuru iken pembemsi gri olarak görülmektedir. Bünye kil olup yapı kuvvetli veya orta derecede oluşmuş kaba bloktur. Kök dağılımı az, kireçlilik orta veya yüksektir. B horizonunu izleyen C horizonunu rengi nemli iken kahverengi, kuru iken pembemsi gridir. Bünyesi killi tın olup yapı görülmez. Bu horizonta kuvvetli kireçlilik mevcuttur. Kireç birikmelerine ince iplikcikler halinde çok fazla olarak rastlanmaktadır. Kestane rengi toprakların önemli sorunları, eğim, derinlik, erozyon ve taşlılıktır.

### **2.6.7 Tuzlu, Tuzlu – Alkali Topraklar (Ç)**

Bu topraklara çorak topraklar adı da verilmektedir. İntrozonal toprakların halomorfik alt sınıfında yer alırlar. Tuzlu ve tuzlu-alkali topraklar Gediz Havzasının yaklaşık % 1 ini kaplamaktadır. Bu topraklar özellikle havzanın denize yakın kısmında görülmekle birlikte Maltepe sırtının güneyinden itibaren Karşıyaka'ya doğru bir yayılım gösterir. Bunun dışında tuzlu topraklar, Marmara gölünün güney batı yörelerinde ve Salihli-Alaşehir arasında yer almaktadır. Bu topraklar dışarıya akıntısı olmayan içbükey topoğrafya ile düz ve düze yakın eğime sahip yerlerde oluşmuşlardır. Bu bölgede taban suyunun yüzeye yakın bulunması, taşkınlar ve buharlaşmanın fazla olması bu topraklarda tuz birikmesine neden olmuştur. Tuzluluk, yüzeyde tuz birikmesi şeklinde olup profil boyunca da devam eder. Bu topraklarda Cl ve SO<sub>4</sub> tuzları bulunur. Bozuk drenaj nedeniyle alt katlarda renk lekeleri görülür. Toprakta Na %15'ten az, Ca, Mg iyonlarının değeri Na 'dan azdır. Toprak pH'sı 8,5 civarındadır. Bu toprakların yüzeyi tuzun su tutucu nedeni ile hafif nemlidir. Çoğunlukla bünye orta veya ince, toprak kuru iken sert, nemli iken dağılır. Tuz miktarının fazlalığı nedeni ile üst katmanlarda geçirgenlik iyidir. Bu sebeple yıkanma kolay olur. Yıkanan tuzlu topraklarda eğer Ca fazla ise normal verimli topraklar elde edilir. Ca az olduğu takdirde alkali topraklar meydana gelir.

Bu topraklarda görülen doğal vejetasyon *Salicornia europaea*, *Salsola kali*, *Halimione portulacoides*, *Artrochnemum fruticosum* gibi tuz seven bitkilerden oluşmaktadır.

Tuzlu alkali topraklarda sorunların fazla olmasından dolayı VI sınıf değerinde arazilerdir. Bu toprakların islah edilmeleri güç, masraflı ve zaman alıcı olması tarımsal faaliyetin yapılmasını sınırlandırmıştır. Bu tuzlu alanlarda kamuya ait tesislerden, askeri hava alanı, organize sanayi bölgesi ve arıtma tesisi bulunmaktadır.

### 2.6.8 Regosol Topraklar (L)

Bu toprak grubu Turgutlu-Alaşehir arasında Gediz ırmağı güzergahının güneyindeki dağ ve tepelerin kuzey eteklerinde görülmektedir. Ayrıca Akhisar'ın ve Turgutlu'nun kuzeyinde de rastlanmaktadır. Regosoller gevşek ve bağıntısız depozitler üzerinde oluşan, kaba bünyeli, su tutma kapasiteleri düşük, fazla geçirgen sığ topraklardır. Bu toprak gurubunda yetişen doğal bitki örtüsü ise meşelerden oluşmaktadır. Çalışma alanında bulunan regosoller mikaşist, kum, çakıl ve molozlardan oluşmuştur. Regosoller kaba bünyeli topraklar olduğundan özellikle su erozyonu ile çabucak aşınıp taşınırlar. Bu nedenle topoğrafik görünüm sivri tepelerin hakim olduğu dağlık ve arızalı görünümdür. Regosol topraklarının kullanım şekli orman, çalılık ve mera şeklindedir. Toprak derinliğinin el verdiği ve eğimin az olduğu alanlarda ise kuru tarım, zeytin ve üzüm yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Regosol topraklar A ve C horizonuna sahip topraklar olduğu için Azonal topraklara dahil edilirler. Genellikle profilleri zayıftır. Bu toprakların A horizonu nemli iken koyu kahverengi kuru iken açık sarımsı kahverengindedir. Bünyesi kaba kumlu tın olup içinde köşeli çakıllar ihtiva eder. Toprak kuru iken yumuşaktır. Yaş iken hafif yapışkan ve plastiktir. C horizonu çok derin olup nemli iken koyu sarımsı kahverengi, kuru iken sarımsıdır. Bünyesi tın olup içinde çakıllar ve molozlar ihtiva eder. Kuru ve nemli iken gevşek, yaş iken yapışkandır. Bu toprakların sorunları sığlık, aşırı eğim, kaba bünye, taşlılık ve erozyondur.

### 2.6.9 Alüvyal Topraklar (A)

Çalışma alanının yaklaşık %10'unu kaplayan alüvyal topraklar akarsu, göl ve deniz orijinli depozitlerin meydana getirdiği genç ve derin topraklardır. Alüvyal topraklar özel bir iklime ve doğal bitki örtüsüne sahip değildirler. Bu nedenle havzanın hemen her yerinde görülebilse de çoğunlukla Gediz ırmağı ve yan kolları boyunca uzanan geniş ovalar veya ince uzun şeritler

halinde bulunurlar. alüvyal topraklar havzanın yüksek verim gücüne sahip topraklarını teşkil ederler. Bu nedenle bölgenin büyük yerleşim yerleri bu topraklar üzerinde görülür. Alüvyalleri genellikle havzanın yukarı ve orta kısımlarında kolüvyial topraklar çevreler. Alüvyial toprakların ana maddesi içinde bulunduğumuz Kuaterner formasyonuna ait muhtelif orijinli genç alüvyonlardır. Havza alüvyallerinin yarısında drenaj iyidir. Diğer yarısında ise drenaj kötü ve yetersizdir. Alüvyallerin büyük kısmı tuzsuzdur. Bu arada tuzlu ve alkali olanlara da rastlanır. Yukarıda belirtildiği gibi alüvyallerin genellikle orta bünyeli, iyi drenajlı ve tuzsuz olmaları Gediz ovasının yüksek verim gücüne sahip olmasının en önemli nedenidir. Alüvyal toprakların en önemli kullanım şekilleri, sulu tarım, kuru tarım, bağ-bahçe tarımıdır. Bu topraklar stabilleşmiş alanlarda A horizonu gelişme göstermiş ve yaklaşık 25-30 cm olup, rengi nemli iken çok koyumsu kahverengi, kuru iken grimsi kahverengidir. Bünyesi kumlu killi tın, yapısı orta derecede oluşmuş küçük granüllerdir. Toprak kuru iken sert, yaş iken hafif yapışkan olup plastik değildir. Kök gelişimi çok fazla, kireçlilik kuvvetlidir. C horizonu kendi içinde C1, C2 ve C3 gibi alt gruplara ayrılır. Renk nemli iken koyu grimsi kahverengi, kuru iken açık kahverengimsi gri, bünye tın, killi tın veya kumlu tındır. Kuru iken sert veya yumuşak, yaş iken yapışkan ve çoğunlukla plastiktir. Kök dağılımı orta veya az, kalkerlilik kuvvetlidir. Alüvyal toprakların önemli sorunları bünye, tuzluluk, alkalilik ve drenajdır.

#### **2.6.10 Kolüvyal Topraklar (K)**

Bu tip topraklar Gediz havzası'nda genellikle Kemalpaşa-Turgutlu arasında, Saruhanlı'nın kuzeyinde, Kum çayının Gediz'le birleştiği noktanın doğusunda kalan tepelik ve dağlık arazinin etek kısımlarında, Manisa'nın kuzey batısında ve özellikle büyük sahalar halinde Akhisar çevresinde bulunur. Kolüvyal topraklar benzer oluşuma sahip olmaları dolayısı ile Alüvyal toprakların yanında yer alırlar. Kolüvyal toprakların ana maddeleri dördüncü zamanın muhtelif orijinli kolüvyumlardır. Manisa, Kemalpaşa, Akhisar dolaylarında geniş alanlar halinde yer alan kolüvyaller çoğunlukla orta ve ince bünyelidir. Eğimin fazla olduğu yerlerde az bir miktar kaba bünyeli kolüvyale rastlanabilir. Kolüvyaller ana maddeye bağlı olarak kireçli veya kireçsiz olabilmektedir. Bu toprakların buldukları yerlerde Topoğrafya çoğunlukla düz ve kısmen dalgalıdır. Çalışma alanında yer alan Kolüvyal toprakların yarısına yakın kısmı kuru tarım altında olup diğer bölümleri bağ-bahçe, sulu tarım be kısmen de zeytinlik olarak değerlendirilmektedir. Kolüvyaller genellikle horizonlara sahip olmayan genç topraklar olup azonal toprak sırasına dahildirler. Bu topraklar yaklaşık 30-35 cm kalınlığında, nemli iken koyu kırmızımsı kahverengi, kuru iken kırmızımsı kahverengidir. Bünye kumlu killi tın veya kil, yapı orta büyüklükte, kaba granüllü veya bloktur. Toprak kuru iken sert, yaş iken yapışkan veya plastiktir.

## **Toprak haritası**

### 3. ÖZDEK VE YÖNTEM

#### 3.1. Özdek

Araştırma materyalimizi proje bölgemizde yer alan vejetasyon tipleri içerisindeki tüm vasküler bitkilerle mevcut bitki birlikleri ve bu birliklere ait ekolojik koşullar oluşturmaktadır.

#### 3.2. Yöntem

##### 3.2.1 Flora araştırmaları ile ilgili yöntemler

Arazi çalışmalarında proje alanına periyodik aralıklar ile gidilerek yaklaşık 2267 bitki örneği toplanmış ve toplanan bu örnekler preslenerek herbaryum materyali haline getirilmiştir. Elde edilen herbaryum örnekleri Celal Bayar Üniversitesi Botanik Laboratuvarında ve Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi -Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, başta Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Davis 1965-1985), (Davis vd. 1988), (Güner vd. 2000) olmak üzere çeşitli flora kitaplarından ve herbaryum koleksiyonlarından yararlanarak tayin edilmiştir.

Yapılan flora çalışması sonucunda elde edilen bitki listesi Türkiye Florası'nda yer alan sıralamaya göre, familya, cins, tür ve türaltı kategorilere göre hazırlanmıştır. Flora listesinde yer alan bitkiler Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Labarotuarında muhafaza edilmektedir.

Çalışma alanının florası, temel olarak arazi çalışmalarında toplanan ve tayin edilen bitkilere dayanarak hazırlanmıştır. Ancak elde edilen veriler ile birlikte Türkiye Florası'nın 1-11. ciltlerinde yer alan ve araştırma alanından toplanmış olan bitkilerde flora listesine eklenmiştir. Bunun amacı arazi çalışmaları sırasında çeşitli nedenler ile toplanması mümkün olmayan bitkilerin de flora listesine yansıtılmasıdır.

Çalışma alanı Türkiye florasında yer alan kareleme sistemine göre, B1 ve B2 kareleri içerisine girmektedir. Çalışma sahasının büyük olması nedeniyle floranın en iyi şekilde temsil edildiği 55 bitki lokalitesi tespit edilmiş ve araştırmanın özdeğini oluşturan bitkiler bu lokalitelerden toplanmıştır. Lokalitelerin yer aldığı liste flora listesinin başına eklenmiş olup Bu listede örneklerin toplandığı mevki, habitat, yükseklik, tarih ve koleksiyon numaraları belirtilmiştir.

### 3.2.2 Vejetasyon Çalışmaları

Masabaşı çalışmalarının ardından seçilen proje sahasının vejetasyonu ile ilgili çalışmalar dünyada ve ülkemizde oldukça yaygın olan Braun-Blanquet (1932) yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla vejetasyon dönemi esnasında araziye gidilerek homojen olduğu düşünülen yerlerde deneme alanları alınmıştır. Örnek alanların büyüklüğü "Minimal Alan" yöntemine göre tüm vejetasyonu temsil edecek şekilde alınmıştır:

- Ormanlar– 20 x 50 m;
- Çalılık alanlar- 20 x 50 m
- Tuzlu alanlar: 10 x 10 m (odunsu birlikler için)
- Tuzlu alanlar 4 x 4 m (otsu birlikler için)
- Dere kenarları – 4 x 4 m
- Sulak alanlar : 2 x 2 m

Alınan deneme alanlarında yöntem gereği bolluk-yoğunluk ve sosyabilite değerleri belirlenmiş ve böylece vejetasyon ham çizelgeleri elde edilmiştir. Bundan sonra yapılmış çalışmalar da dikkate alınarak bitki gruplarına ait karakteristik ve ayırtecdici türler ile bitki birlikleri belirlenmiştir.

Ülkemizde yapılan bir çok fitososyolojik çalışmaya karşın bunların çoğunda birlikler Sintaksonomi Adlandırma Koduna göre isimlendirilmemişlerdir. Bu da birlik düzeyinde belirgin bir karmaşaya yol açmaktadır. Son yıllarda birliklerin Kodda belirtilen ilke ve tavsiyeler uyarınca isimlendirilmeye başlanması, yakın gelecekte bu karmaşayı giderecektir. Bu bağlamda çalışmamızda koda bağlı kalmaya özen gösterilmiştir.

### 3.2.3 Toprak Analiz Yöntemleri

Bitki gruplarının yayılış gösterdikleri toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerini saptamak amacıyla, anakaya ve toprak tipi dikkatle alınarak, her gruba ait bazı fiziksel özellikler (kalınlık, renk, çakıl, humus içeriği, kök yayılışı gibi) arazide kaydedilmiştir. Bununla birlikte arazide pH ölçümünde kullanılan Ph ölçüm kağıtları ile toprak asiditesi de tespit edilmiştir. Genel toprak özelliklerinin değerlendirilmesinde ise Gediz Havzası Toprakları ile kapsamlı çalışmalar yapan Gediz Planlama Teşkilatı Gediz Havzası Toprak Raporları'ndan faydalanılmıştır.

## 4. BULGULAR

### 4.1 Flora

Aşağı Gediz Havzası araştırma alanından 2002-2005 yılları arasında 2267 bitki örneği toplanmıştır. Bitkilerin toplandığı lokaliteler ve tespit edilen bitki listesi aşağıdadır.

#### 4.1.1 Bitki toplanan lokaliteler

1001-1093	Akhisar Bakır, kalkerli topraklar, 100m, frigana, 4.5.2003
1094-1200	Ayvacık-Emiralem arası, Gediz boyu, kolüviyal topraklar, 50m, frigana, 7.5.2003
1201-1222	Urganlı Kaplıcası çevresi, marnlı topraklar, 150m, yol kenarı, 12.5.2003
1222-1250	Ahmetli, yol kenarları, alüviyal topraklar, 100m, 12.5.2003
1251-1378	Salihli- Adala arası, 250m, 13.5.2003
1379-1430	Adala-Demirköprü arası, bozuk meşelik, 420m 14.5.2003
1431-1455	Gölmarmara- Çömlekçi Regülatörü, Gediz kıyısı, alüvyal topraklar, 14.5.2003
1456-1548	Muradiye- Emiralem arası Gediz boyu, frigana, marnlı topraklar, 150m, 20.5.2003
1548-1593	Muradiye- Yağcılar arası, meşelik, 150 m, 26.5.2003
1594-1676	Akhisar –Saruhanlı, bozuk baltalık, 200m, 13.5.2003
1676-1723	Sasalı- Kaklıç, tuzlu topraklar, 30.5.2003
1723-1795	İzmir Kuşçenneti, Poyraz tepe, frigana, 31.5.2003
1796-1842	İzmir Kuşçenneti, Orta Tepe, Lodos Tepe, frigana 31.5.2003
1843-1980	Maltepe-Foça Tepeleri arası, frigana, kireçli topraklar, 8.6.2003
1981-1996	Menemen- Emiralem arası Gediz boyu, 23.10.2003
1997-2005	Ayvacık- Emiralem arası, 250 m 23.10.2003
2006-2029	Yamanların kuzey sırtları, kızılçam açıklığı, 400m 25.10.2003



2030-2048	İzmir Kuşçenneti, üç tepeler, 10m 25.10.2003
2049-2074	Manisa Dağı yamaçları, kızılçam açıklığı, 450 m 29.10.2003
2075-2096	Turgutlu- Salihli arası, kızılçam ormanı, 275m 30.10.2003
2097-2185	İzmir Kuşçenneti üç tepeler, frigana , 20.3.2004
2185-2264	Menemen –Gediz Ağızı, alüvyal topraklar, 20.3.2004
2265-2325	Gediz Ağızı-Foça tepeleri, 50 m, 26.3.2004
2236-2386	Emiralem- Eski Gediz yatağı, 7.4.2004
2387-2415	Yamanlar Dağı Kuzey sırtları, 300-400m kızılçam ormanı, 7.4.2004
2415-2449	Ayvacık ve çevresi, Eski Ayvacık, 8.4.2004
2500-2548	Gediz boyu, Ayvaciğın karşı kıyıları, Süleymanlı 10.4.2004
2548-2596	Gürle ve çevresi, dere yatağı, alüvyal topraklar, 10.4.2004
2597-2663	Muradiye, Kampus, Yağcılar, marnlı topraklar, meşelik, 150 m, 15.4.2004
2664-2709	Salihli Meslek Yüksek Okulu Çevresi, Gediz Boyu, alüvyal topraklar, 180m, 5.5.2004
2709-2754	Turgutlu- Ahmetli, Urganlı Kaplıcaları, yol kenarları, tarla açıklıkları, 6.5.2004
2755-2813	Manisa üzeri, Manisa Dağı Etekleri, 400m, 9.5.2004
2813-2859	İzmir Kuşçenneti –Menemen , yol kenarları, Gediz Boyu, 10.5.2004
2860-2869	Muradiye Kampus, Yağcılar, marnlı topraklar, 150m, 7.2.2005
2869-2894	Yamanlar Dağı Kuzey Yamaçları, kızılçam açıklıkları, kahverengi orman toprağı, 300m,8.2.2005
2895-2916	Manisa Dağı yamaçları, kızılçam ormanı açıklıkları, 400m, 14.2.2005
2917-2978	İzmir Kuşçenneti, üç tepeler mevkii, frigana, 15.3.2005
2979-3012	Turgutlu Salihli yolu, yol kenarları, tarla açıklıkları, 3.4.2005
3013-3025	Gölmarmara-Saruhanlı arası, alüvyal topraklar, 4.4.2005
3026-3048	Manisa Dağı, kızılçam araları, 400m, 17.04.2005
3049-3087	Menemen Aliağa arası, 100m alüvyal topraklar, 19.4.2005
3087-3102	Menemen Helvacı köyü, 46m tarla açıklıkları 19.4.2005

3013-3029	Turgutlu ıkırıkçı Ky, 110m, kızılam, meşelik, 2.5.2005
3030-3068	Ahmetli Cambazlı ky, 130m, bozuk meşelik, 2.5.2005
3069-3094	Glmarmara kıyısı, Yeniky, 84m, 2.5.2005
3095-3124	Saruhanlı Kumkuyucak, 73m 2.5.2005
3125-3149	Emiralem Reglatr, kahverengi orman toprađı, 20m, 3.5.2005
3150-3175	Emiralem Telekler Ky, andezit anakaya, meşelik, 175m 3.5.2005
3176-3189	Menemen Haykıran Ky, frigana, 188m 3.5.2005
3190-3203	Menemen-Helvacı Ky, frigana, 109 m 15.5.2005
3204-3211	İzmir Kuşçenneti tatlı su pompası civarı, 7.6.2005
3212-3226	Muradiye –Emiralem Arası, Gedizin karşı yakası , 9.6.2005
3227-3235	Salihli Durasıllı-Dombaylı kyleri, 10.6.2005
3235-3259	Salihli Kızılavlulu ky, meşelik, andezit anakaya, 10.6.2005
3260-3267	Turgutlu-Glmarmara civarı, Aysekiz kulesi, 13.6.2005

#### 4.1.2. Bitki Listesi

##### **SELAGINELLACEAE**

*Selaginella denticulata* (L.) Link. CDK 2007, Akd.

##### **ADIANTACEAE**

*Adiantum capillus-veneris* L., CDK 2756

##### **HYPOLEPIDACEAE**

*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn in Decken. CDK 2810

##### **ASPLENIACEAE**

*Asplenium trichomanes* L. CDK 2410

*Asplenium adianthum-nigrum* L., CDK 2411

*Ceterach officinarum* DC. in Lam& DC., CDK 2390

##### **ASPIDIACEAE**

*Dryopteris pallida* (Bory) Fomin in Mon. CDK 2018, Akd.

#### **GYMNOSPERMAE**

##### **PINACEAE**

*Pinus nigra* subsp. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe in berg. CDK 2811

*Pinus brutia* Ten. CDK 2075, D.Akd.

*Pinus pinea* L., CDK 1001

**CUPRESSACEAE**

*Cupressus sempervirens* L. CDK 2012

*Juniperus communis* subsp. *nana* L., CDK 2051

*Juniperus oxycedrus* subsp. *oxycedrus* Link. CDK 2754

**EPHEDRACEAE**

*Ephedra campylopoda* C.A.Meyer., CDK 2031

**ANGIOSPERMAE****DICOTYLEDONES****RANUNCULACEAE**

*Nigella arvensis* var. *involucrata* Boiss., CDK 2265

*Nigella elata* Boiss., CDK 2709

*Delphinium staphisagria* L., CDK 2548, Akd.

*Delphinium peregrinum* CDK 3227

*Consolida ambigua* (L.) P.W. Ball in Feddes CDK 3001

*Anemone blanda* Schott&Kotschy CDK3026

*Anemone coronaria* L., CDK 2032, Akd.

*Clematis vitalba* L. CDK 2757

*Clematis cirrhosa* L. CDK 2860, Akd.

*Adonis annua* L. CDK 3027, Akd.

*Adonis flammea* Jacq. CDK 3032

*Ranunculus velutinus* Ten., CDK 2415, Akd.

*Ranunculus constantinopolitanus* (DC.) d'Urv. CDK 1796

*Ranunculus paludosus* Poiret ., CDK 2265

Ranunculus sprunerianus Boiss., CDK 1981, D.Akd.  
 Ranunculus rumelicus Griseb CDK 1723, D.Akd.  
 Ranunculus illyricus L., CDK 1676  
 Ranunculus marginatus var.trachycarpus (Fisch. & Meyer) Azn., CDK 2100  
 Ranunculus muricatus L., CDK 2185  
 Ranunculus chius DC.,, CDK 2869  
 Ranunculus ficaria subsp.ficariformis Rouy& Fouc., CDK 1094  
 Ranunculus sphaerospermus Boiss & Blanche in Boiss. CDK 1431  
 Ranunculus saniculifolius Viv., CDK 1380  
 Ranunculus arvensis L. CDK 2049  
 Ranunculus rionii Lager. CDK 1677  
 Thalictrum lucidum L., CDK 2267  
 Thalictrum flavum L., CDK 3012

#### **PAEONIACEAE**

Paeonia mascula subsp. arietina (Anders..) Cullen & Heywood., CDK 3028

#### **BERBERIDACEAE**

Berberis cretica L. CDK 2738, D.Akd.  
 Leontice leontopetalum subsp.leontopetalum Holmboe., CDK 2814

#### **PAPAVERACEAE**

Glacium corniculatum (L.) Rud , CDK 1724, Ir-Tur.  
 Glacium flavum Crantz., CDK 2097  
 Glacium leiocarpum Boiss. CDK 2850  
 Roemeria hybrida subsp. hybrida L., CDK 1781  
 Papaver somniferum L., CDK 1375  
 Papaver gracile Boiss., CDK 2052 , D.Akd.

Papaver rhoeas L., CDK 1798  
Papaver argemone L., CDK 2871  
Papaver hybridum L., CDK 2096  
Hypecum procumbens L., CDK 2814, Akd.  
Hypecum imberbe Sibth & Sm, CDK 1813  
Fumaria juadica Boiss., CDK 1929, D.Akd.  
Fumaria macrocarpa Parl., CDK 1725, D.Akd.  
Fumaria capreolata L., CDK 2841  
Fumaria petteri Reichb., CDK 2919, D.Akd.  
Fumaria kralikki Jordan ., CDK 1982, Akd.  
Fumaria officinalis L., CDK 1736  
Fumaria vailantii Lois in Desf., CDK 2912  
Fumaria parviflora Lam, CDK 2028

### **CRUCIFERAE**

Brassica tournefortii Gouan., CDK 1997  
Sinapis alba L., CDK 1843  
Hirschfeldia incana (L.) Lag.- Foss., CDK 1753  
Diplotaxis teunifolia (L.) DC., CDK 3021  
Diplotaxis viminea (L.) DC., CDK 2399  
Eruca sativa Miller., CDK 1845  
Raphanus rapistrum L., CDK 3210  
Calepina irregularis (Asso) Thellung in Schinz &Keller., CDK 3049  
Rapistrum rugosum (L.) All., CDK 1087  
Cakile maritima Scop., CDK 1727  
Leipdium spinosum Ard., CDK 2008  
Lepidium latifolium L., CDK 2009  
Cardaria draba (L.) Desf., CDK 2101

*Coronopus squamatus* (Forssk.) Aschers., CDK 1797  
*Iberis attica* Jord., CDK 2913, D.Akd.  
*Iberis acutiloba* Bertol., CDK 3029  
*Biscutella didyma* L., CDK 3176  
*Aethionema polygaloides* DC., CDK 2055  
*Thlaspi perfoliatum* L., CDK 2416  
*Teesdalia coronopifolia* (Berg.) Thell., CDK 1800, Akd.  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., CDK 1086  
*Capsella rubella* Reut., CDK 1701, Akd.  
*Bunias erucago* L., CDK 1848  
*Fibigia clypeata* (L.) Medik., CDK 2069  
*Aurinaria saxatilis* subsp. *orientalis* (Ard.) Dudley., CDK 2713  
*Alyssum foliosum* Bory&Chaub., CDK 1222, D.Akd.  
*Alyssum smyrnaeum* Meyer in Bull., CDK 2001, D.Akd.  
*Alyssum fulvescens* var. *fulvescens* Sibth. & Sm, CDK 1983, D.Akd.  
*Alyssum umbellatum* Desv., CDK 2549  
*Alyssum murale* var. *murale* Waldst. & Kit., CDK 1995  
*Clypeola jonthlaspi* L., CDK 1726  
*Erophila verna* subsp. *verna* (L.) Chevall., CDK 2676  
*Erophila verna* subsp. *spathulata* (Lang.) Walters, CDK 2033  
*Arabis turrita* L., CDK 2812  
*Arabis verna* (L.) DC., CDK 1101, Akd.  
*Nasturtium officinale* R.Br in Aiton., CDK 1543  
*Rorippa amhibia* (L.) Bess., CDK 2918  
*Barbarea minor* var. *eripoda* Buschin Fl., CDK 2098  
*Cardamine graeca* L., CDK 2759  
*Cardamine hirsuta* L., CDK 2027  
*Aubrieta deltoidea* (L.) DC., CDK 1312

*Matthiola incana* (L.) R. Br. In Aiton., CDK 1736

*Matthiola tricuspidata* (L.) R. Br. In Aiton., CDK 2815, Akd.

*Hesperis laciniata* All., CDK 3047

*Hesperis balansae* subsp. *balanceae* Boiss & Spruner in Boiss., **Endemik** CDK 3028

*Malcolmia africana* (L.) R. Br. In Aiton., CDK 1810

*Malcolmia chia* (L.) Dc., CDK 294, D.Akd.

*Malcolmia flexuosa* (Sibth. & SM) Sibth. & Sm, CDK 1678, D.Akd.

*Malcolmia graeca* Boiss & Sprun., CDK 1728

*Erysimum smyrnaeum* Boiss & Bal. in Boiss., CDK 1198

*Sisymbrium officinale* (L.) Scop., CDK 1095

*Sisymbrium altissimum* L., CDK 1112

*Sisymbrium orientale* L., CDK 1456

*Sisymbrium irio* L., CDK 2102

#### **CAPPARACEAE**

*Capparis spinosa* var. *spinosa* L., CDK 1223

*Capparis ovata* Desf., CDK 1002

#### **RESEDACEAE**

*Reseda lutea* var. *lutea* L., CDK 2113

#### **CISTACEAE**

*Cistus creticus* L., CDK 1006

*Cistus parviflorus* Lam, CDK 2406, D.Akd.

*Cistus salviifolius* L., CDK 1975

*Helianthemum racemosum* (L.) Pau in Treb., CDK 2418, Akd.

*Helianthemum salicifolium* (L.) Miller., CDK 2269

*Helianthemum aegyptiacum* (L.) Miller., CDK 1075



*Fumana thymifolia* var. *thymifolia* L., CDK 1033, Akd.

*Fumana thymifolia* var. *viridis* (Ten.) Boiss., CDK 1548, Akd.

*Tuberiaria guttata* var. *guttata* Dunal., CDK 2802

### **VIOLACEAE**

*Viola odorata* L., CDK 2789

### **POLYGALACEAE**

*Polygala monspeliaca* L., CDK 1432, Akd.

### **PORTULACACEAE**

*Portulaca oleracea* L., CDK 1096

*Montia minor* Gmelin., CDK 1681

### **CARYOPHYLLACEAE**

*Arenaria serpyllifolia* L., CDK 1803

*Minuartia juressi* subsp. *asiatica* **Endemik.**, CDK 1175, Akd.

*Minuarita juniperina* (L.) Maire & Petitm., CDK 1683

*Minuartia mesogitana* subsp. *kotschyana* (Boiss) Mcneil., CDK 2839, D.Akd.

*Minuartia mesoginata* subsp. *lydia* (Boiss.) Mcneil., 2921

*Stellaria media* L., CDK 1097

*Cerastium banaticum* ((Roch) Heuffel in Verh., CDK 1984

*Cerastium dichotomum* subsp. *dichotomum* L., CDK 2387

*Cerastium glomeratum* Thuill., CDK 2106

*Cerastium brachypetalum* Pres., CDK 1102

*Cerastium semidecandrum* Viv. CDK 1799

*Cerastium fragillimum* Boiss., CDK 2803

*Cerastium gracile* Duf., CDK1846

Gerastium illyricum Ard., CDK 2120, D.Akd.  
Moenchia mantica subsp.mantica (L.) Bartl., 1087  
Moenchia mantica subsp.caerulea (Boiss.) Boiss., CDK 1754  
Sagina procumbens L., CDK2114  
Sagina apetala Ard., CDK 2268  
Holosteum umbellatum var tenerrimum L., CDK 1041  
Spergularia rubra (L) J&C.Presl., CDK 2190  
Spergularia marina (L.) Gris., CDK 2931  
Dianthus tripunctatus Sibth&Sm, CDK 1594, Akd.  
Dianthus corymbosus Sibth&Sm, CDK2872  
Dianthus pubescens Sibth&Sm, CDK 2915, D.Akd.  
Dianthus zonatus var zonatus L., CDK 2405  
Dianthus calocephalus Boiss., CDK 2388  
Dianthus lydus Boiss **Endemik**, CDK 3177  
Petrorhagia velutina (Guss) Ball&Heywood., CDK 1035  
Valezia quadridentata Sibth&Sm, CDK 1740, D.Akd.  
Velezia rigida L., CDK 2099  
Saponaria mesogitana Boiss., CDK 3235, D.Akd.  
Vaccaria pyramidata subsp.grandiflora (Fisch ex DC)., CDK 2873  
Silene gigantea var. Incana (Griseb) Chowdth., CDK 2026, D.Akd.  
Silene otites (L.) Wibel., CDK 2186  
Silene fabaria (L.) Sibth. & Sm, CDK 2071  
Silene behen L., CDK 1985  
Silene cretica L., CDK 2312, Akd.  
Silene dichotoma subsp.dichotoma Ehrh., CDK 2271  
Silene urvillei Schott in DC., **Endemik**, CDK 2053, D.Akd.  
Silene squamigera Boiss., CDK 2184, D.Akd.  
Silene nocturna L., CDK 1991, Akd.

*Silene apetala* Willd., CDK 2187

*Silene colorata* Poir., CDK1442

*Silene conica* L., CDK 1503

*Silene subconica* Friv., CDK 1914

*Agrostemma gracilis* Boiss., CDK 1685

### **ILLEBERACEAE**

*Herniaria hirsuta* L., CDK 2036

*Herniaria incana* Lam, CDK 2834

*Paronychia chionaea* Boiss., **Endemik**, CDK 2821

*Scleranthus annus* subsp. *verticillatus* (Tausch.) Arc., CDK 2927

### **POLYGONACEAE**

*Polygonum amphibium* L., CDK 1433

*Polygonum lapathifolium* L., CDK 2002

*Polygonum arenastrum* Bor., CDK 1811

*Polygonum aviculare* subsp. *aequale* (Lindm) Aschers & Graebn., CDK 2394

*Polygonum equisetiforme* Sibth&Sm, CDK 2389

*Polygonum pulchellum* Lois., CDK 1145

*Rumex acetocella* L., CDK 1993

*Rumex tuberosus* subsp. *tuberosus* L., CDK 2034

*Rumex patienta* L., CDK 1702

*Rumex crispus* L., CDK 1114

*Rumex conglomeratus* Murray., CDK 2072

*Rumex palustris* Sm, CDK 1933

*Rumex pulcher* L., CDK 2391

*Rumex bucephaloporus* L., CDK 2961, Akd.

**CHENOPODIACEAE**

- Beta maritima var. maritima L., CDK 1728
- Chenopodium botrys L., CDK 1682
- Chenopodium murale L., CDK 1741
- Chenopodium vulvaria L., CDK 1689
- Chenopodium urbicum L., CDK 2922
- Chenopodium album subsp. album var. album L., CDK 3205
- Chenopodium opulifolium Schrad., CDK 2815
- Atriplex lasiantha Boiss., CDK 3051
- Atriplex hastata L., CDK 3206
- Halimione portulacoides (L.) Aellen in Verh., CDK 2039
- Halocnemum strobilaceum (Pall)Bieb., CDK 2146
- Arthrocnemum fruticosum (L.)Moq., CDK 2159
- Arthrocnemum glaucum (Del)Ung-Sternb., CDK 2156
- Salicornia europaea fragilis Ball&Tutin., CDK 2147
- Salicornia perennis Mill., CDK 2149
- Suaeda splendens (Poiret)Gren.&Godran in fl., CDK 2158
- Suaeda prostrata subsp. prostrata L., CDK 2151
- Salsola kali L., CDK 3211
- Salsola ruthenica Iljin., CDK 1703
- Salsola soda L., CDK 1780
- Salsola macera Litw., CDK 2272
- Petrosimonia brachiata (Pallas) Bunge., CDK 2341

**AMARANTHACEAE**

- Amaranthus retroflexus L., CDK 2819
- Amaranthus deflexus L., CDK 1434
- Amaranthus albus L., CDK 2239

*Amaranthus graecizans* var. *graecizans* L., CDK 2824

*Amaranthus graecizans* var. *sylvestris* (Vill.) Aschers. & Schweinf., CDK 2273

*Amaranthus chlorostachys* Willd., CDK 1514

#### **CYNOCRAMBACEAE**

*Theligonum cynocrambe* L., CDK 2116

#### **MOLLUGINACEAE**

*Mollugo cerviana* (L.) Ser. in DC., CDK 1229

#### **TAMARICACEAE**

*Tamarix hampeana* Boiss. & Heldr., CDK 2816

*Tamarix parviflora* DC., CDK 2305

*Tamarix smyrnensis* Bunge., CDK 1436

#### **FRANKENIACEAE**

*Frankenia hirsuta* L., CDK 2923

*Frankenia pulverulenta* L., CDK 2949

#### **ELATINACEAE**

*Elatine macropoda* Guss., CDK 2817

#### **GUTTIFERAE**

*Hypericum empetrifolium* Willd., CDK 2213, D.Akd.

*Hypericum atomarinum* Boiss., CDK 2842, D.Akd.

*Hypericum perforatum* L., CDK 1341, Akd.

*Hypericum olympicum* subsp. *olympicum* L., CDK 2762, D.Akd.

*Hypericum perforatum* L., CDK 2998

**MALVACEAE**

- Malva sylvestris L., CDK 1336  
Malva neglecta Wallr., CDK 2254  
Malva parviflora L., CDK 2191  
Lavatera cretica L., CDK 2501  
Lavatera punctata All., CDK 1256  
Alcea pallida Waldst. & Kit., CDK 2981  
Althaea cannabina L., CDK 2755  
Althaea officinalis L., CDK 3208  
Althaea hirsuta L., CDK 3088  
Gossypium hirsutum L.,(kültür) CDK 1691

**LINCEAE**

- Linum corymbulosum Reichb., CDK 1257  
Linum trigynum L., CDK 1597, Akd.  
Linum strictum var.spicatum Pers., CDK 2666  
Linum tmoleum Boiss., **Endemik**, CDK 2413, D.Akd.  
Linum virgultorum Boiss&Heldr. In Boiss., CDK 2772, D.Akd.  
Linum bienne Miller., CDK 2953, Akd.

**GERANIACEAE**

- Geranium lucidum L., CDK 2881  
Geranium purpureum Vill., CDK 2566  
Geranium robertianum L., CDK 2613  
Geranium rotundifolium L., CDK 1515  
Geranium molle subsp.molle L., CDK 1226  
Geranium dissectum L., CDK 1085

*Geranium pyrenaicum* Burm Fil., CDK 1613

*Erodium gruinum* L., CDK 1850, D.Akd.

*Erodium hoefftianum* C.A. Meyer., CDK 1684

*Erodium botrys* (Cav.) Bertol., CDK 1737, Akd.

*Erodium ciconium* (L.) L.'Hérit, CDK 1443

*Erodium malacoides* (L.) L.'Hérit., CDK 2875, Akd.

*Erodium cicutarium* subsp.*cutarium* (L.) L.'Hérit., CDK 1922

#### **OXALIDACEAE**

*Oxalis pes-caprea* L., CDK 2820

#### **ZYGOPHYLLACEAE**

*Tribulus terrestris* L., CDK 1851

#### **RUTACEAE**

*Ruta montana* (L.) L., CDK 1813

*Haplophyllum megalanthum* Bornm, **Endemik**, CDK 1518, D.Akd.

#### **VITACEAE**

*Vitis vinifera* L., CDK 1549

#### **RHAMNACEAE**

*Paliurus spina-christi* Miller., CDK 2004

#### **ANACARDIACEAE**

*Rhus coriaria* L., CDK 2064

*Pistacia lentiscus* L., CDK 2312, Akd.

*Pistacia atlantica* Desf., CDK 2414

*Pistacia terebinthus* subsp. *terebinthus* L., CDK 1282, Akd.

*Pistacia terebinthus* subsp. *palaestina* L., CDK 1420, D.Akd.

### **LEGUMINOSAE**

*Cercis siliquastrum* subsp. *siliquastrum* L., CDK 2013

*Anagyris foetida* L., CDK 1761, Akd.

*Gonoctysus angulatus* (L.) Spach in Ann., CDK 1086, D.Akd.

*Spatium junceum* L., CDK 2316, Akd.

*Calicatome villosa* (Poiret) Link., CDK 1935, Akd.

*Genista lydia* var. *lydia* Spach in Ann., CDK 2895

*Lupinus angustifolius* L., CDK 1816

*Lupinus hispanicus* Boiss. & Reuter., CDK 2921

*Galega officinalis* L., CDK 2561, Av. – Sib

*Biserrula pelecinus* L., CDK 2753, Akd.

*Colutea melanoclyx* subsp. *melanocalyx* Boiss. & Heldr., CDK 2899

*Astragalus hamosus* L., CDK 2078

*Astragalus graecus* Boiss. & Sprun. in Boiss., CDK 1156

*Astragalus nervulosus* Eig & Reese enend., **Endemik**, CDK 3229 Ir. – Tur.

*Astragalus tmoleus* var. *tmoleus* Boiss., CDK 3241, D.Akd.

*Glycyrrhiza glabra* var. *glandulifera* (Waldst. & Kit.) Boiss., CDK 3080

*Psoralea bituminosa* L., CDK 1739, Akd.

*Vicia villosa* subsp. *eriocarpa* (Hauskn.) P.W. Ball., CDK 2670

*Vicia palaestina* Boiss., CDK 1567, D. Akd.

*Vicia cracca* subsp. *stenophylla* Vel., CDK 2689

*Vicia articulata* Hornem, CDK 1964

*Vicia ervilia* (L.) Willd., CDK 1852

*Vicia pubescens* (DC.) Link., CDK 2850, Akd.

*Vicia hirsuta* (L.) S.F. Gray., CDK 1687



*Vicia peregrina* L., CDK 2818

*Vicia lutea* var.*hirta* (Balbis.) Lois., CDK 1233

*Vicia laxiflora* Brot., CDK 2675, Akd.

*Vicia melanops* Sibth.&Sm, CDK 2418

*Vicia pannonica* var.*purpurascens* (DC) Ser., CDK 2764

*Vicia hybrida* L., CDK 1061

*Vicia grandiflora* var..*grandiflora* Scop., CDK 2392

*Vicia grandiflora* var.*dissecta* Boiss., CDK 1422

*Vicia cuspidata* Boiss., CDK 2843, D.Akd.

*Vicia lathyroides* L., CDK 1337

*Lens nigricans* (Bieb.)Gordr., CDK 24, Akd.07

*Lens ervoides* (Brign.) Grande., CDK 2181, Akd.

*Lathyrus digitatus* (Bieb.) Fiori., CDK 2570, D.Akd.

*Lathyrus setifolius* L., CDK 1732, Akd.

*Lathyrus annuus* L., CDK 2832, Akd.

*Lathyrus cicera* L., CDK 2884

*Lathyrus sativus* L., CDK 1969

*Lathyrus aphaca* var.*aphaca* L., CDK 1118

*Pisum sativum* subsp.*elatius* var.*elatius* (Bieb.) Aschers. & Graebn., CDK 2089, Akd.

*Ononis viscosa* subsp.*brevifolia* (DC.) Nyman., CDK 2047

*Ononis pusilla* L., CDK 1157, Akd.

*Ononis spinosa* L., CDK 1742

*Trifolium uniflorum* L., CDK 1, Akd.073

*Trifolium repens* var.*repens* L., CDK 2275

*Trifolium nigrescens* var.*petrisavii* (Clem) Holmboe., CDK 2086

*Trifolium speciosum* Willd., CDK 1580

*Trifolium hybridum* var.*anatolicum* (Boiss) Boiss., CDK 1237

*Trifolium boissieri* Guss ex Boiss., CDK 2395, D.Akd.

*Trifolium campestre* Schreb., CDK 2683  
*Trifolium spumosum* L., CDK 1634, Akd.  
*Trifolium resupinatum* L., CDK 2409  
*Trifolium clusii* Godr. & Gren., CDK 2707  
*Trifolium tomentosum* L., CDK 2829  
*Trifolium setiferum* Boiss., CDK 1563, D.Akd.  
*Trifolium glanduliferum* var. *glanduliferum* Boiss., CDK 1320, D.Akd.  
*Trifolium pratense* var. *pratense* L., CDK 2240  
*Trifolium pallidum* Waldst. & Kit., CDK 1159  
*Trifolium stellatum* var. *stellatum* L., CDK 1462  
*Trifolium stellatum* var. *adpressum* Turill., CDK 2520, D.Akd.  
*Trifolium bocconeii* Savi., CDK 1641, Akd.  
*Trifolium scabrum* L., CDK 2572  
*Trifolium phleoides* Pourr. ex Willd., CDK 3190, Akd.  
*Trifolium hirtum* All., CDK 1301, Akd.  
*Trifolium lappaceum* L., CDK 1160, Akd.  
*Trifolium cherleri* L., CDK 3260, Akd.  
*Trifolium arvense* var. *arvense* L. CDK 1049  
*Trifolium affine* C.Presl., CDK 1572  
*Trifolium angustifolium* var. *angustifolium* L., CDK 1014  
*Trifolium purpureum* var. *purpureum*, Lois., CDK 1258  
*Trifolium squamosum* L., CDK 1461, Akd.  
*Trifolium echinatum* Bieb., CDK 1238, D.Akd.  
*Trifolium clypeatum* L., CDK 1130, D.Akd.  
*Trifolium scutatum* Boiss., CDK 2827, D.Akd.  
*Trifolium pauciflorum* d'Urv., CDK 1623, D.Akd.  
*Trifolium pilulare* Boiss., CDK 2239  
*Trifolium globosum*, CDK 2324

*Trifolium subterraneum* L., CDK 1544  
*Melilotus indica* (L.) All., CDK 1804  
*Melilotus messanensis* (L.) All., CDK 3179, Akd.  
*Melilotus italica* (L.) Lam, CDK 2602, Akd.  
*Trigonella balansae* Boiss. & Reuter., CDK 1814, DAkd.  
*Trigonella spruneriana* var. *spruneriana* Boiss., CDK 1021Ir. – Tur.  
*Trigonella monspeliaca* L., CDK 1636, Akd.  
*Medicago orbicularis* (L.) Bart., CDK 2511  
*Medicago lupulina* L., CDK 2241  
*Medicago sativa* subs. *sativa* L., CDK 1173  
*Medicago minima* var. *minima* (L.) Bart., CDK 2326  
*Medicago polymorpha* var. *vulgaris* (Bent.) Shinn., CDK 1099  
*Medicago littoralis* var. *littoralis* Rhode ex. Lois., CDK 1187  
*Medicago rigidula* var. *rigidula* (L.) All., CDK 1060  
*Medicago turbinata* var. *chiotica* Urb., CDK 3197  
*Dorycnium hirsutum* (L.) Ser., CDK 2768, Akd.  
*Dorycnium pentaphyllum* subsp. *herbaceum* (Vill.) Rouy in Rouy et Fouc., CDK 2910  
*Lotus ornithopodioides* L., CDK 2563, Akd.  
*Lotus corniculatus* var. *corniculatus* L., CDK 3002  
*Lotus aegaeus* (Gris.) Boiss., CDK 2825, Ir.-Tur.  
*Tetragonolopus purpureus* Moench., CDK 1240  
*Hymenocarpus circinatus* (L.) Savi., CDK 1974, Akd.  
*Anthyllis hermanniae* L., CDK 1502, Akd.  
*Anthyllis vulneraria* subsp. *praeporopera* (Kerner) Bornm, CDK 1998, Akd.  
*Securigera securidaca* (L.) Degen. & Dörf., CDK 2763  
*Coronilla scorpioides* (L.) Koch., CDK 1227  
*Coronilla cretica* L., CDK 1963, D.Akd.  
*Coronilla parviflora* Willd., CDK 2823, D.Akd.

*Coronilla varia* subsp.*varia* L., CDK 2402  
*Ornithopus copressus* L., CDK 2979, Akd.  
*Hippocrepis unisiliquosa* subsp.*unisiliquosa* Sprengel., CDK 1050  
*Hippocrepis ciliata* Willd., CDK 1464, Akd.  
*Scorpiurus muricatus* var.*subvillosus* L., CDK 2942, Akd.  
*Hedysarum varium* Willd., CDK 2054, Ir-Tur.  
*Onobrychis caput galli* (L.) Lam, CDK 2944, Akd.  
*Onobrychis aequidentata* (Sibth. &Sm)d'URV., CDK 2947, Akd.  
*Onobrychis lasiostachya* Boiss., CDK 1163  
*Onobrychis oxyodonta* Boiss., CDK 2349

## **ROSACEAE**

*Amygdalus communis* L., CDK 1798  
*Rubus santcus* Schreber., CDK 2327  
*Rubus canescens* D.C., CDK 2010, Av-Sib.  
*Potentilla recta* L., CDK 2573  
*Potentilla kotschyana* Fenzl., CDK 3261, D.Akd.  
*Potentilla reptans* L., CDK 1930  
*Sarcopoterium spinosum* (L.) Spanch., CDK 1175, D.Akd.  
*Sanguisorba minor* subsp.*minor* Scop., CDK 1303  
*Sanguisorba minor* subsp. *magnoli* (Spach.) Briq., CDK 3192  
*Sanguisorba minor* subsp.*muricata* (Spach.) Briq., CDK 1051  
*Prunus divaricata* Ledeb., CDK 2985  
*Prunus cocomilia* var.*cocomilia* Ten., CDK 2011  
*Fragaria vesca* L. Kùltùr., CDK 2521  
*Rosa phoenicia* Boiss., CDK 2230  
*Rosa foetida* J. Herrm, CDK 1321, Ir-Tur.  
*Pyrus amygdaliformis* var. *amygdaliformis* Vill., CDK 2056, D.Akd.

**LYTHRACEAE**

*Lythrum salicaria* L., CDK 1483, Av-Sib.

*Lythrum hyssopifolia* L., CDK 1314

*Lythrum thymifolia* L., CDK 1488

*Lythrum tribacteatum* Salzm ex Sprengel., CDK 1702

**ONAGRACEAE**

*Ludwigia palustris* (L.) Eliot., CDK 1776

*Epilobium hirsutum* L., CDK 2579

*Epilobium parviflorum* Schreber., CDK 1061

*Epilobium lanceolatum* Seb&Mauri., CDK 2401

**CUCURBITACEAE**

*Echballium elatarium* (L.) A.Rich., CDK 1685, Akd.

**CRASSULACEAE**

*Rosularia serrata* (L.) Berger in Engler&Prantl., CDK 2058, D.Akd.

*Sedum amplexicaule* DC., CDK 2011, Akd.

*Sedum sartorianum* Boiss., CDK 2060

*Sedum confertiflorum* Boiss., CDK 2901, D.Akd.

*Sedum litoreum* Guss., CDK 2571, Akd.

*Sedum caespitosum* (Cav.)DC., CDK 2062, Akd.

*Sedum hispanicum* var. *hispanicum* L., CDK 2914

**PARNASSIACEAE**

*Parnassia palustris* L., CDK 2510

**UMBELLIFERAE**

*Eryngium maritimum* L., CDK 1688

*Eryngium creticum* Lam, CDK 2048, D.Akd.

*Eryngium campestre* var. *campestre* L., CDK 2330

*Lagoecia cuminoides* L., CDK 1164, Akd.

*Echinophora teunifolia* subsp. *sibthorpiana* (Guss.) Tutin., CDK 1062, Ir-Tur.

*Echinophora trichopylla* J.E.Smith, **Endemik**, CDK 2056, D.Akd.

*Myrrhoides nodosa* (L.) Cannon in Feddes., CDK 2392

*Anthriscus tenerrima* Boiss. & Spruner, CDK 2231

*Scandix iberica* Bieb., CDK 1005

*Scandix pecten-veneris* L., CDK 1054

*Scaligera napiformis* (Sprengel) Grande., CDK 1177, D.Akd.

*Symnium olusatrum* L., CDK 2242

*Symnium rotundifolium* Miller., CDK 2522, D.Akd.

*Smyrnum creticum* Miller., CDK 1052

*Crithmum maritimum* L., CDK 1782

*Oenanthe pimpinelloides* L., CDK 1304

*Oenanthe silasifolia* Bieb., CDK 3263

*Foeniculum vulgare* Miller., CDK 1797

*Anethum graveolens* L., CDK 2578

*Conium maculatum* L., CDK 2562

*Lecokia cretica* (Lam)DC., CDK 3191

*Heptaptera anatolica* (Boiss.)Tutin, CDK 1325

*Hippomaranthum cristatum*(DC)Boiss., CDK 2986, D.Akd.

*Buplerum intermedium* Poiret., CDK 2512

*Buplerum odontites* L., CDK 2332

*Buplerum flavum* Forssk., CDK 2862, D.Akd.

*Buplerum gracile* d'URV., CDK 1056, D.Akd.

- Buplerum asperuoides Heldr. In Boiss., CDK 2759
- Buplerum trichopodium Boiss&Spruner in Ann., CDK 1460, D.Akd.
- Apium nodiflorum (L.) Lag., CDK 2820
- Amni visnaga (L.) Lam, CDK 2331, Akd.
- Ammi majus L., CDK 1690, Akd.
- Cnidium silaifolium (Jacq.)Simnokai., CDK 2916
- Falcaria vulgaris Bernh., CDK 1171
- Ferula communis subsp.communis L., CDK 2514, Akd.
- Ferulago humilis Boiss., **Endemik** , CDK 1517, D.Akd.
- Ferulago asparagifolia Boiss in Ann., **Enelemik.**, CDK 3034, D.Akd.
- Opoponax hispidus (Friv.) Gris., CDK 2130
- Tordylium apulum L., CDK 1010, Akd.
- Tordylium aegaeum Runem .in Bot., CDK 2845, D.Akd.
- Thapsia garganica L., CDK 2876, Akd.
- Torillis nodosa (L.) Gaertner., CDK 2232
- Torillis arvensis subsp.purpurea (Ten.) Hayek., CDK 2980, Akd.
- Torillis ucranica Sprengel., CDK 1098
- Torillis leptophylla (L.)Reiichb., CDK 1083
- Orlaya daucoides (L.) Greuter., CDK 1830, Akd.
- Daucus carota L., CDK 1621
- Daucus guttatus Smin Sibth&Sm, CDK 1053
- Daucus broteri Ten., CDK 2128, Akd.
- Daucus involucratus Sm In Sibth&Sm, CDK 1692, D.Akd.
- Pseudorlaya pumila (L.) Grande., CDK 3195, Akd.
- Artedia squamata L., CDK 2523

### **CAPRIFOLIACEAE**

- Lonicera etrusca Santi., CDK 2081, Akd.

**VALERIANACEAE**

*Valeriana dioscoridis* Sm In Sibth&Sm, CDK 2129, D.Akd.

*Valerianella echinata* (L.) DC., CDK 2234, Akd.

*Valerianella balansae* Matthews., CDK 2403, D.Akd.

*Valerianella orientalis* (Schlecht.)Boiss&Bal. In Boiss., CDK 1323, D.Akd.

*Valerianella costata*(Steve.)Betcke., CDK 2336, Akd.

*Valerianella carinata* Lois., CDK 2982

*Valerianella coronata* (L.) DC., CDK 1179

*Valerianella discoidea* (L.) Lois., CDK 3264, Akd.

*Valerianella obtusiloba* Boiss., CDK 1172, D.Akd.

*Valerianella vesicaria* (L.) Moench., CDK 2516

*Valerianella muricata* (Stev.) Baxt., CDK 2844

**DIPSACACEAE**

*Cephalaria transsylvanica* (L.) Schrader., CDK 1624

*Knautia integrifolia* (L.) Bert., var. *Bidens* ., CDK 1074, D.Akd.

*Scabiosa atropurpurea* subsp.*maritima* (L.) Beg., CDK 1803

*Scabiosa cosmoides* Boiss., CDK 2421, D.Akd.

*Scabiosa hispidula* Boiss., CDK 2338

**COMPOSITAE**

*Bidens tripartita* L., CDK 2342

*Xanthium strumarium* subsp.*strumarium* L., CDK 2342

*Astersicus aquaticus* (L.) Less., CDK 1755, Akd.

*Pallenis spinosa* (L.) Cass., CDK 2126, D.Akd.

*Inula salicina* L., CDK 1185, Av-Sib.

*Inula heterolepis* Boiss., CDK 1202, D.Akd.



*Inula graveolens* (L.) Desf., CDK 1501, Akd.  
*Inula critnmoides* L., CDK 1864  
*Inula viscosa* (L.) Aiton., CDK 3266, Akd.  
*Pulicaria odora* (L.) Reichb., CDK 2825, D.Akd.  
*Pulicaria vulgaris* (L.) Gaertner., CDK 1183, Av-Sib.  
*Pulicaria arabica* (L.) Cass., CDK 2524  
*Pulicaria dysenterica* (L.) Cass., CDK 1503  
*Phagnalon graecum* Boiss., CDK 1625, D.Akd.  
*Helichrysum stoechas* (L.) Moench., CDK 1910  
*Helichrysum orientale* (L.) DC., CDK 2313, Akd.  
*Filago vulgaris* Lam, CDK 2125  
*Filago eriocephala* Guss., CDK 2802, D.Akd.  
*Filago pyramidata* L., CDK 2360  
*Logfia gallica* (L.) Cosson & Germ, CDK 2971  
*Logfia arvensis* (L.) Holub., CDK 2515  
*Evax pygmaea* (L.) Brot., CDK 1, Akd.324  
*Aster tripolium* L., CDK 2343  
*Conyza canadensis* (L.) Cronquist., CDK 2532  
*Conyza bonariensis* (L.) Cronquist, CDK 1626  
*Bellis annua* L., CDK 2236, Akd.  
*Bellis perennis* L., CDK 1860, Av-Sib.  
*Bellis sylvestris* Cyr., CDK 3004, Akd.  
*Doronicum orientale* Hoffm, CDK 2760  
*Senecio jacobea* L., CDK 1581  
*Senecio bicolor* (Willd.) Tod. **Endemik.**, CDK 1762  
*Senecio vulgaris* L., CDK 2420  
*Senecio vernalis* Waldst. & Kit., CDK 2039  
*Tussilago farfara* L., CDK 2062, Av-Sib.

- Calendula arvensis* L., CDK 2127
- Anthemis cretica* subsp.*leucanthemoides* (Boiss.) Grierson., CDK 1853
- Anthemis auriculata* Boiss., CDK 3194, D.Akd.
- Anthemis tomentosa* subsp.*tomentosa* L., CDK 1034, D.Akd.
- Anthemis chia* L., CDK 1861, D.Akd.
- Anthemis cotula* L., CDK 1012
- Anthemis pseudocotula* Boiss., CDK 2301
- Anthemis austriaca* Jacq., CDK 2987
- Matricaria chamomilla* var.*recutita* (L.) Grierson., CDK 1115
- Chrysanthemum segetum* L., CDK 1116, Akd.
- Tripleurospermum parviflorum* (Willd.) Pobed., CDK 2290
- Onopordum illyricum* L., CDK 2423, Akd.
- Silybum marianum* (L.) Gaertner., CDK 2321, Akd.
- Cirsium vulgare* (Savi.) Ten., CDK 2123
- Cirsium creticum* subsp.*creticum* (Lam)d'Urv., CDK 2414, D.Akd.
- Cirsium sipyleum* O. Schwarz. **Endemik**, CDK 3039, D.Akd.
- Picnemon acarna* (L.) Cass., CDK 2983, Akd.
- Notobasis syriaca* (L) Cass., CDK 2037, D.Akd.
- Carduus pycnocephalus* subsp.*albidus* (Bieb.) Kazmi., CDK 1042
- Jurinea consanguinea* DC., CDK 1632
- Jurinea mollis* (L.) Reichb., CDK 2417
- Centaurea polyclada* DC. **Endemik**, CDK 1561, D.Akd.
- Centaurea cyanus* L., CDK 3053
- Centaurea spinosa* var.*spinosa* Boiss., CDK 2427, D.Akd.
- Centaurea solstitialis* var.*solstitialis* L., CDK 2235
- Centaurea iberica* Trev. ex Sprengel., CDK 3100
- Centaurea urvillei* subsp. *urvillei* DC., CDK 1186, D.Akd.
- Centaurea sipylea* Wagenitz., **Endemik**, CDK 3033, D.Akd.

*Crupina crupinastrum* (Moris.) Vis., CDK 3178  
*Cnicus benedictus* var. *benedictus* L., CDK 3050  
*Cnicus benedictus* var. *kotschyi* Boiss., CDK 2429  
*Carthamus lanatus* L., CDK 3196  
*Carthamus dentatus* Vahl., CDK 1006  
*Cardopatum corymbosum* (L.) Pers., CDK 1228, D.Akd.  
*Atractilis gummifera* L., CDK 2122, Akd.  
*Xeranthemum annuum* L., CDK 3006  
*Echinops ritro* L., CDK 2822  
*Echinops viscosus* subsp. *bithynicus* (Boiss.) Rech. Fill., CDK 2045  
*Scolymus hispanicus* L., CDK 2121, Akd.  
*Tolpis barbata* (L.) Gaertner., CDK 1865, Akd.  
*Scorzonera laciniata* subsp. *laciniata* L., CDK 1490  
*Tragopogon longirostris* var. *longirostris* Bisch. ex Schultz Bip., CDK 3265  
*Geropogon hybridus* (L.) Schultz Bip., CDK 1013, Akd.  
*Hypochoeris glabra* L., CDK 2524  
*Leontodon cichoraceus* (Ten.) Sanguinetti., CDK 1601, Akd.  
*Leontodon tuberosus* L., CDK 1631, Akd.  
*Picris altissima* Delile., CDK 3011, Akd.  
*Helminthotheca echinoides* (L.) Holub., CDK 2345  
*Urospermum picroides* (L.) F.W. Schmidt., CDK 2517, Akd.  
*Hedypnois cretica* (L.) Dum-Cours., CDK 1329, Akd.  
*Rhagadiolus stellatus* var. *edulis* (Gaertner.) DC., CDK 2422, Akd.  
*Sonchus asper* subsp. *glaucescens* (Jordan) Ball., CDK 1862, Akd.  
*Sonchus oleraceus* L., CDK 1043  
*Aethorhiza bulbosa* subsp. *microcephala* Rech. fil., CDK 1582, D.Akd.  
*Lactuca saligna* L., CDK 2984  
*Lactuca seriola* L., CDK 2347, Av-Sib.

- Scariola viminea (L.) F.W. Schmidt., CDK 1074
- Lapsana communis subsp.adenophora (Boiss) Rech. Fil., CDK 1130
- Taraxacum serotinum (Waldst et Kit.) Poir., CDK 2323
- Taraxacum hybernum Stev., CDK 2601
- Chondrilla juncea var.juncea L., CDK 2426
- Crepis reuterana subsp.reuterana Boiss., CDK 1224, D.Akd.
- Crepis pulchra subsp.pulchra L., CDK 1102
- Crepis foetida subsp.rhoedifolia (Bieb.) Celak., CDK 2546
- Crepis foetida subsp.commutata (Speng) Babcock., CDK 1847
- Crepis sancta (L.) Babcock., CDK 1489
- Crepis multiflora Sm, CDK 2131, D.Akd.
- Crepis zacintha (L.) Babcock., CDK 3150, D.Akd.

#### **CAMPANULACEAE**

- Campanula lyrata subsp.lyrata Lam, **Endemik** , CDK 1328
- Campanula macrostachya Waldst& Kit., CDK 3212
- Legousia speculum-veneris (L.) Chaix , CDK 2317, Akd.
- Legousia pentagonia (L.) Thellung , CDK 2440, D.Akd.

#### **ERICACEAE**

- Erica manipuliflora Salisb. ., CDK 2082, D.Akd.
- Arbutus unedo L., CDK 3101
- Arbutus andrachne L., CDK 2055

#### **LENTIBULARICAE**

- Utricularia australis R.Br., CDK 1440

#### **PRIMULACEAE**

*Androsace maxima* L. , CDK 2090

*Cyclamen hederifolium* Aiton., CDK 2070

*Lysimachia atropurpurea* L., CDK 2780, D.Akd.

*Lysimachia linum-stellatum* L., CDK 2877, Akd.

*Anagallis arvensis* var.*arvensis* L., CDK 1003

*Anagallis arvensis* var.*caerulea* L., CDK 1315

*Samolus valerandi* L., CDK 1491

### **OLEACEAE**

*Jasminum fruticans* L., CDK 2000, Akd.

*Fontanesia phylliraeoides* subsp.*phylliraeoides* Labill., CDK 2310, D.Akd.

*Fraxinus ornus* spp.*cilicica* L., CDK 2065, D.Akd.

*Olea europaea* var.*sylvestris* L., CDK 2012, Akd.

*Phyllyrea latifolia* L., CDK 1007, Akd.

### **APOCYNACEAE**

*Nerium oleander* L., CDK 1008, Akd.

### **ASCLEPIADACEAE**

*Cynanchum acutum* subsp.*acutum* L., CDK 3013

*Vincetoxicum canescens* subsp. *pedunculata* (Willd) Decne in DC. **Endemik.**, CDK 1260, D.Akd.

*Cionura erecta* (L.) Griseb., CDK 1801, D.Akd.

### **GENTIANACEAE**

*Blackstonia perforata* subsp.*perfoliata* (L.) Hudson, CDK 1923

*Centaurium erythraea* subsp.*erythraea* Rafn., CDK 3198, Av-Sib.

*Centaurium pulchellum* (Swartz) Druce., CDK 2411

*Centaurium teuniflorum* subsp.*teuniflorum* (Hoffmanns. & Link) Fritsch in Mitt., CDK 2430

*Centaurium maritimum* (L.) Fritsch in Mitt., CDK 1680, Akd.

### **CONVOLVULACEAE**

*Convolvulus dorycnium* subsp.*dorycnium* L., CDK 1438, Akd.

*Convolvulus cantabrica* L., CDK 1011

*Convolvulus pentapetaloides* L., CDK 1251, Akd.

*Convolvulus arvensis* L., CDK 2319

*Convolvulus elegantissimus* Miller., CDK 2110, Akd.

*Convolvulus betonicifolius* subsp.*betonicifolius* Miller., CDK 2701

*Calistegia sepium* subsp.*sepium* (L.) Br., CDK 2982

### **CUSCUTACEAE**

*Cuscuta campestris* Yunker in Mem, CDK 2898

*Cuscuta approximata* var. *macranthera* Babington., CDK 3003, Akd.

*Cuscuta planiflora* Ten., CDK 3267

### **BORAGINACEAE**

*Heliotropium hirsutissimum* Grauer. , CDK 1084, D.Akd.

*Heliotropium suaveolens* Bieb., CDK 1255, D.Akd.

*Myosotis ramosissima* subsp.*ramosissima* Rochel ex Schultes., CDK 2441

*Myosotis arvensis* subsp.*arvensis* (L.) Hill., CDK 1242, Av-Sib.

*Cynoglossum creticum* Miller., CDK 3230

*Neatostema apulum* (L.) Johnston in J. Arn., CDK 3150, Akd.

*Echium italicum* L., CDK 1009, Akd.

*Echium plantagineum* L., CDK 1465, Akd.

*Echium angustifolium* Miller., CDK 1302, D.Akd.

*Onosma heterophyllum* Griseb., CDK 3151, Av-Sib.

*Onosma aucheranum* DC., CDK 2431, D.Akd.

*Cerithe minor* subsp.*auriculata* (Ten) Domac in Bot., CDK 2863, Av-Sib

*Symphytum anatolicum* Boiss., **Endemik**, CDK 2909, D.Akd.

*Anchusa undulata* subsp.*hybrida* L., CDK 2237, Akd.

*Anchusa azurea* var.*azurea* Miller., CDK 1979

*Nonea obtusifolia* (Willd.) DC., CDK 1410, D.Akd.

*Alkanna tubulosa* Boiss., **Endemik**, CDK 1243, D.Akd.

*Alkanna tinctoria* subsp.*tinctoria* (L.) L., CDK 2318, Akd.

### **SOLANACEAE**

*Solanum nigrum* subsp.*nigrum* L., CDK 3231

*Solanum nigrum* subsp.*schultessii*(Opiz) Wessely in Feddes., 1134

*Solanum alatum* Moench., CDK 3152

*Datura stramonium* L., CDK 1327

*Hyoscyamus albus* L., CDK 2908, Akd.

### **SCROPHULARIACEAE**

*Verbascum napifolium* Boiss **Endemik** , CDK 2352, D.Akd.

*Verbascum parviflorum* Lam **Endemik**, CDK 2350, D.Akd.

*Verbascum sinuatum* var.*sinuatum* L., CDK 3153, Akd.

*Verbascum lydium* var *lydium* Boiss., **Endemik**, CDK 1231, D.Akd.

*Verbascum antinori* Boiss. & Heldr. in Boiss., **Endemik**, CDK 1705, D.Akd.

*Verbascum glomeratum* Boiss., CDK 1437, Ir-Tur.

*Verbascum lasianthum* Boiss. ex Bentham in DC., CDK 1015

*Scrophularia peregrina* L., CDK 1466

*Scrophularia scopolii* var.*smyrnaea* (Boiss.) Boiss., **Endemik** , CDK 2890, D.Akd.

*Scrophularia libatonica* var.*mesogitana* (Boiss) Mill., **Endemik**, CDK 2771, D.Akd.

*Scrophularia canina* subsp.*bicolor* L., CDK 3236, D.Akd.

- Scrophularia floribunda* Boiss & Bal. in Boiss., **Endemik**, CDK 3014, D.Akd.  
*Chaenorhium litorale* (Bernh) Fritsch., **Endemik**, CDK 2778, D.Akd.  
*Linaria simplex* (Willd.) DC. in Lam, CDK 2709, Akd.  
*Linaria pelisseriana* (L.) Miller., CDK 1602, Akd.  
*Kickxia elatine* subsp. *crinita* (L.) Dumort., CDK 1456  
*Veronica syriaca* Roemer & Schultes., CDK 1081, D.Akd.  
*Veronica arvensis* L., CDK 3154, Av-Sib.  
*Veronica triphyllos* L., CDK 1226  
*Veronica cymbalaria* Bodard., CDK 3232, Akd.  
*Veronica trichadena* Jordan & Fourr., CDK 1719, Akd.  
*Veronica triloba* (Opiz.) Kerner., CDK 2918  
*Veronica hederifolia* L., CDK 1244  
*Veronica anagallis-aquatica* L., CDK 2518  
*Veronica jacquinii* Baumg., CDK 1411, Av-Sib.  
*Veronica pectinata* var. *glandulosa* Riek. Ex MA. Fischer., CDK 2302  
*Parantucellia viscosa* (L.) Caruel in Parl., CDK 1031, Akd.  
*Parantucellia latifolia* subsp. *latifolia* (L.) Caruel in Parl., CDK 1234, Akd.  
*Bellardia trixago* (L.) All., CDK 3004

#### **OROBANCHACEAE**

- Orobanche ramosa* L., CDK 2432  
*Orobanche mutelii* F. Schultz in Mutel., CDK 2351  
*Orobanche aegyptica* Pers., CDK 2433  
*Orobanche minor* Sm, CDK 3233  
*Orobanche schultzei* Mutel., CDK 1245, Akd.  
*Orobanche heldreichii* (Reuter) G. Beck., CDK 2710, Ir-Tur.  
*Orobanche cilicica* G. Beck., CDK 3155  
*Orobanche picridis* F.W. Schultz ex W. Koch in Röhling., CDK 2354, Akd.



**VERBENACEAE**

*Verbena officinalis* L., CDK 1330

*Vitex agnus castus* L., CDK 1016, Akd.

**LABIATAE**

*Ajuga chamaepitys* subsp.chia (Schreber.) Arcangeli., CDK 3005

*Teucrium chamaedrys* subsp.chamaedrys L., CDK 2412, Av-Sib.

*Teucrium divaricatum* subsp.divaricatum Sieber., CDK 2870, D.Akd.

*Lavandula stoechas* subsp.stoechas L., CDK 1758, Akd.

*Prasium majus* L., CDK 2435, Akd.

*Phlomis pungens* var.hispida Hub-Mor., CDK 1596

*Phlomis nissolii* L., **Endemik**, CDK 1371

*Lamium amplexicaule* L., CDK 1248, Av-Sib.

*Lamium moschatum* var.moschatum Miller., CDK 1718, D.Akd.

*Lamium moschatum* var.micranthum Boiss., CDK 3006, D.Akd.

*Ballota acetobulosa* (L.) Bentham, CDK 1095, D.Akd.

*Ballota nigra* subsp.uncinata (Fiori.& Bég.) Patzak., CDK 1229, Akd.

*Marrubium vulgare* L., CDK 1986

*Marrubium peregrinum* L., CDK 2013

*Sideritis montana* subsp.remota(d'URV) P.W. Ball ex Heywood., CDK 2902, D.Akd.

*Sideritis sipylea* Boiss., **Endemik**, CDK 2780, D.Akd.

*Stachys cretica* subsp.smyrnaea Rech., **Endemik**, 2243, D.Akd.

*Melissa officinalis* subsp.altissima (Sm) Arcangeli., CDK 1597, D.Akd.

*Nepeta italica* L., CDK 3234

*Prunella vulgaris* L., CDK 1246, Av-Sib.

*Prunella laciniata* (L.) L., CDK 2351, Av-Sib.

*Origanum sipyleum* L., **Endemik**, CDK 2915, D.Akd.

*Origanum onites* L., CDK 1017, D.Akd.

- Satureja thymbra L., CDK 1457, D.Akd.
- Satureja cuneifolia Ten., CDK 1413, Akd.
- Satureja parnassica subsp.sipylea P.H.Davis., **Endemik**, CDK 2783, D.Akd.
- Calamintha nepeta (L.) Savi., CDK 1402
- Acinos rotundifolius Pers., CDK 1598
- Micromeria myrtifolia Boiss&Hohen in Boiss., CDK 2434, D.Akd.
- Micromeria juliana (L.) Bentham ex Reichb., CDK 2111, Akd.
- Micromeria graeca subsp.graeca (L.) Bentham ex Reichb., CDK 1401, Akd.
- Thymus zygioides var.zygioides Griseb., **Endemik**, CDK 1756, D.Akd.
- Thymus zygioides var.lycaonicus (Celak.) Ronniger. **Endemik**, CDK 2041, D.Akd.
- Thymus sipyleus subsp.sipyleus Boiss. **Endemik**, CDK 2781
- Thymus siypleus subsp. rosulans Boiss., CDK 2782
- Coridothymus capitatus (L.) Reichb., CDK 1978, Akd.
- Thymbra spicata var.spicata L., CDK 1372, D.Akd.
- Mentha pulegium L., CDK 1458
- Mentha aquatica L., CDK 1199
- Mentha suaveolens Ehrh., CDK 2244
- Mentha spicata subsp.tomentosa L.,, CDK 2117
- Ziziphora taurica subsp.taurica Bieb., CDK 3140, Ir-Tur.
- Ziziphora taurica subsp.cleonioides (Boiss) Davis .,**Endemik**, CDK 1235, D.Akd.
- Ziziphora capitata L., CDK 3213, Ir-Tur.
- Salvia fruticosa Miller., CDK 2436, D.Akd.
- Salvia tomentosa Miller., CDK 1804
- Salvia argentea L., CDK 1326, Akd.
- Salvia virgata Jacq., CDK 2105, Ir-Tur.
- Salvia viridis L., CDK 1019, Akd.

## **PLUMBAGINACEAE**

*Plumbago europaea* L., CDK 1717, Av-Sib.

*Limonium sinuatum* L., CDK 2840, Akd.

*Limonium virgatum* (Willd.) Four. in Ann., CDK 1792, Akd.

*Limonium graecum* var. *graecum* (Poiret.) Rech in fil., CDK 2846, D.Akd.

*Goniolimon collinum* (Griseb.) Boiss., CDK 2917, D.Akd.

### **PLANTAGINACEAE**

*Plantago major* subsp. *intermedia* (Gilib.) Lange., CDK 1249

*Plantago coronopus* subsp. *commutata* (Guss.) Pilger., CDK 2106, D.Akd.

*Plantago lanceolata* L., CDK 1018

*Plantago scabra* Moench., CDK 1224

*Plantago cretica* L., CDK 3156, D.Akd.

*Plantago bellardii* All., CDK 2141, D.Akd.

*Plantago afra* L., CDK 2145

### **THYMELAECEAE**

*Thymelaea passerina* (L.) Coss & Germ., CDK 3235

### **ELEAGNACEAE**

*Elaeagnus angustifolia* L., CDK 2040

### **LAURACEAE**

*Laurus nobilis* L., CDK 3031, Akd.

### **SANTALACEAE**

*Thesium divaricatum* Jan. Ex .Mert., CDK 2909, D.Akd.

*Thesium bergeri* Zucc., CDK 1414, D.Akd.

*Osyris alba* L., CDK 2404, Akd.

**LORANTHACEAE**

*Viscum album* subsp.*album* L., CDK 3015

**RAFFLESACEAE**

*Cytinus hypocystis* subsp.*orientalis* Wettst., CDK 3157, Akd.

*Cytibus hypocystis* subsp.*kermesinus* (Guss.) Wettst., CDK 3052, Akd.

**ARISTOLOCHACEAE**

*Aristolochia hirta* L. **Endemik** , CDK 2091, D.Akd.

**EUPHORBIACEAE**

*Chrozophora tinctoria* (L.) Rafin., CDK 3102

*Mercurialis annua* L., CDK 1072

*Euphorbia peplus* L., CDK 3159, Akd.

*Euphorbia chamaesyce* L., CDK 3103

*Euphorbia cardiophylla* Boiss&Heldr in Boiss., **Endemik**, CDK 3262

*Euphorbia palustris* L., CDK 2313, Av-Sib.

*Euphorbia stricta* L., CDK 1250, Av-Sib.

*Euphorbia helioscopia* L., CDK 1020

*Euphorbia aleppica* L., CDK 2437

*Euphorbia exigua* var.*exigua* L., CDK 1519

*Euphorbia platyphyllos* L., CDK 1416

*Euphorbia falcata* subsp.*falcata* L., CDK 1934

*Euphorbia falcata macrostegia* (Bornm)O. Schwartz, **Endemik**, CDK 1614, D.Akd.

*Euphorbia rigida* Bieb., CDK 2092

*Euphorbia kotschyana* Fenzl., CDK 2889, D.Akd.

*Euphorbia paralias* L., CDK 2311, Akd.

**URTICACEAE**

*Urtica pilulifera* L., CDK 2408, Akd.

*Urtica urens* L., CDK 2711

*Urtica dioica* L., CDK 2714, Av-Sib.

*Parietaria judaica* L., CDK 2442

**ULMACEAE**

*Ulmus minor* subsp. *minor* Miller., CDK 3014

**MORACEAE**

*Morus alba* L., CDK 1415

*Ficus carica* subsp. *carica* L., CDK 3158

**JUGLANDACEAE**

*Juglans regia* L., CDK 3228

**PLATANACEAE**

*Platanus orientalis* L., CDK 1996

**FAGACEAE**

*Quercus infectoria* subsp. *Boissieri*, (Reuter) O. Schwarz in Feddes., CDK 2612

*Quercus pubescens* Willd., CDK 2651

*Quercus cerris* var. *cerris* L., CDK 1373

*Quercus trojana* P.B. Webb in Loudon., CDK 1253 , D.Akd.

*Quercus coccifera* L., CDK 1165, Akd.

*Quercus ithaburensis* subsp. *macrolepis* (Kotschy) Hedge & Yaltirik, CDK 1113, D.Akd.

**SALICACEAE**

*Salix alba* L., CDK 1987, Av-Sib.

*Salix triandra* L., CDK 2533, Ir-Tur.

*Salix excelsa* L., CDK 1435, Ir-Tur.

*Populus alba* L., CDK 1021, Av-Sib.

### **CERATOPHYLLACEAE**

*Ceratophyllum demersum* L., CDK 2043, Av-Sib.

### **RUBIACEAE**

*Sherardia arvensis* L., CDK 1122, Akd.

*Crucianella angustifolia* L., CDK 3250, Akd.

*Crucianella imbricata* Boiss., CDK 2132, D.Akd.

*Crucianella bithynica* Boiss., CDK 2393

*Crucianella latifolia* L., CDK 1863, D.Akd.

*Asperula arvensis* L., CDK 1896, Akd.

*Gallium campanelliferum* Ehrend & Schönb.-Tem, **Endemik**, CDK 2056

*Galium spurium* subsp.spurium DC. In Lam& DC., CDK 1192

*Galium verum* subsp.verum L., CDK 1417, Av-Sib.

*Galium heldreichii* Hal., CDK 1251, D.Akd.

*Galium aperine* L., CDK 1126

*Galium tricornutum* Dandy., CDK 2888, Akd.

*Galium divaricatum* Pour. ex Lam, CDK 2112, Akd.

*Galium brevifolium* subsp.brevifolium Sm, **Endemik**, CDK 2902, D.Akd.

*Galium murale* (L.) All., CDK 1232, Akd.

*Valentia hispida* L., CDK 2438, Akd.

*Valentia muralis* L., CDK 1866, Akd.

*Rubai teunifolia* subsp.teunifolia d'Urv., CDK 2395, D.Akd.

*Rubai tinctorum* L., CDK 2601, Ir-Tur.

**MONOCOTYLEDONES****ALISMATACEAE**

*Sagittaria sagitifolia* L., CDK 1451

*Alisma laceolatum* With., CDK 1453

**POTAMOGETONACEAE**

*Potamogeton nodosus* Poiret in Lam, CDK 2133

*Potamogeton lucens* L., CDK 3070

*Potamogeton panormitanus* Biv., CDK 3075

*Potamogeton crispus* L., CDK 1452

*Potamogeton pectinatus* L., CDK 2134

**ARACEAE**

*Arum nickelii* Schott., CDK 1897, D.Akd.

*Dracunculus vulgaris* Schott in Schott&Endl., CDK 1023, D.Akd.

**LEMNACEAE**

*Spirodela polyrhiza* (L.) Schleiden., CDK 1454

*Lemna trisulca* L., CDK 2135

*Lemna gibba* L., CDK 3078

*Lemna minor* L., CDK 3204

**LILIACEAE**

*Smilax aspera* L., CDK 3061

*Ruscus aculeatus* var. *angustifolius* Boiss., CDK 1123

*Asparagus acutifolius* L., CDK 1042, Akd.

- Asphodelus aestivus* Brot., CDK 1869, Akd.  
*Allium cupani* Rafin., CDK 3032, Akd.  
*Allium sipyleum* Boiss., CDK 3037, D.Akd.  
*Allium ampeloprasum* L., CDK 3081, Akd.  
*Allium atroviolaceum* Boiss., CDK 1871  
*Allium proponticum* var. *proponticum* Stearn & Özhatay, **Endemik**, CDK 1235, D.Akd.  
*Allium amethystinum* Tausch., CDK 1674, Akd.  
*Allium guttatum* subsp. *sardom* (Moris) Stearn in Ann., CDK 1313, Akd.  
*Allium pallens* subsp. *pallens* L., CDK 3084, Akd.  
*Allium scordoprassum* subsp. *rotundum* (L.) Stearn., CDK 1520, Akd.  
*Allium nigrum* L., CDK 2603, Akd.  
*Scilla bifolia* L., CDK 1532, Akd.  
*Scilla hyacinthoides* L., CDK 1261, Akd.  
*Scilla autumnalis* L., CDK 2063, Akd.  
*Ornithogalum sphaerocarpum* Kerner in Öst., CDK 1867  
*Ornithogalum narbonense* L., CDK 1338, Akd.  
*Ornithogalum pyreanicum* L., CDK 1124  
*Ornithogalum montanum* Cyr. In Ten., CDK 3039, D.Akd.  
*Ornithogalum fimbriatum* Willd. In Ges., CDK 3037, D.Akd.  
*Ornithogalum umbellatum* L., CDK 2878  
*Ornithogalum nutans* L., CDK 1877, D.Akd.  
*Muscari comosum* (L.) Miller, CDK 1024, Akd.  
*Muscari neglectum* Guss., CDK 2604  
*Muscari parviflorum* Desf., CDK 1743, Akd.  
*Bellavalia trifoliata* (Ten) Kunth, CDK 1830, Akd.  
*Bellevalia dubia* (Guss) Roemer & Schultes., CDK 1339, Akd.  
*Tulipa orphanidae* Boiss. Ex Heldr., CDK 3035, D.Akd.  
*Tulipa clusiana* DC. in Redouté., CDK 1236



*Gagea graeca* (L.) Terracc in Mem, CDK 2136, D.Akd.

*Gagea chrysantha* (Jan) Schultes & Schultes., CDK 1138, Akd.

*Gagea peduncularis* (J.&C.Presl) Pascher, CDK 2439, Akd.

*Gagea villosa* var. *villosa* Pers., CDK 1139, Akd.

*Colchicum boissieri* Orph., CDK 2903, D.Akd.

*Colchicum triphyllum* G.Kunze., CDK 2890, Akd.

*Colchicum kotschyi* Boiss., CDK 2905, Ir-Tur.

*Colchicum variegatum* L., CDK 2911, D.Akd.

### **AMARYLLIDACEAE**

*Stenbergia lutea* (L.) Ker-Gawl. Ex Sprengel., CDK 1072

*Stenbergia sicula* Tineo ex Guss., CDK 1125, D.Akd.

*Stenbergia schubertii* Schenk, **Endemik**, CDK 2988

*Galanthus elwesii* Hooker., CDK 2906, D.Akd.

*Galanthus gracilis* Celak., CDK 2896, D.Akd.

### **IRIDACEAE**

*Iris pseudocorus* L., CDK 2534

*Iris suaveolens* Boiss & Reuter in Boiss., CDK 1988, D.Akd.

*Gynandrisis sisyrrinchium* (L.) Parl., CDK 1115

*Crocus fleischeri* Gay in Bull., **Endemik**, CDK 1117, D.Akd.

*Crocus chrysanthus* (Herbert) Herbert., CDK 2898

*Crocus flavus* subsp. *flavus* L., CDK 2605, Av-Sib.

*Crocus pulchellus* Herbert in Bot., CDK 2871, D.Akd.

*Romulea bulbocodium* var. *bulbocodium* L., CDK 1872, D.Akd.

*Romulea linaresii* Parl., *gladiolus italicus* Miller., CDK 1264, D.Akd.

*Gladiolus illyricus* W.Kosch., CDK 1342, Akd.

**ORCIDACEAE**

- Cephalentera longifolia* (L.) Fritsch in Öst., CDK 2893, Av-Sib.
- Epipactis helleborine* (L.) Crantz., CDK 1263
- Epipactis microphyla* (ehrh.) Swartz
- Spiranthes spiralis* (L.) Chevall., CDK 3036, Av-Sib.
- Ophrys vernixia* subsp. *vernixia* Brot., CDK 1043, Akd.
- Ophrys fusca* Link in Schrader., CDK 2103, Akd.
- Ophrys lutea* subsp. *minor* Cav., CDK 1870, Akd.
- Ophrys mammosa* Desf., CDK 2220, D.Akd.
- Ophrys reinholdii* subsp. *reinholdii*. Spruner ex. Boiss., CDK 1673, D.Akd.
- Ophrys holoserica* subsp. *holoserica* Burm, CDK 2356, Akd.
- Ophrys oestifera* subsp. *oestifera* Steven in Bieb., CDK 2364
- Ophrys apifera* Hudson., CDK 2503
- Ophrys bomyliflora* Link., CDK 1615, Akd.
- Aceras anthropophorum* (L.) Aiton., CDK 1915
- Anacamptis pyramidalis* (L.) L:C:M: Richard., CDK 1879
- Comperia comperiana* (Steven) Aschers & Graebn., CDK 1926, Ir-Tur.
- Orchis sancta* L., CDK 1025, D.Akd.
- Orchis tridentata* Scop., CDK 1340, Akd.
- Orchis purpurea* Hudson., CDK 2358, Av-Sib.
- Orchis simia* Lam, CDK 1268, Akd.
- Orchis italica* Poiret, CDK 2223, Akd.
- Orchis papilionaceae* var. *papilionaceae* L., CDK 2879
- Orchis collina* Banks & Sol., CDK 1922, Akd.
- Orchis anatolica* Boiss., CDK 1126, D.Akd.
- Orchis provincialis* Balbis ex DC. in Lam & DC. CDK 1936, Akd.
- Orchis laxiflora* Lam, CDK 2607, Akd.

**DIOSCOREACEAE**

*Tamus communis* subsp. *cretica* L., CDK 1026

**TYPHACEAE**

*Typha latifolia* L., CDK 1989

*Typha domingensis* Pers., CDK 2365

**JUNCACEAE**

*Juncus acutus* L., CDK 2930

*Juncus heldreichianus* subsp. *Heldreichianus* Marsson ex Parl., CDK 2238, D.Akd.

*Juncus maritimus* Lam, CDK 2225

*Juncus subulatus* Forsskal., CDK 2503, Akd.

*Juncus inflexus* L., CDK 1873

*Juncus gerardi* subsp. *gerardi* L., CDK 2932

*Juncus bufonius* L., CDK 2937

*Juncus hybridus* Brot., CDK 1439

*Luzula forsteri* (Sm) DC., CDK 2891, Av-Sib.

*Luzula nodulosa* Bory &Chaub., CDK 2894, Akd.

**CYPERACEAE**

*Cyperus longus* L., CDK 2535

*Cyperus rotundus* L., CDK 2581

*Cyperus fuscus* L., CDK 2742, Av-Sib.

*Cyperus capitatus* Vandelli., CDK 1916

*Fimbristylis bisumbellata* (Forsskal) Bubani., CDK 2194

*Eleocharis mitracarpa* Steudel., CDK 2537

*Eleocharis palustris* (L.) Roemer &Schultes., CDK 2583

*Schoenoplectus lacustris* subsp. *lacustris* L., CDK 2582

- Schoenoplectus litoralis (Schroder) Palla in Bot., CDK 2544
- Bolboschoenus maritimus var.maritimus L., CDK 2328
- Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak., CDK 2611
- Schoenus nigricans L., CDK 2192
- Carex distachya var.distachya Desf., **Endemik**, CDK 2405, Akd.
- Carex otrubae Podp., CDK 2536, Av-Sib.
- Carex divulsa subsp. coriogyne (Nelmes) Ö. Nilson, **Endemik**, CDK 3038, D.Akd.
- Carex muricata L., CDK 1522
- Carex divisia Hudson., CDK 2196, Av-Sib.
- Carex melanostachya Bieb. ex Willd., CDK 2587
- Carex riparia Curtis., CDK 2539, Av-Sib.
- Carex pendula Hudson., CDK 2197, Av-Sib.
- Carex flacca var.serrulata (Biv.) Greuter., CDK 2954, Akd.
- Carex distans L., CDK 2614, Av-Sib.
- Carex extensa Good., CDK 2547

### **GRAMINEAE**

- Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv., CDK 1128, Av-Sib.
- Trachynia distachya (L.) Link., CDK 1885, Akd.
- Elymus panormitanus (Parl.) Tzvelev in Sched., CDK 2765
- Aegilops umbellulata Zhutovsky in Trudy., CDK 1622, Ir-Tur.
- Aegilops triuncialis subsp.triuncialis L., CDK 1918
- Aegilops biuncialis Vis., CDK 2381
- Aegilops columnaris Zhukovsky in Trudy., CDK 1374, Ir-Tur.
- Triticum baeoticum subsp.baeoticum Boiss., CDK 1526
- Triticum aestivum L., CDK 2615
- Dasypyrum villosum (L.) Cand., CDK 1267, Akd.
- Hordeum marinum var.marinum Hudson., CDK 2933, Av-Sib.

- Hordeum murinum* subsp.*glaucum* (Steudel) Tzvelev., CDK 2935  
*Hordeum murinum* subsp.*leporinum* (Link) Arc., CDK 1029  
*Hordeum bulbosum* L., CDK 1343  
*Hordeum spontaneum* C. Koch in Linnaea., CDK 3214, Ir-Tur.  
*Taeniatherum caput-medusae* subsp. *crinitum* (Schreber) Melderis., CDK 2638, Ir-Tur.  
*Bromus hordeaceus* subsp.*hordeaceus* L., CDK 2766  
*Bromus squarrosus* L., CDK 1874  
*Bromus scoparius* L. CDK 2357  
*Bromus tectorum* L., CDK 1121  
*Bromus sterilis* L., CDK 2224  
*Bromus madritensis* L., CDK 1210  
*Bromus diandrus* Roth., CDK 1269  
*Bromus rubens* L., CDK 3216  
*Bromus rigidus* Roth., CDK 1027  
*Bromus sipyleus* Boiss **Endemik**, CDK 3040, , D.Akd.  
*Avena eriantha* Duriew in Ducharte., CDK 1213  
*Avena clauda* Duriew in Ducharte., CDK 1523, Akd.  
*Avena barbata* subsp.*barbata* Pott ex Link., CDK 1219, Akd.  
*Avena wiestii* Steudel., CDK 2938  
*Avena sterilis* subsp. *ludoviciana* L., CDK 2617  
*Rostraira cristata* (L.) Tzvelev., CDK 1350  
*Aira caryophyllea* L., CDK 1917, Av-Sib.  
*Aira elegantissima* subsp.*elegantissima* Schur., CDK 1671, Akd.  
*Holcus lanatus* L., CDK 1881, Av-Sib.  
*Holcus annuus* Salem ex. C.A.Meyer., CDK 3215, Akd.  
*Calamagrostis pseudophragmites* (Haller fil.) Koeler ., CDK 2382, Av-Sib.  
*Ammophila arenaria* (L.) Link., CDK 2963, Akd.  
*Apera intermedia* Hackel apud Zerderbauer., CDK 3042, Ir-Tur.

*Agrostis stolonifera* L., CDK 1127, Av-Sib.  
*Polypogon viridis* (Gouan) Breistr., CDK 1345, Av-Sib.  
*Polypogon maritimus* subsp. *maritimus* Willd., CDK 3017, Av-Sib.  
*Polypogon monspeliensis* (L.) Desf., CDK 2939  
*Lagurus ovatus* L., CDK 1894, Akd.  
*Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz & Thell., CDK 2951, Akd.  
*Milium vernale* Bleb., CDK 2227, Akd.  
*Phalaris canariensis* L., CDK 1030, Akd.  
*Phalaris aquatica* L., CDK 2960  
*Anthoxanthum odoratum* subsp. *odoratum* L., CDK 2618, Av-Sib.  
*Cornucopiae cucullatum* L., CDK 3207, D.Akd.  
*Alopecurus arundinaceus* Poiret., CDK 2955, Av-Sib.  
*Alopecurus setarioides* Gren., CDK 2443, D.Akd.  
*Phleum pratense* L., CDK 2502, Av-Sib.  
*Phleum subulatum* subsp. *subulatum* (Savi) Aschers & Graebn., CDK 1214  
*Phleum subulatum* subsp. *ciliatum* (Boiss) C.J. Humphries., CDK 1317, D.Akd.  
*Phleum exaratum* subsp. *exaratum* Boiss & Heldr. Ex Boiss., CDK 3043  
*Festuca valesiaca* Schleicher ex Gaudin., CDK 1165  
*Festuca sipylea* (Hackel) Markgr. - Dannenb., CDK 3033, D.Akd.  
*Lolium perenne* L., CDK 2623  
*Lolium multiflorum* Lam., CDK 1355  
*Lolium temulentum* var. *temulentum* L., CDK 2228  
*Lolium rigidum* var. *rigidum* Gaudin., CDK 1349  
*Vulpia muralis* (Kunth) Nees., CDK 2361, Akd.  
*Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmelin., CDK 1215  
*Vulpia unilateralis* (L.) Stace., CDK 3120  
*Vulpia ciliata* subsp. *ciliata* Dumort., CDK 2957  
*Catapodium maritimum* subsp. *rigidum* L., CDK 2195

*Psilurus incurvus* (Gouan) Schiz & Thell., CDK 3045  
*Poa annua* L., CDK 1527  
*Poa pratensis* L., CDK 1031  
*Poa angustifolia* L., CDK 2057  
*Poa diversifolia* (Boiss&Bal) Hackel ex Boiss., CDK 2619, D.Akd.  
*Poa nemoralis* L., CDK 3217  
*Poa trivialis* L., CDK 1882  
*Poa bulbosa* L., CDK 2504  
*Catabrosa aquatica* (L.) P. Beauv., CDK 2574  
*Puccinellia convoluta* (Horenm) P. Fuori., CDK 3016  
*Puccinella distans* subsp. *distans* L., CDK 1281  
*Dactylis glomerata* subsp. *glomerata* L., CDK 1919  
*Cynosurus echinatus* L., CDK 1529, Akd.  
*Cynosurus effusus* Link in Schrader., CDK 2956, Akd.  
*Lamarkia aurea* (L.) Moench., CDK 3018, Akd.  
*Briza maxima* L., CDK 1346  
*Briza humulis* Bieb., CDK 3219  
*Parapholis incurva* (L.) C.E., CDK 1129  
*Parapholis marginata* Runem, CDK 2226, D.Akd.  
*Parapholis pycnantha* (Hackel) C.E. Hubberd in Blumea., CDK 1217  
*Echinaria capitata* (L.) Desf., CDK 3047  
*Melica minuta* L., CDK 2359, Akd.  
*Glyceria plicata* (Fries) Fries., CDK 1316  
*Stipa bromoides* (L.) Dorfler., CDK 2625, Akd.  
*Stipa holosericea* Trin., CDK 1038  
*Piptatherum miliaceum* (L.) Cosson., CDK 2383  
*Piptatherum coerulescens* (Desf.) P. Beauv., CDK 2958  
*Piptatherum holciforme* subsp. *holciforme* var. *hociforme* Bieb., CDK 3019

*Arundo donax* L., CDK 2513  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. Ex Steudel., CDK 2245, Av-Sib.  
*Aeluropus littoralis* (Gouan) Parl., CDK 1886  
*Eragrostis cilianensis* (All.) Vign.- Lut ex Janchen., CDK 2362  
*Cynodon dactylon* (L.) Pers., CDK 1120  
*Crypsis alopecuroides* (Piller & Mitterp.) Schrader., CDK 2229  
*Crypsis schoenoides* (L.) Lam, CDK 1895  
*Crypsis faktorovskyi* Eig ib Zronist., CDK 1283  
*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., CDK 1318  
*Steria viridis* P.Beauv., CDK 1036  
*Imperata cylindrica* (L.) Roeschel., CDK 2629  
*Chrysopogon gryllus* subsp.gryllus (L.) Trin., CDK 1348  
*Sorghum halepense* var.halepense (L.) Pers., CDK 2705  
*Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf., CDK 1920  
*Phacelurus digitatus* (Sm) Griseb., CDK 1531, D.Akd.




## 4.2 Genel Vejetasyon Yapısı

Havza ekosistemleri dünya üzerinde biyoçeşitliliğin en yüksek olarak görüldüğü önemli doğal alanlarıdır. Örneğin Dünya Doğa Koruma Örgütü (WWF)'nin yaptığı açıklamalara göre, dünyada biyoçeşitlilik açısından en sıcak noktaların başında Amazon, Ganj, Nil, Limpopo gibi akarsu havzaları gelmektedir. Ülkemiz de sahip olduğu havzalar bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir.

Ancak ülkemizde bulunan bir çok akarsu/nehir havzaları ne yazık ki henüz tam olarak araştırılmamıştır. Bunun başlıca nedeni olarak dağ ekosistemlerinin çok daha fazla ön planda tutulması gösterilebilir. Bu alanlarda tatlı su ekosistemleri ve karasal ekosistemlerin bir arada bulunması, ortamda gerek hayvan ve gerek bitki olarak canlı çeşitliliğini artırmaktadır. Canlı çeşitliliğinin çok olması ve iki ayrı ekosisteminin aynı bölgede bulunması bu çalışmayı diğer çalışmalara göre daha cazip kılmaktadır. Ancak ülkemizde hem iş gücü hem de ekonomik nedenlerden dolayı bu tip çalışmalara şimdiye kadar gereken önem verilmemiştir. Ege Bölgesinin en büyük su kaynaklarından biri olan Gediz Nehri ve Havzası da bu bilimsel çalışmalar bakımından bakir alanlardan bir tanesidir. Bu yüzden daha önce yeterince yapılmamış olan Aşağı Gediz Havzası Vejetasyon Ekolojisi Projesi'nin amacı, şimdiye kadar çok az çalışılan bu bölgenin florasını gün ışığına çıkarmak, floranın yanında, alanda bulunan bitki birlikleri ortaya konularak daha ilerde yapılacak olan koruma çalışmaları ve tatlı su ekosistemi ıslah çalışmalarına ışık tutmak olacaktır..

Araştırma alanı, coğrafi konum, jeomorfolojik yapı ve iklimik koşullar altında gelişen çok çeşitli bitki birliklerinden oluşan bir vejetasyona sahiptir. Ayrıca bu çalışmanın bir havza çalışması olması nedeniyle hem karasal habitatların, hem de sucul habitatların araştırma alanının içinde yer alması hem florayı oluşturan türlerin sayısını hem de vejetasyonu oluşturan bitki topluluklarının çeşidini arttırmaktadır.

Aşağı Gediz Havzası yaklaşık doğu- batı istikametinde 150 km'yi, kuzey güney istikametinde ise bazı noktalarda daralıp bazı noktalarda genişlemesine karşılık ortalama olarak 10 km lik bir alanı kapsamaktadır. Bu bağlamda yuvarlak olarak bir hesaplama yapıldığı takdirde ortaya çalışma alanı olarak 1500 km<sup>2</sup> lik bir alan çıkmaktadır. Ancak bu rakam gerçek vejetasyon alanını ifade etmemektedir. Çünkü bu alanın yaklaşık ¾ tarım arazileri ile kaplı olup küçük bir bölümü ise sucul alan olarak karşımıza çıkmaktadır.



**Şekil 3:** Orta Ege'de Vegetasyon Katları

Aşağı Gediz Havzası Akdeniz katı vejetasyon yapısının en üst basamağında *Pinus brutia* ormanları yer almaktadır. Ancak bu çalışmada havza üst sınırı yaklaşık olarak 500 m olarak kabul edilmiş ve bu yükseklikten sonra bulunan bitki örtüsü değerlendirmeye alınmamıştır. Bu yüksekliğin seçilmesinin nedeni ise havzanın su toplama alanı yaklaşık bu yükseklikten itibaren başlamaktadır. Ayrıca, havzayı çevreleyen dağlık alanlar ile ilgili çok sayıda ve nitelikli çalışmalar bulunmamaktadır. ( bkz. girişte literatür özeti)

Bitki coğrafyası bakımından çalışma alanımız Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi'nin Ege Sektörünün Orta Ege Havalisinde yer almaktadır. (Regel, 1963; Davis 1965), Akman vd. (1979), Akman (1995) Kuzey ve Güney Ege Bölgelerimiz için vejetasyon kademelenmesi vermişlerse de; Orta Ege her ikisinden de önemli farklılıklar göstermektedir. Zira Kuzey Ege için önerilenler önemli oranda Avrupa – Sibiryaya vejetasyonu ile ilintili iken, Güney Ege daha çok

Toros Dağları'na yakındır. Bunda bir ölçüde Orta Ege'nin vejetasyon yapısının heterojen olması, aşırı tahrip görmesi, volkanik kayaların yaygınlığı nedeniyle kalsikol karakterli maki elemanlarının bulunmayışının etkisi vardır. Ancak, vejetasyon katlarının süksesyonda esas alınarak belirlendiği düşünülürse, Orta Ege için de bir kademelenme verme zorunluluğu doğmaktadır. (Şekil 3) Burada kastedilen Orta Ege İzmir ilinden başlayıp; başlıca içbatı Anadolu'da yer alan Çivril Akdağ ve Gediz Murat Dağı'na kadar olan kesimdir ki, buna Simav Akdağ ve Şaphane Dağları'nı da ilave etmek gerekir. Şekil 3'te bu kademelenme şematik olarak gösterilmiştir.

*Pinus brutia* ormanları genel olarak Yamanlar Dağı'nın Emiralem'e bakan kısımlarında, Manisa Dağı'nın kuzey yamaçlarında ve Turgutlu – Salipli arasında Bozdağ'ın Gediz Nehri'ne bakan kuzey yamaçlarında yoğun olarak bulunmaktadır. Bunun dışında havza içinde bir çok münferit alanda Orman bakanlığı tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile irili ufaklı *Pinus brutia* plantasyonları vardır. Bu plantasyonların en büyüğü ise, Akhisar yakınlarında bulunan Aytemiz Kulesi çevresinde bulunmaktadır. Ancak bu ağaçlandırma sahaları yapılan fitososyolojik araştırmalarda, doğal alanlar olmadıkları için dikkate alınmamıştır. Bu toplulukların lokaliteleri bitki örtüsü haritasında gösterilmiştir. Ve bu harita hazırlanırken özellikle çalışma alanında yer alan *Pinus spp.*, *Quercus ssp.* gibi odunsu türler ile çeşitli çalı türlerinin gösterilmesi amaçlanmıştır. (Harita 6)

Araştırma alanı içerisinde gözlenen ikinci önemli bitki grubu, *Quercus ithaburensis subsp. macrolepis* topluluklarıdır. Bu meşe türü, her ne kadar büyük ölçüde tahrip edilmiş ise de yine de araştırma alanı içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Çalışma alanında 50-500 m yükseklikde tespit edilen bu topluluklar genellikle eğimin az olduğu derin toprakları tercih etmektedir. Bu nedenle de bu alanlar yöre halkı tarafında açılarak tarım arazisine dönüştürülmüştür. Özellikle Emiralem'den başlayarak kuzeyde Yunt Dağı'na kadar devam eden ve doğuda Adala'ya kadar uzanan büyük bir topluluk oluşturmaktadır. Her ne kadar bu topluluk yer yer kesikliklere uğrasa da, Batı Anadolu'da gözlenen en iyi meşe ormanlarından birisidir. Bu toplulukta, *Quercus ithaburensis subsp. macrolepis* yer yer *Quercus pubescens*, *Quercus trojana*, *Quercus infectoria* ve *Quercus cerris* ile karışmaktadır. (Harita 6)

Aşağı Gediz Havzası'nın maki örtüsü ağırlıklı olarak, *Quercus coccifera* baskınlığına dayanmakta ve bu tür sıklıkla *Paliurus spina –christi* ile karışmaktadır. Ortam şartlarının daha iyi olduğu bölgelerde ise bu türler yerini *Olea europea*'ya bırakmaktadır. Bu topluluk ağırlıklı olarak, *Pinus brutia*'nın tahrip olduğu alanlarda gelişme göstermektedir. Bozdağ'ın Turgutlu'ya

bakan eteklerinde her iki topluluğun iç içe girdiği alanlar bu görüşü ispatlamaktadır. Bu toplulukta özellikle, Gediz Nehri'nin güney kısmında yer alırken ağırlıklı olarak Emiralem-Ayvacık çevresinde, Manisa Dağı'nın doğu yamaçlarında, Bozdağ'ın Turgutlu, Ahmetli ve Salihli'ye bakan eteklerinde görülmektedir. (Harita 5)

Araştırma alanında bir maki elemanı olan *Olea europea*'ya da çok sık olarak rastlanmaktadır. Alanda hem yabancı formu hem de kültür formu bulunan *Olea europaea* önemli bir yer tutmaktadır. *Olea europea var.sylvestris* özellikle maki elemanları arasında yer alırken, az miktarda frigana arasına da girmektedir. Frigana arasında bodur çalı halde görülen "*sylvestris*" varyetesi Menemen Helvacı Köy ve çevresinde, Foça tepelerinde topluluklar oluşturmaktadır. *Olea europaea*'nın Kültür formları ise çoğunlukla Akhisar – Saruhanlı hattında bulunmaktadır. Son yıllarda tütün tarımına da eski miktarda izin verilmediği için Havza içinde yer alan ve eğimi oldukça düşük arazilere de olea plantasyonları yapılmış ve yapılmaya da hızla devam edilmektedir. Bu da havza içinde bulunan *Olea europaea* topluluklarının artmasına sebep olmaktadır.

Havzada gözlenen frigana yapısı ise başta *Sarcopoterium spinosum* ve *Asphodelus aestivus* türlerinden oluşmaktadır. Maki örtüsünün tahrip edildiği, toprak örtüsünün ise zayıfladığı bölgelerde 500 m kadar olan kesimde *Sarcopoterium spinosum* baskın hale gelmektedir. Bu topluluk araştırma alanının batı kısmında yer almakla birlikte, Ayvacık boğazından denize doğru gidildikçe sıklaşmakta ve en yoğun olarak Menemen-Foça arasında yer alan fazla eğimli arazilerde görülmektedir. *Asphodelus aestivus* ise, *Sarcopoterium*'a göre daha derin topraklarda gelişim göstermekle birlikte bozuk meşeliklerin arasına da girerek, geniş bir alana yayılmaktadır.

Araştırma alanı içerisinde karasal ortamda çoğunlukla tuzlu bataklıklarda yer alan diğer önemli bitki toplulukları halofitik topluluklardır. Genel olarak havzanın batı kısmında yer alan tuz oranı yüksek alkali topraklar ile tuzlu bataklıklarda *Tamarix symrnensis* ve *Salicornia europaea* toplulukları yer almaktadır. *Tamarix symrnensis*, tuzlu topraklarda yetişen odunsu bir topluluk olup Gediz deltasının güney kısmında önemli bir alanı kaplamaktadır. Delta dışında diğer bölgelerde de bu bitki türü bulunmakla birlikte birlik oluşturmamaktadır. Örtü yüksekliği ortalama 2 metre olan bu topluluğun kapalılık değeri çok yüksek değildir. Tuzlu topraklarda yer alan ikinci topluluk ise *Salicornia europaea* topluluğudur. Bu topluluk içinde *Salicornia*'nın dışında, *Arthrocnemum fruticosum*, *Halocnemum strobilaceum*, *Salsola soda*, *Sueda maritima* ve daha bir çok tuz sever bitki olmasına karşılık genel olarak *Salicornia* topluluğu adı ile

tanımlanmaktadır. Bu toplulukta tuz oranı yüksek topraklarda ve bazı tuzlu bataklıklarda da yetişebilmektedir. Örtü değeri yüksek olan bu topluluk en yoğun şekilde Gediz Deltası'nın güney kısmında görülmektedir. (Harita 6)

Araştırma alanı içinde karasal ortamın dışında yer alan sucul ortamda da çeşitli bitki toplulukları görülmektedir. Bunların en önemlileri *Phragmites australis* ve *Ceratophyllum demersum* topluluklarıdır. *Phragmites australis* topluluğu su kenarlarında ve hatta su içerisinde yaşayan bir bitki grubu olup, en sık olarak Gediz Nehri kıyılarında yer almaktadır. Su kenarlarında çok yoğun olarak bulunan topluluk bazı yerlerde tarla kenarlarında ve taban suyu yüksek boş arazilerde de sazlık adı verilen homojen toplulukları meydana getirmektedir. Bu topluluğun boyu 2- 6 m arasında değişmektedir. Nehir kıyısı dışında nehir boyunca yer alan, Emiralem Regülatörü, Ahmetli Regülatörü, Gölmarmara kıyıları ve Gediz Deltası'nda da yoğun ve homejen topluluklar oluşturmaktadır. Su içerisinde yaşayan diğer bir topluluk ise, *Ceratophyllum demersum* topluluklarıdır. Bu bitkiler emers yani daimi olarak suyun altında yaşayan türler olup araştırma alanında özellikle Gölmarmara'da gözlenmektedir. Bu topluluğun suyun asiditesinin nötre yakın ve derinliği 50 cm geçmeyen sığ ve durgun tatlı sularda yaşadığı tespit edilmiştir.

Araştırma alanı içerisinde göze çarpan bir diğer grup ise bataklık topluluğudur. Bu toplulukta su kenarlarında bulunan daimi bataklıklarda gözlenmekle birlikte içinde yer alan türler, *Phragmites australis*, *Cyperus longus*, *Lycopus europaeus*, *Iris pseudocorus*, *Alisma lanceolatum*, *Bolboschoenus maritimus* var. *maritimus*, *Lythrium salicaria*, *Althaea officinalis*, *Potentilla reptans*, *Rumex palustris*, *Salix alba*, *Salix excelsa*'dır.

Halofitik, sucul ve bataklık gibi vejetasyon tipleri için yükselti sınırları vermek oldukça zordur. Zira bu topluluklar Anadolu'da kıyılardan başlayıp Anadolu platosuna değin çıkmaktadırlar.

Aşağı Gediz havzası Ege bölgesinin ve Türkiye'nin en önemli tarım alanlarından biri olduğu için yol çalışmaları çok eski dönemlerden başlayarak günümüze gelinceye kadar alanı adeta örümcek ağı gibi kaplamıştır. Bu nedenle de araştırma alanı içerisinde bulunan ruderal bitkiler de, kalitatif ve kantitatif olarak oldukça fazladır. Bunların en önemlileri ; *Centaurea solstitialis*, *Hypericum trisetiquitri-  
folium*, *Capparis ovata*, *Peganum harmala*, *convolvulus arvensis*, *Euphorbia rigida*, *Daucus carota*, *Erygium campestre*, *Glacium flavum*, *Malva*

*sylvestris*, *Xanthium strumarinum*, *Datura stramonides*, *Alcea pallida*, *Althea officinalis*, *Alcea rosea*, *Ononis spinosa*, *Ononis viscosa*, *Lotus corniculatus*, *Coronilla varia*, *Carthamus dentatus*, *Onopordum illyricum*, *Scolymus hispanicus*, *Carlina corymbosa*, *Picnemon acarna*, *Knautia integrifolia*, *Lactuca seriola*, *Senecio vernalis*, *Crepis sancta*, *Anchusa auzrea*, *Echium plantagineum*, *Alkanna tinctoria*, *Rubai tinctoria*, *Anemone coronaria*, *Papaver rhoeas*, *Papver dubium*, *Torillis arvensis*, *Allysium murale*, *Asphodelus aestivus*, *Sangisorbia ninor*, *Sinapis alba*, *Sisymbrium altissimum*, *Silene italica*, *Cardari draba*, *Raphanus raphistrum*, *Avea barbata*, *Hordeum bulbosum*, *Sylbium marianum* ve *Echium italicum*'dur.

Araştırma alanı içerisinde görülen tarım arazilerinde yetişen tek yıllık tarla yabancı otları; *Aegilops triuncialis*, *Agrostemma githago*, *Alopecurus myosurioides*, *Amaranthus retroflexus*, *Anagallis arvensis*, *Apera spica-venti*, *Avena fatua*, *Avena sterilis*, *Birza maxima*, *Bromus tectorum*, *Capsella bursa pastoris*, *Cardaria draba*, *Centaurea solstitialis*, *Ceratium arvense*, *Chenopodium album*, *Datura stramonium*, *Delphinium consolida*, *Digitaria sanguinalis*, *Echinaria capitata*, *Eragrostis ciliensis*, *Euphorbia helioscopia*, *Fumaria officinalis*, *Galium verum*, *Heliotropium europeum*, *Hordeum murinum*, *Isatis tinctoria*, *Lactuca seriola*, *Lamium amplexicaule*, *Lathyrus aphaca*, *Lolium rigididum*, *Lolium temulentum*, *Mellilotus indica.*, *Papaver rhoeas*, *Phalaris canariensis*, *Portulaca oleraceae*, *Ranunculus arvensis*, *Raphanus raphanistrum*, *Scandix pecten-veneris*, *Silene dichotoma*, *Sinapis alba*, *Sinapis arvensis*, *Steria viridis*, *Solanum nigrum*, *Tragopogon latifolius*, *Tribulus terrestris*, *Vaccaria pyramidata*, *Vicia cracca*, *Xanthium strumarium*'dır. İki ve çok yıllık tarla yabancı otlarının başında ise; *Agrostis stolonifera*, *Anthemis arvensis*, *Circium arvense* gelmektedir.

Bu çalışmada Aşağı Gediz Havzası'nın vejetasyon yapısı ve ekolojisi genel hatlarıyla ortaya konulması amaçlanmıştır. Ancak tüm arazi çalışmaları karadan yapılmış, belli noktalarda bir miktar kıyıda suya girilerek bitki örnekleri ve örnek alanlar alınmıştır. Ancak tamamen sucul bir çalışma yapılmamıştır. İleride bu tip bir çalışmada yapılması ile birlikte alanda yeni sucul bitki birliklerin tespit edilmesi de olasıdır.

**Bitki örtüsü haritası**

### 4.3. Vejetasyonu Oluşturan Toplulukların Fitososyolojik Yapısı

Çalışma alanında yapılan vejetasyon çalışmaları sonucunda 3 farklı formasyon tespit edilmiştir. Bu formasyonlar ve içerdikleri bitki birlikleri aşağıdaki gibidir.

1. Sucul ve bataklık vejetasyon
  - a. Ceratophylletum demersi (Hild 1947)
  - b. Pragmitetum communis (Schumale 1939)
  - c. Arthrocnemo- Halocnemetum strobilacei (Oberd 1957)
  - d. Tamaricetum symrnensi (Seçmen&Leblebici 1994)
2. Çalı vejetasyonu
  - a. Paliuro-Quercetum cocciferae (Çetin 2003)
  - b. Asphodelo- Sarcopoterietum spinosi ass.nova
3. Ağaç vejetasyon
  - a. Lino- Pinetum brutiae ass.nova
  - b. Phlomo- Quercetum macrolepi ass. nova

#### 4.3.1 Sucul ve Bataklık Vejetasyonu

##### 4.3.1.1 Ceratophylletum demersi (Hild 1947)Birliđi

*Ceratophyllum demersum*, suya yarı batık olarak yaşayan çok yıllık, köksüz otsulardır. Boyları 20-75 cm olup bazen 3 m ye kadar varabilmektedir. Yapraklar dairesel dizilişli ve dikotom parçalıdır. Çiçekleri tek eşeylidir. Ceratophyllaceae familyasının tek cinsi olan *Ceratophyllum*'un iki türü vardır. *C. demersum* türü, çoğunlukla alçak rakımlarda bulunan durgun tatlı sularda yaşam sürmektedir. Bu tür temmuz ile eylül ayları arasında bol bulunur. Ayrıca günümüzde akvaryumlarda süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir (Öztürk & Durmuşkahya 2002).

Bu birlik, alan büyüklüğü 4 m<sup>2</sup> olan 8 örnek alanda tespit edilmiştir. Alınan örnek alanların su derinliği 20 ile 100 cm arasında değişmekte ve suyun asiditesi (pH): 6,8- 7,5 arasındadır. Bu birliğe en fazla GölMarmara kıyılarında ve Kuş Cenneti'nde tatlı su sazlıklarında



bulunan durgun sularda rastlanmıştır. Gediz Nehri'nde belli bölgelerde *Ceratophyllum*'a rastlansa da bu birliğe rastlanmamıştır. (Tablo 5)

*Ceratophyllum demersi* birliği, iki tabakadan oluşmaktadır. Buna göre, birliğin ilk tabakası emers ve yüzücü bitkilerden oluşan ve su yüzeyinde bulunan bitki türlerinden oluşmaktadır. Bu tabakada en sık rastlanan türler, *Polygonium amphibium*, *Potamogeton pectinatus*, *Ranunculus sphaerospermus* ve *Lemna minor* olup örtü yüzdesi % 60-80 arasındadır. Ayrıca bu tabakanın su üstünde kalan kısmının yüksekliği 5-10 cm dir. Bu birliğin ikinci ve primer tabakası ise su altında yaşayan türlerden oluşmaktadır. Bu tabakayı temsil eden tür *Ceratophyllum demersum* olup, kapallığı % 50- 80 arasında değişmektedir. (Fotoğraf 1)

Bu birliğin karakteristik ve ayırt edici türü *Ceratophyllum demersum*'dur. Bu birlikte **Potametea** ordosu karakteristiklerinden olan, *Potamogeton pectinatus*, *Polygonium amphibium*, *Myriophyllum spicatum*,bulmaktadır. Ayrıca birliğe az sayıda **Phragmitetea** ve **Lemnetea** karakteristikleri de eşlik etmektedir.



**Fotoğraf 1** : Ceratophylletum birliğinden bir görünüm

**Tablo 5: Ceratophylletum demersi (Hild 1947 ) Birliđi**

ÖRNEK ALAN NO	11	12	87	88	89	90	121	123	B U L U N U Ş
ALANIN BÜYÜKLÜĞÜ (m <sup>2</sup> )	4	4	4	4	4	4	4	4	
SU DERİNLİĞİ (cm)	20	20	50	50	100	100	50	20	
ÖRTÜ	70	60	80	75	75	60	50	50	
<b>Karakteristik veya ayırt edici türler</b>									
Ceratophyllum demersum	33	33	34	44	44	33	33	22	8
<b>Potametea karakteristikleri</b>									
Potamogeton pectinatus	-	-	+1	11	+1	11	-	-	4
Polygonium amphibium	-	+1	-	22	22	12	-	-	4
Myriophyllum spicatum	-	-	-	+1	-	+1	-	-	2
<b>Phragmitetea karakteristikleri</b>									
Phragmites australis	-	+1	-	-	-	-	+1	+1	3
<b>Lemnetea karakteristikleri</b>									
Lemna minor	-	11	-	-	-	-	12	22	3
<b>Eşlik eden türler</b>									
Ranunculus sphaerospermus	22	-	12	11	-	-	22	21	5
Iris pseudocorus	-	-	+1	-	-	-	-	-	1

#### 4.3.1.2 *Phragmitetum communis* (Schmale 1939) Birliđi

*Phragmites australis* sulak alanlarda en sık rastlanan bitkilerden birisidir. Ülkemizde tek türü bulunan bu bitki hem tatlı su kenarlarında hem de tuzlu su kenarlarında, yetişebilmektedir. Bu bağlamda *phragmites* bitkisi hem dere ve göl kenarlarında, hem de deniz kenarlarında görülebilmektedir. (Fotoğraf 2)

Rizomlu ve çok yıllık olan bitki kozmopolit olup tüm bölgelerde yoğun topluluklar oluşturmaktadır. Kuvvetli ve bir hayli uzun olan gövdeleri çok nodyumludur. Yaprakları uzun ve geniş, kenarları düzdür. Çiçek durumu büyük bir panikula olup çok dallıdır. *Phragmites australis* türü genel olarak deniz seviyesinden başlayarak 2400 m ye kadar çıkabilmektedir. Avrupa – Sibirya elementi olan bu tür Avrasya'nın ılıman bölgelerinde büyük topluluklar oluşturmaktadır (Davis 1965).

*Phragmites*lerin özellikle nişasta bakımından zengin olan rizomları Kuzey Amerika'da yerliler tarafından besin olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ise böyle bir kullanıma rastlanılmazken, bu bitkiler yöre halkı tarafından sepet yapımı, gölgelik, çatı, sundurma yapımında ve belki de en önemlisi hasır yapımında kullanılmaktadır. Bu nedenle *phragmites* toplulukları sık sık kesilerek tahrip edilmektedir.

Bu birlik araştırma alanında; Gediz Nehri boyunca, su kıyılarında gözlenmekle birlikte, en saf toplulukları Gölarmara kıyılarında, Gediz Deltası'nda bulunan Rama Can Suyu projesine ait tatlı su pompasının bulunduğu sazlıklar mevkiinde ve Gediz Nehri'nin denize döküldüğü ağızda bulunmaktadır.

Yapılan fitososyolojik çalışmalara göre, alanda bu birliđi tespit etmek üzere 16 m<sup>2</sup> lik 15 örnek alan alınmıştır. Bu örnek alanların su derinliđi 0-100 cm arasında olup, birliđin örtü yüksekliđi ise 2,5- 4 m arasındadır. Bu birliđin kapalılık oranı % 75 ile 100 arasında olup, karakteristik türü *Phragmites australis* tir. (Tablo 6)

Bu birlik genel olarak iki tabakadan oluşmaktadır. Buna göre birliđin üst katı, suyun üzerinde bulunan ve ağırlıklı olarak *Phragmites australis*'ten oluşan tabaka olup, kapalılıđı %80 ila 100 arasındadır. Birliđin ikinci katı ise suyun yüzeyinde ve su içerisinde bulunan katı olup

bunlarda emers, submers ve yüzüycü yapraklı bitkilerden oluşmaktadır. Buna göre bu tabakada en sık görülen türler, emers bitkiler olan *Ceratophyllum demersum*, *Polygonium amphibium*, *Ranunculus sphaerospermus* ve yüzüycü yapraklı olarak *Lemna minor*'u sayabiliriz.

Bu birlik içinde yer alan *Polygonium amphibium*, *Veronica anagalis aquatica* ve *Oenanthe aquatica* **Phragmitetalia** ordosunun karakteristikleridir. Yine bu birlik içerisinde görülen **Potametea** karakteristikleri *Potamogeton crispus*, *Lemna minor*, *Ranunculus sphaerospermus* ve *Ranunculus paludosus*'tur. Ayrıca bu birlikte az da olsa **Phragmitio – Magnocaricetea** ve **Ceratophylletea** karakteristiklerine de rastlanmaktadır.



**Fotoğraf 2:** Ayvacık'da bulunan Phragmitetum birliğinden bir görünüş.



#### 4.3.1.3 *Arthrocnemo- Halocnemetum strobilacei* (Oberd 1957)

*Arthrocnemum fruticosum*, tuzlu topraklarda yayılış gösteren türlerden birisidir. Genel olarak deniz kenarlarında, deltalarda, tuzlu bataklıklarda yetişen bu halofit tür sukulent yapısı ile diğer bitkilere karşılık toprakta bulunan çok yüksek miktarda ki tuz oranlarını bile tolere edebilmektedir. Halofitlerin tuz toleransı ekofizyolojik bir konu olup, çalışmamızın amaç ve kapsamının dışında kalmaktadır.

Çok yıllık sürünücü veya yükselici bir formasyona sahip *Arthrocnemum* türleri yaklaşık 1 m'ye kadar büyüebilmektedir. Ülkemizde en fazla Tekirdağ, İstanbul, Antalya, Kayseri ve İçel ve bölgemizde bulunan bu tür, dünya genelinde Güney, Batı Avrupa, Kuzey Africa, Arabistan, Suriye ve İran'da yayılış göstermektedir (Davis 1965).

Bu birlik yapılan vejetasyon araştırmaları sonucunda, 16 m<sup>2</sup> lik 10 örnek alanda tespit edilmiştir. Bu örnek alanlarda tespit edilen birliğin yüksekliği 30-40 cm arasında değişirken, kapallığı % 60-80 arasındadır. Bu tuzlu ve alkali toprakları tercih eden bitki birliği çalışma alanında özellikle Gediz Deltası'nda yoğun olarak görülebilmektedir. Bu bölgede hala etkin bir şekilde tuz üretiminde kullanılan tuz tavaları ve geçmişte kullanılan tuz tavalarda üretimi sağlamak için alana periyodik olarak tuzlu deniz suyunun verilmesi, meyile sahip olmayan düz alanlarda bu birliğin genişlemesine neden olmuştur. Dolayısıyla Çamaltı bölgesinde tuzlu suya yakın alanlarda ve pompalar ile tuzlu su basılan tuz tavaları ve bu tavalardan kalan düz alanlarda bu birlik karakteristik şekilde ortaya çıkmaktadır. (Fotoğraf 3)

Bu birliğin görüldüğü örnek alanlardan alınan toprak örnekleri tuzlu alkali topraklar sınıfına girmektedir. Bu topraklar, dışarıya akıntısı olmayan iç bükey topografya ile düze yakın meyile sahiptirler. Gerek iç bükey topografya, gerek fazla tuz ihtiva eden taban sularının yükselmesi ve buharlaşmanın fazla olması nedeniyle bu toprakların üst kısımlarında fazla miktarda tuz birikmektedir. Tuzluluk yüzeyde beyaz kristaller halinde görülebilirken, açılan profiller boyunca yer alan diğer alt tabakalarda da görülmektedir.

Bu tip topraklarda açılan profile göre, A horizonunun kalınlığı 45-50 cm civarındadır. Rengi koyu gri olan bu toprakların bünyesi siltli tın, alt kısmı ise masif yapıdadır. Bu topraklarda yüzeyden aşağıya doğru gidildikçe kök gelişimi büyük miktarda azalmaktadır. B horizonu tam

olarak ayırt edilemeyen bu topraklarda C horizonu kireçli depozitten ibaret olup, rengi koyu gridir. Bünyesi tınlı olan bu horizonun derinliği anakayaya kadar ulaşmaktadır.

Bu birliğin karakteristik ve ayırt edici türleri; *Arthrocnemum fruticosum* ve *Halocnemum strobilaceum* 'dur. Bu birliğe eşlik eden en önemli türler ise; *Saliornia europea*, *Hordeum marinum*, *Halimioone portulacoides*, *Salsola kali*, *Sueda prostrata subsp. prostrata*, *Aegilops triuncialis*, *Chenopodium murale*, *Chritmum maritimum*, *Limonium sinuatum*, *Juncus maritimus*, *Cakile maritima*, *Eryngium maritimum*, *Rumex bucephaloporus* ve *Ammophilla arenaria*'dır. (Tablo 7)



**Fotoğraf 3** : Gediz Deltası'nda bulunan *Arthrocnemo – Halocnemetum strobilacei* birliğinden genel görünüş

**Tablo 7: Arthrocnemo – Halocnemetum strobilacei Birligi (Oberd 1957)**

ÖRNEK ALAN NO	76	136	137	138	139	140	141	142	143	144	B U L U N U Ş
ALANIN BÜYÜKLÜĞÜ (m <sup>2</sup> )	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
ÖRTÜ YÜKSEKLİĞİ (cm)	30	30	40	50	30	30	30	40	30	30	
ÖRTÜ (%)	70	70	80	80	75	75	60	70	70	60	
<b>Karakteristik ve Ayırteci türler</b>											
Arthrocnemum fruticosum	33	23	44	44	34	33	-	33	33	23	9
Halocnemetum strobilaceum	+1	+1	-	+1	-	+1	22	11	11	33	8
<b>Eşlik Eden türler</b>											
Salicornia europaea	12	22	-	+1	22	11	33	-	-	11	7
Hordeum marinum	+1	-	+1	-	+1	-	-	+1	11	+1	6
Halimione portulacoides	-	-	+1	+1	+1	-	+1	-	+1	-	5
Salsola kali	-	-	+1	-	+1	-	-	+1	-	+1	4
Suaeda prostrata	+1	-	-	-	+1	-	+1	-	-	+1	4
Suaeda subsp.prostrata	-	+1	-	-	-	+1	+	-	+1	-	4
Aegilops triuncialis	-	+1	-	-	-	+1	+	-	+1	-	4
Chenopodium murale	+1	-	-	-	-	-	+1	11	-	+1	4
Salsola soda	-	-	+1	+1	-	-	+1	-	+1	-	4
Amaranthus deflexus	-	-	-	-	-	+1	-	+1	+1	+1	4
Chritum maritimum	-	+1	-	+1	-	-	+1	-	-	-	3
Limonium sinuatum	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	+1	3
Tamarix symrnensis	+1	-	-	+1	+1	-	-	-	-	-	3
Ammophilla arenaria	-	-	+1	+1	+1	-	-	-	-	-	3
Malcolmia flexuosa	-	+1	-	-	-	-	-	-	+1	+1	3
Juncus maritimus	-	-	+1	-	+1	+1	-	-	-	-	3
Cakile maritima	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	2
Matthiola tricuspidata	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	2
Foeniculum vulgare	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	+1	
Aeluropus littoralis	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	2
Atriplex hastata	-	-	+1	-	-	+1	-	-	-	-	2
Hyparrhenia hirta	-	-	+1	-	-	+1	-	-	-	-	2
Fumaria capreolata	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	1
Eyringium maritimum	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Dactylis glomerata	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	1
Oxalis pes carpea	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	1
Medicago litoralis var.litoralis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	1
Hymenocarpus cinctus	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	1
Oenanthe pimpinelloides	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	1
Lagurus ovatus	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Daucus involuvarius	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	1
Xanthium strumarinum subsp.strumarinum	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	1
Inula viscosa	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Xeranthemum annuum	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	1
Logfia gallica	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	1
Cirsium vulgare	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Heliotropium hirsutissimum	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Scolymus hispanicum	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	
Vulpia ciliata	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	1
Steria viridis	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Glacium flavum	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	1
Veronica arvensis	-	+1	-	---	-	-	-	-	-	-	1
Sonchus oleraceus	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	1
Rumex bucephalarus	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	1
Cardaria draba	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	1
Milium vernale	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	1



#### 4.3.1.4 *Tamaricetum symrnensi* (Seçmen& Leblebici 1994) Birliđi

*Tamarix symrnensis*, yoğun olarak Ege ve Akdeniz bölgelerinde sahil kenarları, deltalar ve tuzlu topraklarda yaşayan çok yıllık bir ağaççıktır. Ancak bunun dışında İstanbul, Zonguldak, Çoruh, Uşak, Ankara, Maraş, Diyarbakır, Antalya, İçel, Van Mardin ve Hakkari 'de de yayılış göstermektedir. Ülkemiz dışında ise Kafkaslar'da , İran, Kuzey Irak, Afganistan, Balkanlar ve Romanya ve Kırım'da da doğal olarak yetişebilmektedir (Davis 1965). Bu odunsu tür iyi gelişme imkanı bulabildiđi yerlerde kalın gövdeli bir bodur ağaç formuna gelebilmektedir.

Bu bodur ağaççık küçük ve merdiven şeklinde dizilişle sahip yaprakları, spika benzeri salkım halindeki çiçek durumu ile kolayca tanınabilir. Ayrıca bu bitki üzerinde tuz salgılayan glandular yapılar bulunmaktadır (Davis 1965).

*Tamaricetum symrnensi* birliđi, yapılan vejetasyon çalışmaları sırasında araştırma sahasından alınan 6 örnek alanda tespit edilmiştir. Bu örnek alanların hepsi tuzlu alkali topraklara sahiptir. Örtü yüksekliđi 2-2,5 m arasında deđişen bu birliđin kapalılıđı % 60- 70 arasındadır.

Bu birlik, *Arthrocnemum – Halocnemum strobilaceum* birliđinde olduđu gibi, tuzlu alkali topraklarda yetişmektedir. Bir çok yerde her iki birlik iç içe girse de genel olarak *Tamarix* ler toprađın daha fazla derinleştiiđi ve tuz miktarının biraz daha az olduđu topraklarda baskın duruma gelmektedir. Buna göre bu birliđin bulunduđu topraklarda açılan profillerde A ve C horizonları gözlenirken, B horizonu pek fazla ayırt edilememektedir. Bu topraklarda toprak yüzeyinde ve katmanlarında görülen tuz kristalleri daha azdır. A horizonunun kalınlıđı 40-50 cm olup rengi koyu gri- yeşilimsi gridir. Bünyesi tınlı olup kök dađılımı orta derecedir. C horizonu ise, anakayaya uzanmakla birlikte, koyu zeytini yeşil renkli olup masif bir yapıdadır. Kök dađılımı yok denecek kadar azdır.

Yapılan Fitososyolojik çalışmalarda bu birliđin en sık olarak Gediz Deltası'nda görüldüđu ortaya konmuştur. (Seçmen vd. 1994) Bu birlik Kuşçenneti nin özellikle orta kısmında yer alan, ara sıra tuzlusu altında kalan düzlüklerde yer almaktadır. Üç tepeler mevkiinde de bulunan bu birlik, topraktaki tuz oranı düştükçe ve eğim arttıkça azalmaktadır. Tüm araştırma alanında, özellikle Gediz Nehri kıyıalarında ve Gölarmara çevresinde münferit olarak rastlansa da bunlar birlik oluşuracak kadar yoğun bulunmamaktadır (Tablo 8).

Bu birliğin karakteristik türleri *Tamarix symrnensis* ve *Salsola soda*'dır birliğin üst birim karakteristikleri ise *Halimione portulacoides*, *Hordeum marinum subsp. marinum*, *Juncus maritimus*, *Limonium sinuatum*, *Atriplex lasiantha*, *Salicornia europea* ve *Arthrocnemum fruticosum*'dur.

**Tablo 8: Tamaricetum symrnensi Birliđi (Seçmen&Leblebici 1994)**

ÖRNEK ALAN NO	17	18	23	131	132	147	B U L U N U Ş
ALANIN BÜYÜKLÜĐÜ (m <sup>2</sup> )	100	100	100	100	100	100	
TOPRAK	TA	TA	TA	TA	TA	TA	
ÖRTÜ YÜKSEKLİĐİ (m)	2,5	2	2	2,5	2,5	2,5	
ÖRTÜ (%)	60	60	60	60	60	70	
<b>KARAKTERİSTİK VE AYIRT EDİCİ TÜRLER</b>							
Tamarix symrnensis	31	21	21	31	31	31	6
Salsola soda	+1	-	-	+1	+1	-	3
<b>Üst birim karakterleri</b>							
Halimione portulacoides	-	-	11	+1	-	+1	3
Hordeum marinum var.marinum	-	+1	+1	-	-	+1	3
Juncus maritimus	+1	+1	-	+1	-	-	3
Limonium sinuatum	+1	-	+1	-	+1	-	3
Atriplex lasiantha	-	-	-	-	+1	+1	2
Salicornia europae	-	+1	+1	-	-	-	2
Arthrocnemum fruticosum	-	-	-	+1	-	-	1
<b>Eşlik eden türler</b>							
Aegilops triuncialis subsp.triuncialis	+1	-	-	-	+1	-	2
Salsola kali	+1	-	-	+1	-	-	2
Piptatherum coerulescens	+1	-	-	-	-	+1	2
Polypogon monspeliensis	-	-	-	+1	-	-	1
Plantago lanceolata	+1	-	-	-	-	-	1
Phragmites australis	-	-	+1	-	-	-	1
Heliotropium hirsutissimum	-	-	-	+1	-	-	1
Poa annua	-	-	-	+1	-	-	1
Chritum maritimum	-	+1	-	-	-	-	1
Cynodon dactylon	-	-	-	-	-	+1	1
Plantago coronopus	-	-	+1	-	-	-	1
Torillis nodosa	+1	-	-	-	-	-	1

### 4.3.2. Çalı Vejetasyonu

#### 4.3.2.1 Paliuro – *Quercetum cocciferae* (Çetin, 2003) Birliđi

Kermes meşesi adı ile bilinen *Quercus coccifera*, Akdeniz iklim tipinin hakim olduđu bölgelerde en sık olarak görülen maki elemanıdır. Ülkemizde başlıca Batı ve Güney Anadolu kıyı şeridi üzerinde yayılış gösterir (Davis 1982). Sahil bölgelerinde, *Q. coccifera* özellikle keçi baskısı altında olduđu için boyu genellikle 50-100 cm arasında deđişmektedir. Ancak keçi yetiştirilmeyen bölgelerde, bazı milli parklarda ve mezarlık bahçesi, cami bahçesi gibi hayvanların girmesine izin verilmeyen kutsal alanlarda kermes meşesi boylu ağaç haline gelebilmektedir. (Durmuşkahya 2000)

Çalışma alanında bu bitki birliđi ağırlıklı olarak Menemen-Emiralem, Emiralem-Muradiye, Muradiye- Yağcılar, Süleymanlı- Helvacı köyleri arasında yoğun olarak bulunurken az miktarda, Gölarmara; Yeniköy, Kurttutan, Kemerdamları, Turgutlu; Derbent, Akköy, Cambazlı, Salihli; Yenipazar, Durasıllı, Dombaylı da ve seyrek olarak Adala ve çevresinde yayılış göstermektedir. Arazi çalışmaları sırasında genel olarak 100-500 m yüksekliklerde tespit edilen bu birliđin örtüş oranı %40 ila % 90 arasında deđişmektedir. (Fotoğraf 4)

Bu birliđin yayılış gösterdiđi alanlardan alınan toprak örneklerinin tahlili sonucunda bu birliđin genellikle kumlu- tınlı bünyeye sahip olan ve hafif bazik karakterli topraklarda gelişme gösterdiđi tespit edilmiştir. Özellikle andezit anakaya üzerinde ve marnlı topraklar da bu birliđi tamamlayan en önemli edafik faktörlerdir. Açılan toprak profillerinde yapılan gözlemlere göre, bu tip toprakların humus ve organik madde oranı düşüktür. Verimlilik ise yaklaşık % 50 civarındadır.

Fitososyolojik olarak birlik yükseklikleri 30- 364 m eğimleri, % 5- 45 arasında deđişen; Kuzey, Kuzeybatı, Güney, Güneybatı, Güneydođu ve Dođu bakılı toplam 22 örnek alanda tanımlanmaya çalışılmıştır. (Tablo 9) Buna göre birlikte çalı ve ot olmak üzere başlıca iki tabaka gözlenmiştir. Baskın türü *Quercus coccifera* olan çalı tabakasının yüksekliđi 1,5-2 m, örtüsü % 60-80; çok sayıda tek veya çok yıllık otsu türden oluşmuş olan ot tabakasının ise yüksekliđi 5-30 cm olup, örtüsü % 20-30 arasında deđişmektedir.

Bu birliğin karakteristik türü, *Quercus cocifera* olup, birliğin yapısına katılan türlerin başlıcaları *Paliurus spina-christi*, *Asparagus acutifolius*, *Phillyrea latifolia*, *Pistacia terebinthus*, *Pyrus amygdaliformis*, *Rubai teunifolia*, *Calicatome villosa*, *Jasminium fruticans*, *Olea europea var.sylvestris* ve *Geranium purpureum*'dur. Karakteristik türlerin dışında bu birlikte, ***Chenopodietalia mediterranea***, ***Querceta pubecentis*** ve ***Cisto-Micromeritalia*** gibi üst ünitelere ait türler de eşlik etmektedir. (Tablo 9)

Aşağı Gediz Havzası'nda bu birliğin görüldüğü bazı alanlarda *Quercus coccifera*'nın tamamen tahrip edildiği görülmüş ve bu tip alanlarda *Paliurus spina-christi*'nin dominant tür haline geldiği tespit edilmiştir. Bu tip *Paliurus spina christi*'nin baskın hale geldiği bitki toplulukları en yoğun olarak Ayvacık, Yağcılar ve Göl marmara çevresinde görülmektedir. Turgutlu – Salihli çevresinde, organik madde bakımından zengin ve humus tabakası daha kalın topraklarda ise *Quercus coccifera*'nın tahrip edildiği alanlarda *Phillyrea latifolia* dominant tür olarak göze çarpmaktadır. Bu alt birlik Fitososyolojik olarak incelendiğinde ise çalı yüksekliğinin 1-1,5 m ve örtünün ise % 80-90 civarında olduğu tespit edilmiştir.

Daha önce Yamanlar Dağı'nda (Gemici 1991) ve Yunt Dağı'nda (Şık 1992) vejetasyon çalışmaları yapan araştırmacılar bu bölgede bu tip bir birliğin varlığından bahsetmemiş olup, bu formasyonu genel olarak Gemici, *Quercus coccifera* birliği, Şık ise *Phillyrea latifolia* birliği içinde değerlendirmiştir.





#### 4.3.2.2. Asphodelo – Sarcopoterietum spinosi ass.nova Birliđi

*Sarcopoterium spinosum* Dođu Akdeniz elementidir. Bu nedenle Dođu Akdeniz bařta olmak üzere, Tunus ve Sardunya Adası'na kadar Akdeniz Havzası'nda yayılıř göstermektedir. (Davis 1972) Frigana adı verilen bitki örtüsünün en karakteristik türü olan *Sarcopoterium spinosum*, makinin büyük ölçüde tahrip olduđu çıplak alanları kaplayarak kısa boylu bir topluluk oluşturur. Özellikle Batı Anadolu'da yaygın olan yangın yoluyla makiliklerin tahrip olması sonucu ilk olarak, toprak altında bulunan yumruları ile yangından etkilenmeyen *Asphodelus aestivus* hakim duruma geçmekte ve onu da *Sarcopoterium spinosum* izlemektedir.

Arařtırma alanının en sık rastlanan topluluklarından olan *Sarcopoterium spinosum*, 0-500 m ler arasında yayılıř göstermekle birlikte, en yoğun olarak Gediz Nehri'nin denize döküldüđu ađızda, Foça Tepeleri'nde, İzmir Kuř Cennetinde, Menemen Helvacı Köy ve Dumanlı Dađ'ın eteklerinde görülmektedir. (Fotođraf 5)

Birliđi tanımlamak amacıyla, yükseklikleri 20-241 m arasında, bakısı ise, güney, güneybatı, güneydođu, dođu, batı, kuzeybatı ve kuzey olmak üzere 20 örnek alan alınmıřtır. Örnek alanların vejetasyon örtüsü % 60-90 arasında olup, örtü yüksekliđi 20-80 cm arasında deđiřmektedir.

Yapılan toprak analizlerine göre bu birlik genellikle andezit kayalar üzerinde bulunur ve derinliđi olmayan kireçsiz kahverengi topraklar da gelişim göstermektedir. Ancak Kuřcenneti çevresinde kalker anakaya üzerinde bu birliđin varlıđı tespit edilmiřtir. Açılan toprak profillerine göre bu topraklar genellikle 2 horizonludur. En üstte ölü örtünün altında A horizonu gözlenememektedir. B horizonu yaklaşık 15-18 cm kalınlıđında, grimsi kahverengi renkli olup, kumlu tınlı bir bünyede ve iri çakıllı yapıdadır. Bu horizonunda kök gelişimi mevcuttur. C horizonu 30-100 arasında, koyu gri renkli, iri çakıllı, sıkı yapı olup bünyesi kilidir.

Bu birlik fitososyolojik olarak incelendiđinde birliđin karakteristik ve ayırt edici türleri *Sarcopoterium spinosum* ve *Asphodelus aestivus*'tur. Bu birlik iđerisinde görülen **Cisto – Micromeritalia (ea)** nın karakteristik türleri; *Cistus creticus*, *Ballota acetobulosa*, *Cistus salviifolius*, *Origanum onites*, *Coridothymus capitatus*, *Micromeria graeca* ve *Helianthemum silacifolium*'dur. **Quercetalia (ea) ilicis** ordosunun karakteristik türleri ise; *Phillyrea latifolia*, *Asparagus acutifolius*, *Paliurus spina-christi*, *Calicotome villosa*, *Pistacia terebinthus*, *Geranium*

*purpureum*'dur. Birlik içinde görülen ***Chenopodietala (ea) mediterranea***'nın karakteristik türleri ise; *Picnomon acarna*, *Onopordum illyricum*, *Inula viscosa*, *Carlina corymbosa*, *Datura stramonium* ve *Scolymus hispanicus*'tur. Ayrıca bu birlik içinde az sayıda ***Olea ceratonion*** alyansının karakteristikleri de ayrılabilir (Tablo 10).

Bu birliğin vejetasyon katları incelendiğinde iki tabakadan oluştuğu görülmektedir. Bunlardan birincisi çalı tabakası olup, genellikle yastıkçık şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu tabakanın boyu yaklaşık 30-50 cm olup, kapalılığı %60-90 oranındadır. İkinci tabaka ise otsu bitkilerden oluşan tabaka olup, içinde çok sayıda tek yıllık ve çok yıllık bitki bulundurmaktadır. Bu tabakanın yüksekliği 5-20 cm arasında değişirken, kapalılığı ise %5-10 arasında değişmektedir.



**Fotoğraf 5:** Gediz Deltası Poyraz Tepe'de bulunan *Asphodelo – Sarcopoterietum spinosi* birliğinden genel görünüşü.





var.depressus																				
Avena barbata	-	+1	-	-	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	4
Trifolium tomentosum	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	+1	4
Anemone coronaria	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-11	-	-	-	+1	+1	-	-	4
Capparis spinosa	+1	-	-	-	+1	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	+1	4
Vicia villosa ssp.eriocarpa	-	+1	-	-	+1	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Vulpia ciliata	+1	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	+1	4
Plantago afra	-	-	-	+1	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	4
Medicago orbicularis	-	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	4
Phleum subulatum	-	-	+1	+1	-	-	+1	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Scandix pecten veneris	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	+1	-	-	3
Biscutella didyma	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	3
Allysium fulvescens var.fulvescens	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	+1	-	-	3
Lolium temulentum	-	-	-	+1	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Medicago minima	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	3
Vulpia ciliata	-	+1	-	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Erophila verna ssp.verna	-	-	-	-	+1	--	--	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	3
Onobrychis caput-galli	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	3
Bromus sterilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	+1	3
Papaver rhoeas	+1	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Trifolium arvense ssp.arvense	-	+1	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	3
Ophrys lutea	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	+1	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	3
Tuberaria guttata	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	+1	-	3
Knautia integriflora	+1	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Silene italica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	+1	-	+1	-	-	-	-	-	3
Muscari comosum	-	+1	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	3
Arabis verna	-	-	-	-	-	+1	-	+1	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Eryngium campestre	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	+1	3
Erodium malacoides	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	+1	-	-	-	-	-	3
Verbascum lashianthum	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	3
Valeriana officinalis	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	3
Legosia pentagonia	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	3
Lagurus ovatus	-	-	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	3
Theligonium cynocrambe	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	3
Medicago polymorpha	+1	-	-	-	-	+1	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Sinapis alba	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Sherardia arvensis	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	+1	-	-	-	-	3
İki tekerrürlü türler	Orobanche cernua, Valentia hispida, Allysium murale, trifolium resupinatum, Valerianella cruciata, Ornithopus comprssus, Geranium lucidum, Sedum confertiflorum, Lamium amplexicaule, Ranunculus marginatus, , Trifolium purpureum, Bromus tectorum, Plantago coronopus, Torillis nodosa, Taeniaterium crinitum, Athemis pseudocotula, Umbelicus rupestris, Centauera cyanus, Geranium dissectum, Cerastium glomeratum, Pallenis spinosa, Tolpis barbata, Myosotis ramossissima, Senecio vernalis, Ornithogalum pyrenaicum																			
Tek tekerrürlü türler	Centaurium erythraea, Sedum caespitum, Trifolium uniflorum, Linum bienne, Silene dichotoma, Ranunculus arvensis, Clypeola jhonthlaspi, Poa nemoralis, Vicia cracca, Scandix pecten-venris, Anthemis chia, Foeniculum vulgare, Artedia squamata, Valerianella coronata, Xeranthemum annum, Crepis zachnita, Convolvulus arvensis, Alkanna tinctoria, Salvia virgata, Euphorbia helioscopia, Allium nigrum, Juncus acutus, Tamus communis Melica minuta, Steria viridis																			

### 4.3.3. Orman Vejetasyonu

#### 4.3.3.1. Lino- Pinetum brutiae ass.nova Birliđi

Holotip :110 No lu rneklik alan. Lokalite; Salihli, Sart Deresi (85m, KB)

Kızılçam olarak tanınan *Pinus brutia* bařta Ege ve Akdeniz blgeleri olmak zere, Anadolu yarımadasının en yaygın ađalarından birisidir. *Pinus brutia* (Davis 1965) ve Zohary (1973) 'e gre gerek Akdeniz vejetasyonunun bir indikatrdr. Bu tr, Akdeniz blgesinde Toros ve Amanos dađlarında ve kısmen Ege Blgesinde olduka geniř topluluklar oluřturur.

Biyoiklim bakımından kızılçam yarı-kurak Akdeniz iklim katından yađıřlı ve ok yađıřlı Akdeniz iklim katlarındaki sıcak, serin ve sođuk deđiřkenlerde yayılır. Bu tr lkemizde deđiřik anakayalar zerinde geliřebilmektedir (Akman 1995). Genellikle marn ve marnlı kalker kayalar zerinde egemen olmakla birlikte, nadiren de olsa serpantin, gabro, peridotit zerinde de geliřme gsterebilmektedir.

Arařtırma alanımızda bu tr, ađırlıklı olarak Yamanlar Dađı'nın kuzey sırtlarında, Manisa Dađı'nın eteklerinde ve Turgutlu ile Salihlinin Kuzey yamalarında yođun olarak bulunmaktadır. Vejetasyon alıřmaları sonucunda alınan rnek alanlara gre, alıřma alanında bu topluluk 85-512 m yksekliler arasında yayılıř gstermektedir. Yapılan arazi alıřmaları sonucunda bu birliđe ait olmak zere 17 rnek alan alınmıřtır. Bu rnek alanların bakıları gneybatı, kuzey, kuzeybatı, dođu olarak deđiřmektedir. (Tablo 11)

Yapılan toprak analizlerine gre Ařađı Gediz Havzası'nda yer alan kızılçam toplulukları, genellikle andezit anakaya zerinde geliřim gstermektedir. Alınan rnek alanlarında yapılan gzlemlere gre birliđin genellikle kiresiz kahverengi orman toprakları zerinde buldukları tespit edilmiřtir. Bu topraklar genelde eđimli yerlerde bulunduđu iin, derinliđi pek fazla deđildir. Bu nedenle de yre halkı tarafından alak ve dz kesimlerde olduđunun aksine tarım alanı olarak kullanılmayacađı iin kızılamlar pek fazla tahrip edilmemiřtir. rnek alanlarda aılan toprak profillerine gre bu topraklarda, kire bulunmamaktadır. Organik horizon da grlmemektedir. Bu topraklar ABC horizonludur. Aılan rnek profile gre A horizonu 13-15 cm kalınlıkta olup rengi koyu kahverengidir. Bnye kumlu tın, yapı orta dereceli granllerden oluřmuřtur. Kk dađılımı serbesttir. B horizonu 12-14 cm kalınlıkta, rengi aık kahverengidir.

Bünye, kumlu kili tın, yapı orta derece bloktur. Ana kaya özellikleri taşıyan C horizonunun rengi sarımsı kahverengi, bünyesi kaba kumlu tın ve masif bir yapı göstermektedir. Toprak Ph ortalama 7-7,5 arasındadır.

Bu birliğin kapalılık oranı %70-95 arasında değişmektedir. Odunsu tabakanın boyu ise ortalama 15-20 m arasındadır. Yapılan incelemelere göre özellikle Turgutlu ve Salihli sırtlarında alınan örnek alanlarda kapalılık daha yüksektir. Bu da o yörede antropojenik etkilerin diğer alanlara karşılık daha az olduğunu göstermektedir.

Bu birlikte odunsu ve otsu olmak üzere iki ayrı tabaka tespit edilmiştir. Odunsu tabakanın hakim türü *Pinus brutia* olup, buna eşlik eden türler *Juniperus oxycedrus*, *Olea europea* ve *Pyrus amygdaliformis* tir.

Birliğin çalı katında bulunan türleri başında, *Quercus coccifera*, *Phillyrea latifolia*, *Pistacia terebinthus*, *Jasminium fruticans*, *Cistus creticus*, *Asparagus acutifolius* ve *Ruscus aculeatus* gelmektedir.

Birliğin otsu tabakası ise tek ve çok yıllık türlerden oluşmuş olup, yüksekliği yaklaşık 10-50 cm dir. Otsu türlerin örtüsü % 5-10 arasında olup en sık gözlenenleri *Linum corymbulosum*, *Geranium purpureum*, *Lathyrus laxiflorus subsp.laxiflorus*, *Lapsana communis*, *Melica ciliata*, *Picnomon acarna*, *Poa bulbosa*, *dactylis glomera*, *Trifolium campestre*, *Trifolium stellatum*, *Crucinella angustifolia* gibi türlerdir. (Tablo 11)

Birliğin muhtemel karakteristik ve ayırt edici türleri olarak, *Pinus brutia*, *Linum corymbulosum* tespit edilmiştir. Sintaksonomik olarak bu birliğe **Quercetalia (ea) ilicis** ordo ve sınıf karakteristikleri yaygın olarak görülmektedir. Buna ek olarak bu birlikte **Quercetalia pubescetis** karakteristikleri ile, **Cisto-Micromeritalia (ea)** ve **Chenopodietalia (ea) mediterranea**'nın karakteristik türleri az sayıda da olsa bulunmaktadır.

**Tablo 11 : Lino-Pinetum brutiae Birliđi ass.nova**

Holotip : 110 No lu örneklik alan. Lokalite; Salihli, Sart Deresi (85m, KB )

ÖRNEK ALAN NO	50	56	57	60	69	71	73	78	79	84	95	101	110	111	113	128	133	B U L U N U Ş	
ALANIN BÜYÜKLÜĐÜ (m <sup>2</sup> )	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
YÜKSEKLİK (m)	200	400	512	500	256	384	290	384	255	443	493	236	85	136	287	150	275		
BAKI	GB	KD	K	D	K	K	KB	K	KD	KB	GB	K	KB	K	K	KB	KB		
EĐİM (%)	5	10	5	40	20	20	5	30	5	5	45	20	5	20	30	15	5		
ANAKAYA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
TOPRAK	KKO	KKO	KKO	KKO	KKO	KKO	KKO	KKO	KKO	KKO	KKO	KKO	KKO	KKO	KKO	KKO	KKO		
ÖRTÜŞ	95	90	70	75	80	90	75	95	90	90	90	90	60	75	90	75	75		
<b>KARAKTERİSTİK VE AYIRT EDİCİ TÜRLER</b>																			
Pinus brutia	45	45	35	45	55	55	45	55	55	55	55	55	35	45	55	45	45		17
Linum corybulosum	-	-	-	-	-	+1	11	-	+1	+1	-	-	11	-	-	-	-		5
<b>Quercetalia (ea) ilicis'in karakteristik türleri</b>																			
Quercus coccifera	-	22	-	-	+1	22	33	-	22	21	-	22	11	22	-	+1	-		10
Phillyrea latifolia	+1	-	21	-	22	-	-	+1	-	11	-	+1	33	22	-	-	22	9	
Pyrus amygdaliformis	+1	-	-	11	-	+1	-	-	+1	-	11	-	22	-	11	22	22	9	
Pistacia terebinthus	11	21	-	+1	-	-	+1	-	-	-	+1	-	22	+1	-	+1	-	8	
Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus	+1	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	11	+1	-	-	+1	6	
Asparagus acutifolius	+1	-	-	-	+1	-	+1	-	-	-	-	-	+1	+1	-	-	-	5	
Geranium purpureum	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	+1	-	-	+1	-	-	4	
Ruscus aculeatus	-	-	-	-	-	+1	-	-	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	3	
Lonicera etrusca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	1	
<b>Quercetalia pubescentis'in karakteristik türleri</b>																			
Quercus cerris	+1	-	-	+1	-	-	-	-	11	-	11	-	-	+1	-	-	+1	6	
Quercus infectoria	-	-	+1	-	+1	-	12	-	-	-	-	-	12	11	-	-	+1	6	
Silene italica	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	+1	-	-	+1	-	-	-	+1	5	
Cephalanthera rubra	+1	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	4	
Lathyrus laxiflorus subsp.laxiflorus	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	2	
Lapsana communis ssp. psidica	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	2	
<b>Cisto-Micromeritalia (ea)'nın karakteristik türleri</b>																			
Cistus creticus	+1	-	21	-	-	-	21	-	+1	-	+1	-	11	-	-	11	-	7	
Melica ciliata	-	-	11	-	+1	-	11	-	+1	-	-	-	+1	-	+1	-	-	6	
Sarcopoterium spinosum	-	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	+1	4	
<b>Chenopodiatalia (ea) mediterranea'nın karakteristik türleri</b>																			
Picnoman acarna	-	-	12	-	11	-	22	-	-	-	+1	-	-	-	-	+1	+1	6	
Stellaria media var.media	-	-	+1	-	11	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	+1	-	-	5	
Rumex pulcher	+1	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	3	
Carduus pinocephalus ssp.albidus	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	+1	3	
<b>Eşlik eden türler</b>																			
Poa bulbosa	11	+1	-	+1	11	-	22	+1	+1	-	11	-	22	+1	-	12	+1	12	
Dactylis glomerata	+1	11	-	-	11	-	11	-	+1	-	+1	+1	-	-	11	-	+1	9	
Trifolium campestre	+1	-	11	-	-	11	-	-	-	+1	-	11	-	+1	-	11	-	7	
Geranium ludium	-	+1	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	+1	5	
Trifolium stellatum	-	-	21	-	-	-	11	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	11	5	
Lathyrus aphaca ssp.pseudoaphaca	+1	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	+1	-	-	-	-	-	4	
Bromus tectorum	-	+1	-	-	+1	-	-	+1	-	-	-	-	11	-	-	-	-	4	
Briza maxima	-	-	+1	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	+1	4	
Aira elengantissima	-	-	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	3	
Trifolium purpureum	+1	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	3	
Crucianella angustifolia	-	-	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	3	
Medicago orbicularis	-	-	-	+1	-	-	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	3	
Crepis foetida	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	+1	+1	-	-	-	-	-	-	3	
Veronica cymbalaria	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	+1	-	3	
<b>Çift tekerrürlü türler</b>	Myosotis arvensis, Ballota acetobulosa, Sherardia arvensis, Micromeria nervosa, Alyssum fulvescens, Legosia cuminoides, Rhagadiolus stellatus, Galium aperine, Anagallis arvensis var.caerulea, Geranium molle ssp.molle, Muscari comosum																		
<b>Tek tekerrürlü türler</b>	Valentia hispida, Trifolium resupinatum var.resupinatum, Helianthemum tuberosum, Centaurea cyanus, Trifolium clypeatum, Aegilops triuncialis, Scandix pecten-veneris, Tordylium apulum, Tolpis barbata, Ranunculus ficaria, Poa bulbosa, Hymenocarpus circinatus, Cardaminea graeca, Sangisorbia minor, Aristolochia hirta, Cyclamen hederifolium																		

#### 4.3.3.2 Phlomo – *Quercetum macrolepi* ass. nova Birliđi

Holotip : 106 nolu örnek alan, Salihli Kırdamları (356 m K bakısı)

Kserofil meşelerden *Quercus ithaburensis subsp. macrolepis* yaprak döken bir meşe türü olup derin topraklarda egemen bitki toplulukları oluşturmaktadır. Ancak bu meşe türlerinin oluşturduğu ormanlar yöre halkı tarafından tarım alanı açmak için büyük çapta tahrip edilmiştir. Bu türün asıl yayılış alanı Akdeniz Havzası'nın doğu kesimidir.

Palamut meşesi olarak bilinen *Quercus ithaburensis*, İtalya Yarımadası'nın güneydoğu ucundan başlayarak Balkan Yarımadası'nda, Makedonya ve Rodop Dağlarının güney kısımlarında, Girit Adası'nda Güney Anadolu, Lübnan ve İsrail'de yayılış göstermektedir (Günel 1997). Ülkemizde ise, Batı, Güney ve Orta Anadolu'da yayılarak, diğer meşe türleri ve *Pinus brutia* ile karışık ormanlar oluşturur.

Aşağı Gediz Havzası'nda ise bu meşe toplulukları özellikle Gediz Nehri'nin kuzey kısımlarında yer alan bölgelerde yoğun olarak bulunmaktadır. Çalışmamız sonucunda ortaya çıkan ilginç bir veri, bu meşe topluluklarının Gediz nehrinin sadece kuzey kısmında yer alması ve nehrin güney kısımlarında bulunan Manisa ve Yamanlar Dağı eteklerinde münferit bireyler olarak bulunsa bile topluluk oluşturmamasıdır. Bunun nedeni, Gediz nehrinin kuzey kısmında yer alan bölgede toprak tabakasını daha derin ve meyilin daha az oluşu ile ilişkilidir. Palamut meşesi toplulukları yoğun olarak, Dumanlı Dağın arkasından başlayarak, Süleymanlı, Telekler, Yağcılar, Muradiye'de; Göl Marmara çevresinde, Yeniköy, Hacıhaliller, Karağaçlı'da; Demirköprüye doğru, Kemerdamları, Poyrazdamları, Dibek Dağı yamaçları ve Dombaylı çevresinde bulunmaktadır. (Fotoğraf 6)

Yapılan arazi çalışmalarında bu birliđi karakterize eden 23 örneklik alan alınmış olup bu alanların yüksekliđi 50-650 m arasında deđişmektedir. Yine alınan örnek alanların bakısı ise, güney, güneybatı, batı ve kuzey istikametindedir. Bu bitki birliđinin bulunduğu örnek alanlardan alınan toprak örneklerine göre, birlik genel olarak andezit anakayanın olduđu ve çođunlukla kahverengi orman toprakları üzerinde gelişim göstermektedir. Açılan toprak profiline göre bu topraklar, ABC horizonlarına sahip olup, yüksek derecede kireç ihtiva etmektedir. Bu profilin A horizonu üzerinde yaklaşık 2-3 cm kalınlığında bir organik kat bulunmaktadır. Rengi koyu kahverengi olan bu organik kat kısmen veya tamamen parçalanmış bitki kısımlarından oluşmuştur. A horizonu 14-16 cm kalınlığında olup, rengi koyu kahverengidir. Bünyesi oldukça killidir. B horizonunun kalınlığı 8-10 cm, rengi kahverengidir. Bünyesi killi olup, orta büyüklükte

bloktur. C horizonu 125-130 cm kalınlığında olup rengi sarımsı kahverengidir. Bünye killi tın veya kil olup rengi sarımsı kahverengidir.

Bu topluluklar daha önce Akman vd. (1979) tarafından tanımlanmış ve Üst Akdeniz'in yaprak döken ormanlarına dahil edilmiş ve birliğin karakteristik türleri olarak *Quercus ithaburensis subsp. macrolepis*, *Quercus cerris*, *Quercus pubescens*, *Quercus trojana* ve *Ulmus campestre* olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte uluslar arası Bitki Sosyolojisi Kodu uyarınca isimlendirilmiştir. Araştırma sahasına en yakın çalışmalardan olan Orta Gediz Havzası Flora ve Vejetasyonu isimli çalışmada Uğurlu (2005) te aynı meşe birliğini tespit etmiş ve **Quercetalia (etea) ilicis** karakterlerinin baskınken, **Quercetea pubescentis** karakteristiklerinin ise daha az sayıda olduğunu, **Quercetalia libani** ve **Carpino-Acerion** ve **Quercetalia carpinetalia orientalis** karakteristiklerinin de gözlemlendiğini ifade etmiştir.

Bu çalışmada yapılan araştırmalar göre, bu birliğin karakteristik türleri, *Quercus ithaburensis subsp. macrolepis*, *Quercus infectoria*, *Quercus trojana*, *Campanula lyrata*, *Phlomis grandiflora* ve *Stachys cretica subsp. symrnae* olarak tespit edilmiş ve bu bağlamda, **Phlomo-Quercetum macrolepi** birliği olarak isimlendirilmiştir (Tablo 12).

Fitososyolojik olarak yapılan değerlendirmede bu birlik de ağırlıklı olarak, **Quercetalia (ea) ilicis** ve **Quercetea pubescentis** karakteristikleri görülmekle birlikte az sayıda da, **Chenopodietalia (ea) mediterranea** ve **Cisto-Micromerietalia (ea)** karakteristikleri de bulunmaktadır.

Bu birliği oluşturan ağaç tabakasının ortalama yüksekliği 6-7 m olup, kapalılığı ortalama olarak % 60 tır. Birliğin çalı katında bulunan türlerin başlıcaları ise; *Quercus coccifera*, *Pistacia terebinthus*, *Phillyrea latifolia*, *Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus*, *Pyrus amygdaliformis*, *Paliurus spina-christi*, *Crateagus monogyna* ve *Asparagus acutifolius*'tur.

Birliğin ot tabakasının yüksekliği ise, 10-50 cm olup kapalılığı, % 20 oranındadır. Bu katın başlıca türleri; *Verbascum laschianthum*, *Aegilops umbellata*, *Dactylis glomerata*, *Trifolium angustifolium*, *Cynurus echinatus*, *Poa annua*, *Vulpia ciliata*, *Bromus tectorum*, *Torilis nodosa*, *Geranium lucidum*'dur.

**Tablo 12: Phlomo- Quercetum macrolepi ass. nova Birliđi**

Holotip: 106 nolu örnek alan, Salihli, Kırdamları (356m K bakısı)

ÖRNEK ALAN NO	26	27	34	35	37	38	46	47	48	52	75	77	81	82	83	85	96	97	103	105	106	117	118	B U L U N U Ş	
ALANIN BÜYÜKLÜĐÜ (m <sup>2</sup> )	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		1000
YÜKSEKLİK (m)	50	71	100	200	103	150	130	178	151	160	216	450	165	178	165	203	458	387	485	279	356	389	650		
BAKI	G	GB	G	G	G	GB	G	GB	G	G	K	B	KB	GD	K	K	GB	K	B	K	GB	G			
EĐİM (%)	15	10	25	25	5	10	10	15	5	5	-	10	-	5	-	5	30	20	20	5	20	15	5		
ANAKAYA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	K	A	A	A	K	A	A	K	M	A	A	A		
TOPRAK	KO	KO	KO	KO	KO	KO	KKO	KKO	KKO	KKO	KO	KO	A	A	KO	KO	KO	KO	KKO	KO	KO	KO	KO		
ÖRTÜŞ	50	50	60	60	65	40	60	50	65	60	75	90	65	70	70	70	75	75	70	80	80	65	80		
<b>KARAKTERİSTİK VE AYIRT EDİCİ TÜRLER</b>																									
Quercus ithaburensis subsp.macrolepis	33	33	-	-	44	-	34	33	44	44	44	44	34	44	44	44	44	44	34	44	44	33	44	20	
Quercus infectoria	11	12	34	44	-	44	+1	12	-	-	-	-	12	-	-	+1	-	-	11	-	-	+1	-	11	
Quercus trojana	+1	-	-	-	-	-	+1	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	+1	-	6	
Campanula lyrata	-	-	+1	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	+1	5	
Phlomis grandiflora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	+1	+1	-	+1	4	
Stachis cretica subsp.symrnae	-	+1	-	-	-	-	+1	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
<b>Quercetalia ilicis (ea) karakteristikleri</b>																									
Paliurus spina-christi	+1	+1	-	+1	-	-	+1	+1	-	+1	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	8	
Pistacia terebinthus	-	+1	-	-	+1	+1	-	-	-	+1	-	-	+1	-	-	+1	-	-	-	-	+1	-	-	7	
Phillyrea latifolia	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	5	
Quercus coccifera	-	+1	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	+1	-	5	
Pyrus amygdaliformis	-	-	-	+1	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	4	
Juniperus oxycedrus subsp.oxycedrus	-	-	-	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	3	
Asparagus acutifolius	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	3	
<b>Quercetea pubecentis karakteristikleri</b>																									
Crateagus monogyna	-	-	-	+1	-	-	+1	-	-	-	-	-	+1	-	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	5	
Quercus pubescens	+1	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	5	
Quercus cerris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	+1	+1	-	4	
Cistus laurifolius	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Eryngium campestre	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	2	
<b>Chenopodiatalia (ea) mediterranea'nın karakteristik türleri</b>																									
Onoprdum illyricum	11	+1	-	+1	+1	-	-	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	7	
Scolymus inthybus	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Carlina corymbosa	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	2	
Picnomon acarna	-	-	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
<b>Cisto-Micromeritalia (ea) karakteristikleri</b>																									
Cistus creticus	-	-	+1	+1	-	+1	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Origanum onites	-	-	-	-	-	+1	-	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Aşğhodelus aestivus	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	3	
Thymus zygoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	2	
<b>Eşlik eden türler</b>																									
Verbascum lashedanthum	-	+1	+1	-	+1	-	+1	-	-	+1	-	-	+1	-	-	+1	-	-	-	-	+1	+1	-	9	
Aegilops umbellulata	+1	+1	+1	-	-	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	+1	-	+1	-	-	8	
Dactylis glomeata	-	+1	-	+1	+1	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	+1	+1	-	-	-	-	-	+1	-	8	
Trifolium angustifolium	-	-	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	+1	-	-	+1	+1	-	+1	-	-	-	7	
Trifolium bocconeii	-	-	-	-	+1	+1	+1	-	-	-	-	-	-	+1	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	6	
Bromus tectorum	-	+1	+1	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	+1	-	-	5	
Cynosorus echinatus	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	+1	5	
Vulpia ciliata	-	+1	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	4	
Torillis nodosa	-	-	-	+1	+1	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Filago eriocephala	+1	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Poa annua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	+1	-	+1	+1	-	4	
Geranium lucidum	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	4	
Phleum subulatum	-	+1	+1	-	-	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Rumex acetocella	+1	-	-	-	-	-	-	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	4	
Knautia integriflora	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Crepis foetida	-	-	+1	-	-	-	-	-	+1	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Centaurea cyanus	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	+1	-	-	3	
Avena barbata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	+1	+1	-	-	3	






## 5. SONUÇ VE TARTIŞMA


### 5.1 Flora

Çalışma alanında 99 familya ve 477 cinse ait tür ve alt tür olarak toplam 1065 vasküler bitki taksonu tespit edilmiştir. Aşağı Gediz Havzası Florasını teşkil eden bu taksonların 7 tanesi Pteridophyta divizyonuna, 7 tanesi Gymnospermae alt divizyonuna ve kalan 1051 taksonu ise Angiospermae alt divizyonuna aittir. Angiospermae alt divizyonunda yer alan taksonların 814'ü dikotil, 237'si de monokotildir. (Şekil 4)



**Şekil 4:** Flora bileşenleri

Flora elementlerine bakacak olursak, bölgede Akdeniz ve Doğu Akdeniz elementlerinin diğer elementlere göre çok daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun sebebi, çalışma alanının Akdeniz iklim kuşağında yer almasıdır. Ayrıca araştırma alanının bir havza çalışması olması ve içerisinde yüksek rakımlı dağlık alanların bulunmaması Avrupa-Sibirya ve İran Turan elementlerinin sayısını düşürmektedir. Buna göre araştırma alanında tespit edilen taksonların, (Şekil 5) 213 tanesi Akdeniz, 183 tanesi Doğu Akdeniz, 49 tanesi Avrupa –Sibirya ve 22 tanesi de İran-Turan elementi olduğu saptanmıştır.



**Şekil 5:** Flora elementlerinin karşılaştırılması

Bu bölümde alanımıza yakın bölgelerde yapılmış çalışmalarla karşılaştırmalar yaparak alanın florası hakkında genel sonuçlar ortaya konulması amaçlanmıştır. Buna göre familya ve cins bazında yapılan karşılaştırmalar aşağıda Tablo 13 ve Tablo 14'te verilmiştir.

**Tablo 13 :** Araştırma alanına yakın bölgelerde yapılmış flora çalışmalarının karşılaştırılması.

Araştırma Bölgeleri	Aşağı gediz H.	Orta Gediz Hav.	Murat Dağı	Manisa Dağı	Yamanlar D.	Yunt Dağı	Simav Dağı	Dumanlı Dağ
Legüminosae	118	116	65	72	104	57	69	46
Compositae	102	104	113	79	88	55	59	40
Cruciferae	54	56	60	41	31	20	31	16
Umbelliferae	52	55	34	31	27	19	20	17
Caryophyllaceae	46	53	55	33	36	19	30	9
Labiatae	49	47	52	43	28	15	33	17
Graminae	110	45	27	32	64	41	29	34
Scrophulariaceae	29	30	42	14	23	14	20	10
Boraginaceae	18	24	27	18	15	9	22	10
Liliaceae	39	22	32	29	20	9	14	7
Toplam Takson	1065	760	828	593	725	423	518	337

Araştırma alanımızda tür sayısı bakımından en büyük familyalar yukarıda verilmiştir. Buna göre en fazla tür içeren familyalar Leguminosae, Compositae ve Graminae'dir. Bu üç familyanın toplam tür sayısı 330 olup toplam floraya oranı yaklaşık % 31 dir. (Tablo 14)

**Tablo 14:** En fazla takson içeren 10 cinsin yakın bölgelerde yapılmış flora çalışmalarının karşılaştırılması

Araştırma Bölgeleri	Aşağı gediz H.	Orta Gediz Hav.	Murat Dağı	Manisa Dağı	Yamanlar D.	Yunt Dağı	Simav Dağı	Dumanlı Dağ
Trifolium	35	19	12	20	37	18	14	16
Vicia	16	18	5	6	10	7	5	4
Ranunculus	14	7	14	11	16	8	10	4
Silene	13	15	15	8	11	3	8	2
Euphorbia	13	4	7	6	1	5	5	2
Veronica	10	13	14	5	8	5	10	3
Anthemis	7	17	7	6	13	3	4	3
Centaurea	7	11	17	8	9	6	6	5
Alyssum	5	13	12	9	7	3	9	1
Astragalus	4	7	12	6	1	1	6	1

## 5.2 Endemizm

Ülkemiz sahip olduğu jeolojik ve jeomorfolojik özellikleriyle özgün bir yapıya sahiptir. Bu yapıya göre ülkemiz yer yer ovalar, platolar gibi düzlük alanlara sahip olsa da çoğunlukla dalgalı ve yüksek rakımlı bir yüzeye sahiptir. Bu arızalı arazi ise bir çok bölgede türlerin izole olmasını sağlarken türleşmeyi de beraberinde getirmektedir. Bunun yanında ülkemizin sahip olduğu eşsiz coğrafik konumu onun değerini bir kat daha arttırmaktadır. Ülkemiz Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması sebebiyle canlı türlerinin bir kıtadan diğerine geçebilmesini sağlayan doğal bir köprü konumundadır. Bu nedenle Anadolu coğrafyası hem flora hem de fauna bakımından çevresinde yer alan bir çok ülkeden daha zengin bir biyoçeşitliliğe sahiptir. Günümüz biyolojik çeşitliliğinin yanında Holosen öncesi dönemlerde de Anadolu meydana gelen iklim salınımlarında bir çok canlı türüne ev sahipliği yapmıştır. Örneğin Tersiyer 'de Anadolu'nun

günümüz tropik bölgelerini andıran oldukça yoğun bir bitki örtüsüne sahip olduğu bilinmektedir (Gemici vd.1986). Kuaterner'deki buzul hareketleri sırasında Avrupa kıtasındaki benzer flora çok büyük oranda ortadan kalktığı halde, Anadolu da buzullaşmanın etkileri daha az görüldüğünden, bir çok tür enklavlarda korunabilmiştir. Günümüzde bu türler ya olduğu gibi ya da yakın akrabaları ile devam etmektedirler. Türkiye Florası'nın (Güner vd. 2000) 11. cildine göre, 174 familya ve 1251 cinse ait 9222 doğal vasküler bitki türü bulunmaktadır. Ancak bu sayıya alt tür ve varyetelerin eklenmesi ile gerçek takson sayısı 12000'e yaklaşmaktadır. Endemik taksonların sayısı ise 3708 olup, floramıza oranı % 34,5 tir. Kısacası ülkemizde gördüğümüz her üç bitkiden birisi endemiktir.


Endemik taksonların ülkemiz coğrafyasına dağılımı incelendiğinde, en yüksek miktarda -endemik takson İç Anadolu'da bulunur ve bunu sırasıyla Doğu Anadolu, Güney Anadolu, Güneybatı Anadolu, Batı Anadolu, Güney Doğu Anadolu izlemektedir. Çalışma alanının da içinde bulunduğu Batı Anadolu ve Karadeniz bölgesi ise ülkemizde endemizmin çok yüksek olmadığı bölgelerdir.

Çalışma alanında yapılan floristik çalışmalar sonucunda tespit edilen 1065 taksonun 44 tanesi endemik (Tablo 15) olup toplam floraya oranı yaklaşık % 4,1 tür. Tüm Türkiye'de endemizm oranının %34,5 olmasına karşılık Aşağı Gediz Havzası'nda bu oranın % 4,1 olması bölgenin endemik türler bakımından oldukça fakir olduğunu göstermektedir. Zohary (1973) Türkiye'de alçak kesimlerde endemizm oranının düşük oluşuna dikkat çekmiştir. Ancak bu oranın düşük olmasının sebebi, çalışma alanının tarih öncesinden beri insan etkisi altında oluşu ve bir akarsu havzası olması nedeniyle sürekli bir devinim içerisinde oluşu ile direkt olarak ilgilidir (Tablo 15). Ayrıca havza bazında, endemizmi teşvik eden coğrafik izolasyonların olmayışı , endemizm oranını düşüren bir diğer özelliktir. Bu durum aşağıda detaylandırılmıştır.

**Tablo 15:** Aşağı Gediz Havzası ve yakın çevresinde yapılan araştırmalarda endemizm oranı

Araştırma Bölgesi	Aşağı Gediz Havzası	Orta Gediz Havzası	Yamanlar	Manisa Dağı	Yunt Dağı	Dumanlı Dağ
Takson sayısı	1065	760	725	593	423	337
Endemik takson	44	55	25	80	16	4
Endemizm (%)	4,1	7,2	4,85	13,5	3,78	1,18

Çalışma alanında endemizm oranının düşük olmasının nedenleri çeşitlidir. Öncelikle çalışma alanı olarak bir akarsu havzasının seçilmesi ve bu bağlamda genellikle rakımın ve eğimin düşük olması endemik taksonların sayısını düşürmektedir. Ayrıca çalışma alanında görülen iklimin saha boyunca benzer oluşu ve mikroklimaların olmayışı yine endemik takson sayısını düşürmektedir. Endemik sayısını etkileyen ikinci önemli etken ise, alanın devamlı surette insan etkisi altında kalmasıdır. Aşağı Gediz Havzası'nda yer alan Manisa ve İzmir Ovaları, ülkemizin en önemli tarım alanları olup sadece Manisa ovası Türkiye tarım ihtiyacının yaklaşık %7 sini karşılamaktadır (Manisa Tarım İl Müdürlüğü Raporu 2004). Çalışma alanında insan etkisinin bu denli fazla olması da bölgedeki doğal bitki örtüsüne önemli derecede zarar verirken, doğal bitkilerin azalması ile birlikte endemik bitkilerinde hem kalitatif hem de kantitatif olarak azalmasına sebep olmaktadır (Şekil 6).



**Şekil 6:** Familyalara göre endemik türlerin dağılışı.

Çalışma analında tespit edilen 44 endemik bitkiye ait risk grupları Türkiye'nin Kırmızı kitabı (Ekim vd. 2000)'nden faydalanarak tespit edilmiştir. Ve bu bitkilerin risk gruplarına göre dağılımı ise Tablo 16'da verilmiştir.

**Tablo 16** : Endemik taksonların risk gruplarına göre dağılımı

LR (lc)	LR(cd)	LR (nt)	VU	EN	DD	-
20	5	5	8	4	1	1

Bu bağlamda Aşağı Gediz Havzası florasında yer alan 8 takson VU (vulneriable), 4 takson ise EN (endangered) kategorisinde olup risk sınıfları yüksektir. Diğer endemik taksonlar ise henüz risk altında değildir ve özel önlem gerektirmemektedir (Tablo 17).

**Tablo 17** : Aşağı Gediz Havzası Endemik Bitkileri ve Tehlike Kategorileri

<b>Aşağı Gediz Havzası Endemik Bitkileri ve Tehlike kategorileri</b>		
Cruciferae	Hesperis balansae subsp.balanceae Boiss & Spruner in Boiss.,	EN
Caryophyllaceae	Dianthus lydus Boiss	LR (lc)
	Silene urvillei Schot.	VU
İllerberaceae	Paronychia chionaea	VU
Linaceae	Linum tmoleum Boiss.	LR(nt)
Rutaceae	Haplophyllum megalanthum Bornm İn Mitt.	EN
Leguminosae	Astragalus nervulosus Eig&Reese enend.,	VU
Umbeliferae	Ferulago humilis Boiss.	LR (lc)
	Ferulago asparagifolia Boiss in Ann.	
	Echinophora trichopylla J.E.Smith	LR (cd)
Compositae	Senecio bicolor (Willd.) Tod.	DD
	Centaurea polyclada DC.	VU
	Centaurea sylea Wagenitz.	EN
	Circium sipyleum O. Schwarz.	LR(lc)
Campanulaceae	Campanula lyrata subsp.lyrata Lam	LR (lc)
Asclepiadaceae	Vincetoxicum canescens subsp. pedunculata(Willd)Decne in DC.	VU
Scrophulariaceae	Verbascum napifolium Boiss	LR(cd)

	<i>Verbascum parviflorum</i> Lam	LR(lc)
	<i>Verbascum lydium</i> var <i>lydium</i> Boiss.,	LR(cd)
	<i>Verbascum antinori</i> Boiss. & Heldr. in Boiss	VU
	<i>Scrophularia scopolii</i> var. <i>smyrnaea</i> (Boiss.) Boiss	VU
	<i>Scrophularia libatonica</i> var. <i>mesogitana</i> (Boiss) Mill in Notes	LR(nt)
	<i>Scrophularia floribunda</i> Boiss.&Ball.	LR(nt)
	<i>Chaenorhium litorale</i> (Bernh)	LR(lc)
Boraginaceae	<i>Symphytum anatolicum</i> Boiss.	LR(lc)
	<i>Alkanna tubulosa</i> Boiss.	LR(lc)
Labiatae	<i>Phlomis nissolii</i> L	LR(lc)
	<i>Sideritis syplea</i> Boiss	LR(nt)
	<i>Stachys cretica</i> subsp. <i>smyrnaea</i> Rech.,	LR(lc)
	<i>Origanum sipyleum</i> L.	LR(lc)
	<i>Satureja parnassica</i> subsp. <i>sipylea</i> P.H.Davis in Notes.	LR(lc)
	<i>Thymus zygioides</i> var. <i>lycaonicus</i> (Celak.) Ronniger.	LR(lc)
	<i>Thymus sipyleus</i> subsp. <i>sipyleus</i> Boiss.	LR(nt)
	<i>Ziziphora taurica</i> subsp. <i>cleonioides</i> (Boiss) Davis .	LR(cd)
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia hirta</i> L.	LR(lc)
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cardiophylla</i> Boiss&Heldr in Boiss	LR(lc)
	<i>Euphorbia falcata macrostegia</i> (Bornm)O. Schwartz in Feddes	LR(lc)
Rubiaceae	<i>Gallium campanelliferum</i> Ehrend & Schönb.- Tem,	LR(cd)
	<i>Galium brevisfolium</i> subsp. <i>brevifolium</i> Sm in Sibth&Sm	LR(lc)
Liliaceae	<i>Allium proponticum</i> var. <i>proponticum</i> Stearn& Özhatay	LR(lc)
Amaryllidaceae	<i>Stenbergia schubertii</i> Schenk.	
Cyperaceae	<i>Carex distachya</i> var. <i>distachya</i> Desf.	VU
	<i>Carex divulsa</i> subsp. <i>coriogyre</i> (Nelmes) Ö.Nikson	LR(lc)
Graminae	<i>Bromus sipyleus</i> Boiss	EN



## 5.2 Vejetasyon

Aşağı Gediz Havzası doğal vejetasyonu, önemli derecede tahrip olmuştur. Bu tahribatın asıl sebebi, havzanın sahip olduğu verimli toprakların tarım alanı olarak kullanılmasıdır. Gediz Havzası'nın önemli bir kısmı yüzyıllardan beri tarım alanı olarak kullanıldığından, doğal bitki örtüsü kademeli olarak azalmış ve yerini kültür alanlarına bırakmıştır. Özellikle havzanın eğimi az olan kısımları, tamamen tarıma açılmış ve günümüzde de açılmaya devam etmektedir. Bu bağlamda araştırma alanında doğal bitki toplulukları, özellikle Gediz Nehri'nin kuzey kesimleri ile Manisa ve Yamanlar Dağlarının kısmen eteklerinde, Bozdağ'ın Turgutlu ve Salihli'ye bakan eteklerinde, ve kısmen Gölarmara ve Adala çevresinde gözlenebilmektedir.

Araştırma alanının flora ve vejetasyonu Gediz Nehri'nin denize döküldüğü en batı ucundan Gediz Nehrinin doğduğu doğu istikametine doğru gidildikçe, kısaca denizden uzaklaşıldıkça belirgin bir şekilde değişmektedir. Kıyı kesimlerde *Quercus coccifera*, *Paliurus spina christi*, *Pistacia lentiscus* gibi maki elementleri geniş topluluklar oluştururken, doğruya doğru gidildikçe bu türlerin yerlerini *Quercus ithaburensis*, *Quercus infectoria* gibi karasal türlerin alması bu görüşü de doğrulamaktadır.

Çalışma alanımızda vejetasyonu şekillendiren en önemli faktör ise Gediz Nehri'dir. Kütahya'da bulunan Murat ve Şaphane Dağları'ndan doğarak yaklaşık 401 km kat ederek Ege Denizi'ne dökülen bu nehir, taşıdığı alüvyonlar ile havzada edafik özellikleri değiştirirken, sağladığı nem ile ortamın iklimik özelliklerini de değiştirmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı da alanda hem karasal hem de sucül ekosisteme ait bitki birliklerini görmek mümkün olmaktadır.

Hem vejetasyonda görülen bu çeşitlilik hem de alanın bir geçiş bölgesi olması bölgede yapılan sintaksonomik olarak yorumlanmasını güçleştirmektedir. Ancak elde edilen bulgulara göre, araştırma alanı fitocoğrafik olarak Akdeniz Floristik bölgesinde yer almaktadır. Akman, Barbero ve Quézel (1979) Akdeniz bölgesinin bitki coğrafyası ve yüksekliğe bağlı olarak ; vejetasyon katları düzenine göre buldukları katlar aşağıdaki gibidir.

- Sıcak Akdeniz Katı (0 – 100 m'ler arasını kapsar.)
- Akdeniz Katı : (100-1000 m ler arasını kapsar.)
- Prestepik Akdeniz katı (Stepe yakın çevreyi kapsar)
- Üst Akdeniz katı : 1000-1500 m ler arasını kapsar.

- Akdeniz Dağ Katı 1500-2000 m ler arasını kapsar
- Subalpin kat ; 2000 m den sonrasını kapsar.

Bu sınıflandırmaya göre araştırma alanı sadece Sıcak Akdeniz Katı ile Akdeniz Katına girmektedir. Bunun sebebi ise, yapılan arazi çalışmalarında sadece havzanın su toplama alanı olarak nitelendirilen ve yaklaşık olarak 500 m ye kadar ulaşan bir kısım incelenmiş olmasıdır. Bundan dolayı da araştırma alanı içerisinde yer alan ve yükseltileri 1000 m yi geçen dağların sadece havzaya bakan etekleri çalışmaya dahil edilmiştir. Bununla birlikte genel vejetasyon bölümünde vejetasyon katları şematik olarak gösterilmiştir. (Bkz. Şekil 3)

Quézel (1978) Batı ve Güney Anadolu'da çalı ve orman gruplarının iki sınıf altına toplamıştır. Bunlar ***Quercetea ilicis*** ve ***Quercetea pubescentis***'tir. ***Quercetea ilicis*** sınıfı Yunanistan'dan Yakın Doğu'ya kadar Doğu Akdeniz Havzası'nın kıyı şeridi üzerinde yayılış gösterir ve tek bir ordo ( ***Quercetalia ilicis***) ile temsil edilir. ***Quercetea pubescentis*** ise coğrafi olarak ayrılan iki ordo ile temsil edilir. Bunlar da ***Quercetalia orientalis*** ve ***Quercetalia libani*** dir. Bu sınıflandırmaya göre Araştırma alanı içerisinde bulunan bitki birlikleri daha çok ***Quercetea ilicis*** sınıfına dahil edilmiştir. Bununla birlikte, çalışma alanımızın anakaya ve toprak özellikleri nedeniyle, ***Quercetalia ilicis*** ordosu alyans düzeyinde yeterince temsil edilmemektedir. Bunun bir diğer nedeni de çalışma alanımızın yer aldığı İzmir havalisi, bir çok sintaksonomik ünitenin geçiş zonunda yer almasıdır.

Araştırma alanında 3 formasyona ait 8 bitki birliği tanımlanmıştır. Bu 8 birliğin 3'ü ise ilk kez bu çalışmada tanımlanmıştır. Tespit edilen bu bitki birliklerinin daha önce yakın çevrede yapılan araştırmada tespit edilen birlikler ile karşılaştırılması aşağıdadır.

### 5.2.1 *Ceratophylletum demersi* (Hild 1947) Birliği

Bu birlik durgun tatlı sularda gelişen bir sucul vejetasyon tipidir. Ülkemizde Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak görülebilmektedir. Bu birliğin karakteristik türü *Ceratophyllum demersum*'dur. Ülkemizde iki türü bulunan *ceratophyllum*'ün diğer türü *C. submersum*'dur. *Ceratophyllum submersum*'ün *C. demersum*'dan farkı, yaprakların bir veya iki kez çatallanmasıdır. *C. demersum* da ise yapraklar 3 veya 4 kez çatallanmaktadır.

Araştırma alanı içerisinde özellikle Gölarmara da tespit edilen bu birlik az da olsa Gediz Deltası'nda da görülmektedir. Yaşam ortamı durgun sular olan bu birlik özellikle kıyıda uzaklaştıkça homojen bir halde bulunurken, göl ve dere kıyılarında ***Phragmitetum communis*** topluluğu ile karışmaktadır (Tablo 5).

Biyoiklim bakımından yarı nemli ve kurak Akdeniz iklim katında bulunan bu sucul birlik genellikle sığ suları tercih etmektedir. Marmara Bölgesi sulak alanlarının bitki örtüsü üzerine incelemeler yapan Seçmen ve Lelebici (1994) bu birliği Bursa Gölyazı'nda bulunan Ulubat Gölü'nde tespit etmişlerdir. Bu çalışmada bu birlik göl kenarında yer alan *Phragmites* ve *Schoenoplectus*ların arasında ve açıklıklarında görmüşlerdir. Yine bu çalışmada bazı alanlarda saf topluluklar yapan *ceratophyllum* lar bazı alanlarda *Myriophyllum spicatum* ve *Potamogeton lucens* ile tespit edilmiştir.

Beyşehir gölünde yapılan sucul vejetasyon çalışmasında da ( Küçükgöçük& Ketenoğlu 1996) *Ceratophyllum demersi* birliği tespit edilmiş olup, buradaki birliğin örtüşü % 90-100 su üstü katı örtüşü %5-10 olarak belirtilmiştir. Beyşehir gölünde bulunan bu birliğin karakteristik türleri *C. demersum* ve *Potamogeton crispus*'tur. Bu birlikte genellikle submers bitkilerden oluşup az miktarda emers bitkilerde bulunmuştur. Göl suyunun asiditesi ise 7,90 olarak tespit edilmiştir.

Çalışma alanında yapılan çalışma da ise su derinliği 20 ile 100 cm arasında değişen derinliklerde ve suyun asiditesi (pH): 6,8- 7,5 arasında bulunan alanlarda tespit edilen bu birliğin karakteristik türü olarak *Ceratophyllum demersum* tespit edilmiş olup sintaksonomik olarak ***Potametea*** sınıfı ve ***Potametalia*** ordosuna bağlanmıştır. Bu birliğe az sayıda ***Phragmitetea*** ve ***Lemnetea*** sınıfına mensup türlerde katılmaktadır.

### 5.2.2 *Phragmitetum communis* (Schumale 1939) Birliği

Bu topluluk, sucul vejetasyon tipi olup hem su kenarında hem de su içerisinde yaşayabilen ekolojik toleransı geniş bir birliktir. Bu birlik genellikle tatlı su kenarlarında yaşarken sık sık tuzlu su kenarlarında ve deniz kenarlarında da topluluklar oluşturmaktadır. Bu birliğin karakteristik türü *Phragmites australis*' tir. Uzun zaman *P. communis* olarak isimlendirilen bu bitkinin adı 1990'lı yılların sonuna doğru değiştirilerek *P. australis* olarak değiştirilmiştir. Ancak birliğin adı, türün eski adıyla *Phragmitetum communis* olarak kullanılmaya devam edilmektedir.

Araştırma alanı içerisinde özellikle Gediz Nehri boyunca topluluklar oluşturan bu birlik yoğun olarak Ayvacık ve çevresinde, Gölarmara kıyılarında, Gediz Deltası'nda ve Gediz'in denize döküldüğü ağızda en iyi şekilde temsil edilmektedir. Bunun dışında bu birlik taban suyunun yüksek olduğu ve sulama kanallarının bulunduğu bir çok tarım arazisinde de tespit edilmiştir. Yaşam ortamı su bakımından zengin alanları tercih eden bu tür, su içinde, kenarında, kuruyan ve kurumayan bataklıklarda rahatlıkla yetişebilmektedir. *Phragmites australis*, rizomlu ve kuvvetli bir gövdeye sahip olan bir bitki türü olup kapalılık yüzdesi de bir hayli yüksektir. Bu nedenle bu birlik tür sayısı bakımından fakirdir. (Tablo 6)

Beyşehir Gölü'nde yapılan çalışmaya göre (Küçükgödük v.d., 1996) bu birlik emers vejetasyon birliği olarak tespit edilmiş ve örtü durumunun % 80-100 arasında olduğu, su altı örtüsünün ise %5-20 arasında değiştiği rapor edilmiştir. Derinliğin 200 cm olduğu yerlerden kıyıda su çekilmiş nemli topraklara kadar gölün her yerinde geniş gruplar halinde yayılış gösterdiği ve birliğin karakteristik türünün *Phragmites australis* olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca *phragmites* ile benzer habitatlarda yaşamını sürdüren, *Thypha angustifolia*, *Schoenoplectus lacustris*, *Oenanthe aquatica*, *Alisma gramineum* ve *Sparganium erectum* gibi türlerle de karışık topluluklar oluşturduğu söylenmiştir.

Marmara Bölgesi sulak alanlarının bitki örtüsü üzerine incelemeler yapan Seçmen ve Leblebici (1994) aynı birliği, İznik civarında göl kıyısında tespit etmiştir. Bu çalışmada *phragmites* birliği suyun içinde bulunmuştur. Bu örnek alanlarda bu türe eşlik eden bulunuşu yüksek türler; *Potamogeton pectnatus*, *Utricularia australis*, *Myriophyllum spicatum*, *Ceratophyllum demersum*, gibi **Potametea** ve **Ceratophylletea** sınıfına ait bireylerdir. Aynı zamanda bu birlikte, *Schoenoplectus littoralis*, *Sparganium erectum ssp. neglectum* gibi **Phragmitio-Magnocaricetea** sınıfına ait türler az da olsa eşlik etmektedir. Özcan ve Leblebici (1994)' e göre *Schoenoplectus littoralis* birliği de *Phragmites* birliği ile aynı floristik bileşimi göstermektedir. Kıyıda 25-50 cm derinlikteki suda rastlanan bu birlikte **Potametea** sınıfına ait bitkilerin çoğunlukta olduğu görülmektedir.

Ayrıca Seçmen ve Leblebici (1994) yaptıkları çalışmalarda Sapanca Gölü'nde *Phragmites australis*'in *Typha angustifolia* ile karışık olarak bulunduğu **Typho angustifoliae – Phragmitetum australis** birliği ile Tekke Gölü'nde de *phragmites*'in *Schoenoplectus lacustris* ile karıştığı; **Scirpio lacustris –Phragmitetum** birliğini tespit etmişlerdir.

Braun-Blaunquet ve arkadaşları da Akdeniz tatlısu göllerini, nehirlerini araştırmışlar ve bu bölgelerde yayılan bitki birliklerini sınıflandırmışlardır (Braun-Blanquet 1932). Ayrıca Golub ve arkadaşları aşağı Volga Vadisi'nin akuatik vejetasyonunu da tespit etmişlerdir (Golub vd. 1991). Araştırma bölgesinde tespit edilen *Phragmites* birliğinin fitososyolojik sınıflandırılması yapılırken bu çalışmalardan da faydalanılmıştır.

Buna göre *Phragmitetum communis* birliği göl kenarları ve yavaş akıntılı nehir kenarlarında, kuzey yarı kurenin Boreal alanında yaygın olan ***Phragmitetea*** sınıfının ***Phragmitetalia*** ordosuna bağlanmıştır. Araştırma alanında tespit edilen bu birliğe, ***Potametea*** sınıfından; *Potamogeton crispus*, *Ranunculus sphaerospermus*, *Lemna minor*, *Ranunculus paludosus*, ***Phragmitio- Magnocaricetea*** sınıfından; *Schoenoplectus lacustris*, *Thypha latifolia*, *Alisma plantago-aquatica* ve ***Ceratophylletea*** sınıfından *Ceratophyllum demersum* katılmaktadır.

### 5.2.3 *Arthrocnemo- Halocnemetum strobilacei* (Oberd 1957) Birliği

Tuzlu topraklar, bitki gelişiminin ekstrem olarak gerçekleştiği ortamlardır. Çünkü çok az bitki türü tuzlu alanlardaki koşullara fizyolojilerini uydurabilecek yetenekleri kazanabilmişlerdir. Denizden uzaklaştıkça topraktaki NaCl oranı giderek bir azalma gösterir ve bu da halofit vejetasyonun saha üzerindeki yayılışını belirler. Burada tuzluluk ile birlikte rol oynayan diğer bir etmen ise kötü havalandırmadır (Öztürk vd. 1996). Tüm bu nedenlerden dolayı halofit bitkiler özel karakterleri olan bitkilerdir. *Arthrocnemum fruticosum* da tipik bir halofittir. Sukulent yapısıyla yaklaşık göze çarpan bu bitki deniz kıyılarında, tuzlu bataklıklarda en sık astlanan bitkilerden birisidir.

Araştırma alanında özellikle Gediz Deltası ve Homa Dalyanı çevresinde yayılış gösteren bu birlik önemli bir tuzcul birlik olup günümüze kadar çok detali olarak çalışılmamıştır. Bu birlik ile ilgili olarak Uslu (1977, 1978, 1985) çalışmaları vardır. Ege ve Akdeniz sahillerini kapsayan bu çalışmalarda araştırmacı özellikle kıyı kumul birlikleri üzerine incelemeler yapmış ve genel olarak *Arthrocnemum fruticosum*'u saf bir bitki birliği olarak kabul etmiştir.

Seçmen ve Leblebici (1996) bu birliği, Balıkesir ilinin Gönen ilçesinde deniz seviyesinde bulunan Tahir gölünün çevresinde bulmuşlardır. Bu araştırmaya göre, ***Arthrocnem* – *Halocnemetum strobilacei*** birliği Tahir Gölü çevresinde bulunan ve denizle bağlantısı olan

lagünlerin çevresindeki tuzlu bataklıklarda tespit etmişler ve bu birliğin *Salicornia europea* ve *Halocnemum strobilaceum*'un oluşturduğu saf topluluklar ile karıştığını rapor etmişlerdir. Seçmen ve Leblebici, bu birliğin karakteristik türleri olarak *Halocnemum strobilaceum* ve *Arthrocnemum strobilaceum* tespit ederken üst birim karakterleri olarak, *Hordeum marinum var. marinum*, *Halimione portulacoides* ve *Limonium angustifolium* olarak belirtmişlerdir.

Çalışma alanında yapılan birlikte, Özcan ve Leblebici'nin bulgularına karşılık, karakteristik türler, *Arthrocnemum fruticosum* ve *Halocnemum strobilaceum* olarak tespit edilmiş olup, eşlik eden türlerden başlıcaları ise, *Salicornia europea*, *Hordeum marinum var. marinum*, *Halimione portulacoides*, *Salsola kali*, *Sueda prostrata var. prostrata*, *Chenopodium murale*, *Salsola soda* vd. olarak tespit edilmiştir ve sonuç olarak bu birlik **Arthrocnemetea** sınıfının **Arthrocnemetalia fruticosi** ordosuna bağlanmış fakat alyans düzeyinde bir ayrıma gidilmemiştir. (Tablo 7).

#### 5.2.4. Tamaricetum symrnensi (Seçmen&Leblebici 1994)Birliđi

İlgın adı ile bilinen *tamarix* türleri *Tamaricaceae* ailesinin üyeleri olup tuzlu toprakların karakteristik türleridir. Genellikle denize yakın tuzlu, bataklıklarda, çamurlarda ve düzlüklerde yetişen bu türler sahip oldukları glandular yapı ile topraktan aldıkları tuzu sekresyon şeklinde dışarı vermektedirler. Ülkemizde geniş bir yayılıma sahip bu tür özellikle, delta ve lagünlerde topluluklar oluşturmaktadır.

Bu birlik, Seçmen ve Leblebici (1996) tarafından Bursa Gölyazı'da 10 m yükseklikte bulunan Ulubat gölü çevresinde yer alan tuzlu topraklarda tespit edilmiş ve ilk **Tamaricetum symrnensi ass.nova** olarak isimlendirilmiştir. Yapılan çalışmaya göre bu birlikte gölün diğer birliklerinde yer almayan tuzcul karakterli tespit edilmiş ve birliğin karakteristik türleri olarak; *Tamarix symrnensis*, *Salosola soda*, *Bromus hordaceus var. thominii* tespit edilmiştir.

Uslu (1985), Büyük Menderes ve Küçük Menderes Havzaları'nda yaptığı çalışmalarda *Tamarix symrnensis* türünü tespit etmiş ancak birlik olarak irdelememiştir. Bunun yanında Durmuşkahya (2000) Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası'nda yaptığı çalışmada özellikle Dil Gölü çevresinde yoğun olarak bulunan *Tamarix symrnensis* topluluklarından bahsetmiş ancak fitososyolojik olarak konuyu incelememiştir.

Araştırma alanında bu birlik özellikle Gediz Deltası'nın güney kısmında bulunmuş olup, karakteristik ve ayırt edici türler olarak, *Tamarix symnensis* ve *Salsola soda* tespit edilmiştir. Ve birliğin üst birim karakteristikleri olarak da; *Halimione portulacoides*, *Hordeum marinum* var. *marinum*, *Juncus maritimus*, *Limonium sinuatum*, *Atriplex laschanta*, *Salicornia europea* ve *Arthrocnemum fruticosum* türleri bulunmuştur. **Tamaricetum symnensi** (Seçmen & Leblebici 1994) bu çalışmada **Arthrocnemetea** sınıfının **Arthrocnemetalia fruticosi** ordosuna bağlanmış fakat alyans düzeyinde bir ayrıma gidilmemiştir (Tablo 8).

### 5.2.5 Paliuro-Quercetum cocciferae (Çetin 2003) Birliği

Maki vejetasyonu, Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde görülen tipik bitki örtüsüdür. Derin bir kök sistemi, su kaybını engellemek için derimsi ve üzeri kalın bir kutikula ile kaplı yapraklar ve bazı türlerde dikenleşmiş yapraklar bu vejetasyonun en karakteristik özellikleridir. Ülkemizde batı ve güney Anadolu'da yaygın olan bu vejetasyonun en önemli elementi *Quercus coccifera* olup bu tür özellikle kıyı şeridinde çok yaygındır. Bu bitkin oluşturduğu topluluklar, Batı Anadolu'da Uşak'a kadar ulaşmakla birlikte, üst sınır olarak yaklaşık 700 m yüksekliğe ulaşırken Güney Anadolu'da ise 1200-1300 m ye kadar çıkabilmektedir.

Maki değişik araştırmacılar tarafından farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Kimi bilimadamları bu formasyonu sekonder olarak nitelendirirken, kimileri de makinin Akdeniz bölgesinin klimaks vejetasyonu olduğunu savunurlar. (Gemici 1981) Araştırma alanında da bazı korunmuş bölgelerde özellikle *Quercus coccifera*'nın boylu ağaç haline geldiği tespit edilmiş ancak bu vejetasyon tipinin klimaks bir topluluk mu yada sekonder bir topluluk olduğuna karar verilememiştir.

Bu birlik Aşağı Gediz Havzası'nda genellikle kıvılcamın tahrip edildiği bölgelerde ortaya çıkmaktadır ve araştırma sahasında; Gediz Nehri'nin güney kısmında yer alırken ağırlıklı olarak Emiralem – Ayvacık çevresinde, Manisa Dağı'nın doğu yamaçlarında, Turgutlu, Ahmetli ve Salihli çevresindeki sırtların kuzeye bakan yamaçlarında görülmektedir. Yapılan vejetasyon çalışmalarında bu birlik 30 ile 364 m arasında tespit edilmiştir (Tablo 9).

Ülkemizde *Quercus coccifera* toplulukları hakkında yapılmış bir çok çalışma vardır. Zohary (1973) bu birliği, **Querceta calliprini** sınıfının **Quercetalia calliprini** ordosundan

**Quercion ilicis** alyansına dahil etmiştir. Seçmen 'de (1977) bu birliği aynı şekilde değerlendirmiştir. Bekat'da (1980) yılında Karaburun'da yaptığı çalışmada bu birliği **Quercion ilicis** alyansına bağlamıştır.

*Quercus coccifera*, Batı ve Güney Anadolu'da, vadilerden yararlanarak Prestepik Akdeniz Katına kadar sokulabilmektedir. (Akman vd. 1979) Bu son kesimde tür açıkça yarı kurak biyoklimatik bir çevrede bulunmaktadır. Orta Anadolu'ya yerleşen bu kat, aşırı erozyon, şiddetli sel ve aşırı buharlaşma gibi nedenlerle, az yağışlı kata yaklaşabilir (Akman vd. 1979 ).

Gemici (1981) Yamanlar Dağı'nda yaptığı çalışmada, birliğin **Quercetalia (ea) ilicis**'e bağlılığını kesin olarak kabul ederken, birliğin alyans düzeyinde yorumunu yapmanın güç olduğunu söyleyerek, birliğin fitosoyolojik yerinin iki alyans arasında kaldığını ve tartışmalı olduğu belirtmiştir.

Bu birlik biyoiklim bakımından yarı kurak, az yağışlı ve yağışlı Akdeniz katında yayılış göstermektedir. Çelik (1995 ) ve Uğurlu (2005) bu birliği genel olarak kalker anakaya üzerinde gelişen kahverengi orman toprakları üzerinde tespit etmişler ve bu toprakların A, B, C horizonlu olduğunu ancak horizon sınırları net bir şekilde belirli olmadığını ifade etmiştir. Gemici (1981) ise bu birliğin çoğunlukla andezit ve kısmen kalker anakaya üzerinde bulunduğunu, ve toprak yapısının killi- tın olduğunu rapor etmiştir. Araştırma alanın içerisinde kalan Yunt Dağı'nda vejetasyon çalışması yapan Şık (1992) ise böyle bir birliğin varlığından bahsetmemiş, mevcut *Quercus coccifera*'ların bir kısmını *Sarcopoterium spinosum* birliği içinde değerlendirmiştir. Çalışma alanında bulunan *Quercus coccifera* birliği daha çok Gemici (1981) in bulgularına benzemekle birlikte genellikle andezit anakayalar üzerinde bulunan killi – tınlı ve kumlu tınlı topraklarda bulunmaktadır.

Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda, *Quercus coccifera* birliğinin toprak özellikleri bakımından çok seçici davranmadığı ortaya çıkmaktadır.

Paliuro – Quercetum cocciferae birliği ilk kez Çetin (2003) tarafından Boncuk Dağları'nda tespit edilmiştir. Ancak bu birlik Gemici (1986) tarafından Çivril Akdağ' da tespit edilen *Quercus coccifera* birliği ile benzerlikler göstermektedir. Gemici bu birliği, şist anakayalar üzerinde belirlemekle birlikte, *Quercus coccifera*, *Paliurus spina-christi*, *Origanum onites*, *Fumana arabica var.arabica* ve *Cyclamen mirabile*'yi karakteristik türler olarak belirlemiştir. Çetin ise, kalker anakaya üzerinde belirlediği birlikte benzer şekilde *Paliurus spina-christi*,



*Origanum onites*, *Fumana arabica var.arabica*'yı karakteristik türler olarak tespit etmiştir. Her iki birliğin bünyesinde de ***Onobrychido armenae***, ***Thymelia leucostomi*** ve ***Astragalo- Brometea*** karakteristiklerinin fazla olması, İç Anadolu step geçiş bölgesinde bulunmasının bir sonucu olduğuna bağlanmıştır. Buna göre topluluğun ve birliğin baskın türüne göre bir yorum yapılarak her ikisi de ***Quercetalia (etea) ilicis*** ordo ve sınıfına dahil edilmiş, alyans düzeyinde ise bir ayrıma gidilmemiştir.

Uğurlu (2005) da Orta Gediz Havzası'nda yaptığı çalışmada ise, aynı birliği tespit etmiş olup, Gemici'den farklı olarak tespit ettiği birlikte ***Onobrychido armenae***, ***Thymelia leucostomi*** ve ***Astragalo- Brometea*** karakteristiklerinin daha az bulmuş bunu da birliğin diğerlerinden farklı olarak sıcak yağışlı alt Akdeniz katında bulunmasına bağlamıştır.

Gemici, Çetin ve Uğurlu'nun yaptığı çalışmalarda tespit edilen *Quercus coccifera* birliğinde ***Onobrychido armenae***, ***Thymelia leucostomi*** ve ***Astragalo- Brometea*** karakteristikleri bulurken Aşağı Gediz Havzası'da bulduğumuz *Q.coccifera* birliğinde bu sınıflara ait karakteristik türlerin bulunmayışı bu bölgede bulunan *Q. coccifera* birliğini diğerlerinden farklı kılmaktadır. Bu farklılığın sebebi ise, çalışma alanının diğer bölgelere göre daha sıcak Akdeniz katında bulunması ve deniz etkilerinin alanda hissedilmesi şeklinde yorumlanmıştır. Bu birlikte tespit edilen, ***Chenopodietalia (ea) mediterranea***, ***Querceteapubecentis*** ve ***Cisto- Micromeritalia(ea)***'nın karakteristikleri de bu görüşü desteklemektedir.

Akman (1995) Akdeniz'de bulunan *Quercus coccifera* birliklerini genel olarak ***Quercetalia (etea) ilicis*** sınıf ve ordosuna bağlı ***Quercion calliprini*** (Zohary 1973) alyansına bağlamıştır. Akman vd. (1974) Barla Dağı'nda yaptıkları çalışmalar sonucunda bu birliği ***Querceta pubecentis*** sınıfına bağlı ***Quercu- Cedretalia libani*** ordosuna dahil edilebileceğini ifade etmişlerdir. Bekat (1992) yılında Acıpayam – Bozdağ'da yaptığı çalışmalarda bu birliği ordo düzeyinde ***Quercu- Cedretalia libani*** ordosuna dahil etmiş ancak alyans düzeyinde sınıflandırma yapmamıştır. Uğurlu (2005) ise bu birliği ***Quercetalia (etea) ilicis*** sınıf ve ordosuna dahil etmiş ancak alyans düzeyinde bir ayırım yapmamıştır.

Çalışma alanında tespit edilen bu birlik ***Chenopodietalia (ea) mediterranea***, ***Quercetea pubescentis*** ve ***Cisto –Micromeritalia (ea)*** karakteristikleri baskın olup ***Quercetalia (ea) ilicis*** sınıf ve ordosuna dahil edilmiş ancak alyans düzeyinde bir ayrıma gidilmemiştir.

### 5.2.6. Asphodelo – Sarcopoterietum spinosi ass.nova Birliđi

*Sarcopoterium spinosum*, Rosaceae familyasından olup dikenli ve yastıkçık oluşturan bir kserofitik türdür. Frigana adı verilen vejetasyon tipinin en karakteristik türü olup, kızılçam ve makinin tahrip olduđu, çok az bitki türünün yaşayabildiđi çıplak arazilerde yayılış gösterebilen ekolojik toleransı geniş bir türdür.

Frigana, kısaca, Akdeniz Bölgesi'nde genellikle deniz etkisinin hissedilebildiđi ve çeşitli nedenlerle tahrip edilmiş alanlarda ortaya çıkan ve çoğunlukla yastıkçık oluşturan bitki türlerinden oluşan bir topluluktur. Yunanca, *phrygana*, Fransızca *garigue*, İspanyolca *tormillares* olarak isimlendirilen bu vejetasyon türüne ait ülkemizde yapılmış çok sayıda çalışma yapılmasına rağmen bu birliđin fitososyolojik yapısı yeterince irdelenmemiştir.

*Sarcopoterium spinosum* ile ilgili olarak, Akman (1973), Uslu (1977), Seçmen & Leblebici (1978), Bekat (1980), Gemici (1981), Şık (1992), Oluk (1999) ve Durmuşkahya (2000) çalışmalar yapmışlardır.

*Sarcopoterium spinosum*, ülkemizde Batı ve Güney Anadolu kıyı kesimlerinde, daha çok denize bakan yamaçlarda ve deniz etkisi alan iç kesimlerde yayılış göstermektedir. Daha çok bölgenin klimaks topluluklarından olan *Pinus brutia*'nın veya makinin tahrip edilmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Bu tür ile yapılan çalışmalar sonucunda türün ve buna bađlı olarak bu birliđin toprak bakımından çok seçici olmadığı ortaya çıkmaktadır. Akman (1973) tarafından Amanoslar'da yapılan çalışmada 0-400 marasında tespit edilen *Q.coccifera* birliđi marnlı anakayalar ve killi tın bünyeli topraklarda tespit edilmiştir. Zohary (1973) ise redzina ve fakir kahverengi orman topraklarında, Seçmen ve Leblebici (1978) çoğunlukla kalker kayalarda ve kumlu – tın bünyeli, organik madde bakımından fakir topraklarda Uslu (1985) kalker anakaya ve kırmızı Akdeniz topraklarında, Seçme vd. (1986) andezit anakaya ve kireçsiz kahverengi topraklarda, Oluk (1999) kalker anakaya üzerinde kireçli redzina topraklarda tespit etmiştir.

Araştırma alanında ise bu birlik, genellikle kalker ana kaya üzerinde kireçsiz kahverengi topraklarda tespit edilmiştir. Ancak Ayvacık ve çevresinde anakaya andezit olmakla birlikte bu

birliğin bu tip edafik koşullarda da aynı şekilde yetişebildiği gözlenmiştir. Menemen – Foça yolu üzerinde açılan profile göre, toprağın A horizonu 20-30 cm kalınlığında, kahverengi renkte, bünye killi tın olarak tespit edilmiştir. Profilde serbest CaCO<sub>3</sub> e rastlanmamıştır. Kök dağılımı çöktür. B horizonu ise, 30-35 cm kalınlıkta, soluk kahverengte olup, bünyesi killi-tındır. Blok halinde görülen bu horizontta iri çakıllara rastlanmaktadır. Kök dağılımı az olup serbest CaCO<sub>3</sub>'e rastlanmamıştır. C horizonu, andezit karakterde olup rengi beyazdır. Bünye killi olup yapısı masiftir.

Bu birliğin Fitososyolojik yapısına bacak olursak, bölgede 1936 yılında Yamanlar Dağı'nda andezit ve kireçsiz kahverengi orman toprakları üzerinde bulunan *Sarcopoterium spinosum* topluluklarını "Frigananın bozulmasıyla ortaya çıkan vejetasyon" başlığı altında inceleyen Schwarz adlı bilim adamı birliği fitososyolojik bakımdan incelememiştir.

Raus (1969) bu birliğin oksijençe fakir ve killi ya da tınlı topraklara karşı ekolojik bir seçiciliği olduğunu, buna karşın kendine özgü floristik bileşiminin olmadığı için birlik olarak değerlendirmenin zor olacağını bildirmiştir (Gemici 1981).

Karaburun Yarımadası'nda kalker anakaya üzerinde gelişen redzina ve kırmızı Akdeniz toprakları üzerinde yayılış gösteren birlik (Bekat 1980) tarafından ***Sarcopoterietea spinosi*** sınıfına dahil edilmiş ancak alyans düzeyinde sınıflandırmaya gidilmemiştir.

Gemici (1981) Yamanlar dağında daha önce Schwarz (1936) tarafından çalışılan toplulukları yeniden değerlendirmiş ve andezit kayalar üzerinde yayılış gösteren topluluğun bünyesinde ***Cisto-Micromerietea*** karakterlerinin azlığından, fakat buna karşılık ***Chenopodietea mediterranea*** karakteristiklerinin önemli miktarda bulunduğundan söz etmiştir.

Uslu (1985) Büyük ve Küçük Menderes Havzaları'nda gerçekleştirdiği çalışmalarda, kalker anakayalar ve Kırmızı Akdeniz Topraklar üzerinde bulunan birliği net bir ayırım yaparak, ***Cistion orientale*** alyansı, ***Cisto-Micromeritalia*** ordosu ve ***Cisto-Micromerietea*** sınıfına dahil etmiştir.

Köyceğiz – Dalyan (Muğla) da kalkerli substratlar üzerinde bulunan bu topluluk Vural vd. (1995) tarafından incelenmiş ve **Coridothymion** alyansı ile bu alyansın dahil edildiği üst ünitelere dahil edilmiştir.

Seçmen vd. (1985) İzmir yöresi frigana vejetasyonunu bitki sosyolojisi yönünden ele almış ve bu bölgede görülen *Sarcopoterietum* birliklerini net bir ayırım yaparak **Quercetalia ilicis** (Br.-Bl. 1947) ordosuna ait olduğunu, alyans düzeyinde ise **Quercion ilicis** (Br.-Bl. 1937) ve **Oleo-ceratonion** (Br.-Bl. 1937) alyanslarına bağlamıştır.

Şık (1992) Yunt Dağı'nda yaptığı çalışmada bu birliğin andezit kayalar üzerinde bulunduğunu ve **Quercetalia (etea) ilicis** (Br.-Bl. 1937) ordo ve sınıfına dahil etmiş ancak alyans düzeyinde bir sınıflandırma yapmamıştır.

Oluk (1999) Denizli Babadağ 'da yaptığı çalışmada kalker anaya üzerinde bulunan kireçli topraklarda gelişen bu birliği **Genisto acanthocladae – Sarcopoterietum spinosii** (Oluk 1999) olarak isimlendirerek **Quercetalia (etea) ilicis** (Br.-Bl. 1937) ordo ve sınıfına dahil etmiş, ancak alyans düzeyinde bir sınıflandırma yapmamıştır.

Araştırma alanında Akdeniz katında bulunan bu birlik çoğunlukla andezit kayalar üzerinde bulunmakla birlikte aşırı tahrip edilmiş alanlarda baskın durumda gözlenmektedir. Bu nedenle bu birliğin kızılcımanın veya makinin tahribinden sonra ortaya çıktığı tam olarak belirlenememiştir. Araştırma alanı içinde yer alan birlik, Gemici (1981) ve Şık (1992) tespit ettiği birliklere benzer özelliktedir. Ancak bu birlikte örnek alanlarda *Sarcopoterium spinosum*'un yanında çok sık gözlenen *Asphodelus aestivus*, karakteristik tür olarak kabul edilerek **Asphodelo-Sarcopoterietum spinosi ass. nova** olarak isimlendirilmiştir. (Tablo 10)

Bu birlik, **Quercetalia (etea) ilicis** (Br.-Bl. 1937) ordo ve sınıfına dahil edilmiştir ancak alyans düzeyinde bir sınıflandırmaya gitmek uygun görülmemiştir.

Birlikte, **Cisto-Micromeritalia (ea)** sınıfında temsil edilirken, ekolojik toleransı yüksek olan ve bu sınıfın karakteristiklerinden; *Cistus creticus*, *Ballota acetobulosa*, *Cistus salviifolius*, *Origanum onites*, *Coridothymus capitatus*, *Micromeria graeca*, *Helianthemum silacifolium*

türlerine sıkça rastlanmıştır. Ayrıca bu birlikte ***Chenopodietalia(ea) mediterranea*** sınıfı ve ***Oleo ceratonion*** alyansının karakteristik türlerine de rastlanmaktadır.

### 5.2.7. Lino- Pinetum brutiae ass.nova Birliđi

Batı Anadolu'nun en yaygın ağaç türlerinden biri olan *Pinus brutia*, genelde Jura ve Kretase kalkerler üzerinde yayılış göstermektedir. Başlıca anakaya tipleri, marn, kalkerli kumtaşları, traverten gibi tortul kayalar ile peridotit, diyabaz ve serpantin gibi mađmatik kayalardır. Ayrıca fliş ve alüvyal depolar üzerinde de kızılçam topluluklarına sıkça rastlanmaktadır. Bu türün toprak tipi bakımından pek fazla seçici olmayıp hemen hemen bütün toprak tipleri üzerinde yayılış göstermektedir.

*Pinus brutia* toplulukları araştırma alanında içinde bulunduğu Ege Bölgesi'nde dađların denize dik olması nedeniyle, iç kısımlara kadar ulaşabilmektedir ve bu topluluk Ege bölgesi'nde yaklaşık 800- 900 m yüksekliklere kadar çıkabilmektedir. Akdeniz'de ise bu sınır 1100-1300 m lere ulaşabilmektedir.

Araştırma alanı içersinde genel olarak andezit ana kaya üzerinde bulunan bu tür ağırlıklı olarak Yamanlar Dađı'nın kuzey sırtlarında, Manisa Dađı'nın eteklerinde ve Turgutlu ile Salihlinin Kuzey yamaçlarında yoğun olarak bulunmaktadır.

*Pinus brutia* birliđi, çalışma alanında içinde bulunduğu İzmir ve çevresinde ilk kez Schwarz tarafından 1936 yıllarında tespit edilmiştir. Araştırmacı bu birliđe *Pinetum brutia aegaum* adını vermiştir. Kemalpaşa Nif Dađında çalışan Seçmen (1977) ise, kendi bölgesinde bulunan kızılçam topluluklarını Zohary (1973)' e göre yorumlayıp ***Quercetea calliprini*** sınıfının ***Quercetalia calliprini*** ordosundan ***Pinion brutiaee*** alyansında değerlendirmiştir (Gemici 1981).

Akman, Barbero ve Quézel (1979) Ege ve Akdeniz Bölgesindeki *Pinus brutia* topluluklarını üzerinde yayılış gösterdikleri substratın yapısına ve işgal ettikleri klimatolojik katlara göre yorumlamışlardır. Bu araştırmacılara göre, İzmir ve çevresinde Sıcak Akdeniz katında bulunan *Pinus brutia* toplulukları ***Quercetalia (ea) ilicis'in Quercion ilicis*** alyanslarında değerlendirilmektedir.

Gemici (1981)'nin Yamanlar Dağı'nda yaptığı çalışmaya göre, bu bölgedeki *Pinus brutia* toplulukları, en fazla **Quercetalia (ea) ilicis** karakteristiği içermesi nedeniyle bu gruba dahil etmiştir. Ayrıca Gemici alanda kızıl çamın tahrip edilmesi sonucunda **Chenopodietalia (ea) mediterranea** karakteristiklerinin alanda arttığını rapor etmiştir.

Duman (1985) Manisa (Spil) Dağı Milli Parkı'nda gerçekleştirdiği çalışmalarda bu birliğin kalker anakaya üzerinde gelişen kırmızı Akdeniz toprakları üzerinde tespit etmiştir. Ve bu topluluğu **Pinetum brutia** birliği olarak **Quercetea pubcentis** (Doingt Kraft 1955) sınıfının **Quercu cedretalia libani** (Barbéro et all. 1974) ordosuna bağlamış, alyans düzeyinde ise herhangi bir ayırma gitmemiştir.

Bekat (1992) Ödemiş Bozdağ'da gerçekleştirdiği çalışmalarda marnlı flišler üzerinde tespit ettiği **Pinetum brutia** birliğini net bir ayırma giderek **Quercetea pubcentis** (Doingt Kraft 1955) sınıfının **Quercu cedretalia libani** (Barbéro et all. 1974) ordosuna bağlamış ve **Adenocarpus Pinion** (Akman vd. 1977) alyansına dahil etmiştir.

Şık (1992) Yunt Dağı'nda bu birliği andezit anakaya ve yüzeysel derinliğe sahip kalkersiz kahverengi orman toprakları üzerinde bulmuştur. Araştırmacı, birliğin, **Quercetalia (ea) ilicis**'e yakın olduğunu söylerken alyans düzeyinde bir sınıflandırmaya gitmemiştir.

Aydın Dağlarında çalışmalar yapan Çelik (1995), gnays, şist ve neojen tortul anakayalar üzerinde gelişen kalkersiz kahverengi ve regosol topraklar üzerinde tespit ettiği birliği **Quercetea pubcentis** (Doingt Kraft 1955) sınıfı, **Quercu carpinetalia orientalis** (Quézel et all. 1980) ve **Quercu cedretalia libani** (Barbéro et all. 1974) ordolarına ait karakteristiklerden söz etmiş ancak net bir ayırım yapmamıştır.

Özel (1998) Kazdağları'nda yaptığı çalışmada, bu birli kireçsiz anakaya üzerinde gelişen kalkersiz kahverengi ve regosol topraklar üzerinde tespit etmiş **Quercion ilicis** (Br.- Bl., 1936) alyansı ile bu alyansın bağlı olduğu **Quercetalia (-etea) ilicis** (Br.- Bl. 1947) ordo ve sınıfına dahil etmiştir.

Oluk (1999) Denizli Babadağ'da yaptığı çalışmalarda ise, *Pinus brutia* da topluluklarında sıkça rastladığı *Scutellaria cariense*' yi ayırt edici tür yaprak bu birliği **Scutellario cariense** –

***Pinetum brutiae*** Oluk ass. nova (1999) olarak isimlendirmiş ***Quercetalia (-etea) ilicis*** (Br.- Bl. 1947) ordo ve sınıfına dahil olan ***Quercion ilicis*** (Br.- Bl., 1936) alyansına bağlamıştır.

Uğurlu (2005) Orta Gediz Havzası'nda yaptığı çalışmada tespit ettiği *Pinus brutia* topluluklarını yine ***Quercetalia (ea) ilicis*** ordosuna bağlamış ancak birlikte karakteristik ve ayırt edici tür olarak tespit ettiği *Linum hirsutum subsp. pseudoanatolicum* ve *Centaurium calolepis*'e dayanarak bu birliği ***Lino- Pinetum brutiae*** (Uğurlu 2005) olarak isimlendirmiştir.

Çalışma alanında tespit edilen *Pinus brutia* birliği daha çok andezit ve kısmen de kalker anakaya üzerinde gelişim gösteren kireçsiz kahverengi orman toprakları ile kahverengi orman toprakları üzerinde tespit edilmiştir. Bu çalışmada yapılan fitosoyolojik araştırmaya göre bu birliğin karakteristik türlerinin ; *Pinus brutia* ve *Linum corymbulosum* olduğu tespit edilmiş ve buna bağlı olarak bu birlik ***Lino- Pinetum brutia*** ass.nova olarak isimlendirilmiştir. Yapılan incelemelere göre bu birlikte en çok ***Quercetea (ea) ilicis*** karakteristikleri bulunurken, yine birlik için de önemli oranda; ***Quercetalia pubecentis***, ***Cisto micromeritalia (ea)*** ve ***Chenopodietalia (ea) mediterranea*** ordolarının karakteristiklerine rastlanmıştır. Sonuç olarak bu birlik ***Quercetalia (-etea) ilicis*** (Br.- Bl. 1947) ordo ve sınıfına dahil edilmiş ancak alyans düzeyinde bir ayrıma gidilmesi uygun görülmemiştir. (Tablo 11)

#### 5.2.8. Phlomo – *Quercetum macrolepis* ass. nova Birliği

Araştırma alanında yer alan *Quercus ithaburensis subsp. macrolepis* bir çok bölgede tarım arazisi açma nedeniyle tahrip edilmese de bu topluluk Batı Anadolu'da yer alan en güzel meşe topluluklarından birisidir (Akman 1985).

Palamut meşesi adıyla bilinen *Quercus ithaburensis subsp. macrolepis*, araştırma alanında özellikle Gediz Nehri'nin kuzey kısmında yer alan ve Dumanlı dağın doğu ve güney doğu sırtlarından başlayarak, Demirköprüye kadar uzanan bölgede, andezit anakaya üzerinde gelişim gösteren kireçsiz kahverengi orman toprakları, kahverengi orman toprakları ve redzina topraklar da yetişmektedir.

Akman vd. (1978); Aydın, Denizli, Salihli ve Uşak'ta vadi tabanlarında bulunan derin kolüviyal topraklar üzerinde yaşayan *Quercus ithaburensis subsp. macrolepis* ormanlarında

yaptıkları çalışmada, toplulukta tür sayısının fazla olmadığını ve var olan karakteristik türlerin de çoğunun **Quercetea pubecentis** (Dongt Kraft. 1955) ve az sayıda türün de **Quercus – Cedretalia libani** (Barbéro et all 1975) ye ait olduğunu bildirmişler ve alyans seviyesinde ise net bir ayrımın zorluğunu ifade etmişlerdir.

Şık (1992) Yunt Dağı'nda yaptığı çalışmada andezit anakaya ve kireçsiz kahverengi topraklar üzerinde maki formasyonları, içerisinde tespit ettiği palamut meşesi birliğini, **Quercetalia (-etea)** (Br.- Bl. 1942) ordo ve sınıfına dahil etmiş, ancak alyans düzeyinde herhangi bir yorumda bulunmamıştır.

Çelik (1996) Aydın Dağlarında yaptığı çalışmada, derin kolüviyal topraklar üzerinde bulunan *Quercus ithaburensis subsp. macrolepis* birliğini, **Quercus – Fagea** üst sınıfı ile **Quercetea pubescentis** sınıfına yakın olduğunu bildirmiş ve ordo düzeyinde ise **Quercus – Cedretalia libani** 'ye dahil etmiştir.

Oluk (1999) Baba Dağı'nda yaptığı araştırmaya göre, bu birlikte çok fazla sayıda anlamlı tür bulamamış ve birliğin **Quercetea pubecentis** ve **Quercus- Cedretalia libani** ordosuna yakın olduğunu söylemiş ve birliğin karakteristik ve ayırt edici türü olarak palamut meşesinin yanında *Ferulago communis*'i de göstererek birliği **Ferulago communis – Quercetum macrolepidis** ass.nova olarak isimlendirmiştir.

Uğurlu (2005) Orta Gediz Havzası'nda yaptığı çalışmada *Quercus ithaburensis subsp. macrolepis* ve *Quercus infectoria* 'dan oluşan birliğin metamorfik (özellikle gnays) veya püskürük kayalardan meydana gelen dağ kütlelerinde veya sedimanların üzerinde belirdiğini bildirirken birlik karakteristiklerinin; *Q. Íthaburensis subsp.macrolepis*, *Q. cerris*, *Q. pubescens* ve *Q.trojana* olduğunu belirtmiştir. Uğurlu, bu birliğin bitki sosyolojisi bakımından yorumlanmasının zor olduğunu belirterek, birlik içerisinde anlamlı türün az olduğunu, **Quercetea pubecentis** ve **Quercetea ilicis** karakteristiklerinin bulunduğunu söylemiştir. Ancak alyans düzeyinde bir sınıflandırma yapmamıştır.

Çalışma alanında ise, bu birliğin karakteristik türleri; *Quercus ithaburensis subsp.macrolepis*, *Quercus infectoria*, *Quercus trojana*, *Campanula lyrata*, *Phlomis grandiflora* ve *Stachys cretica subsp. symrnae* olarak tespit edilmiş Salihli Kırdamları'nda alınan 106 numaralı örnek alana göre bu birlik adı **Phlomo – Quercetum macrolepi** ass.nova olarak



belirlenmiştir. Birlikte en fazla **Quercetalia ilicis (ea)** ordosuna ait karakteristikler bulunurken azımsanmayacak sayıda **Quercetea pubecentis**, **Chenopodietalia (ea) mediterranea** ve **Cisto-Micromerietalia** karakteristikleri de bulunmuştur. Tüm bu verilerin ışığında birlikte bulunan anlamlı tür az olduğu içinde fitososyolojik olarak alyans düzeyinde bir ayırım yapılamamıştır. (Tablo 12)

Sonuç olarak, Aşağı Gediz Havzası'nın vejetasyonunun genel bir değerlendirmesini yapacak olursak, gözümüze ilk olarak tatlı su birikinlerinde ve özellikle Gölarmara da bulunan **Ceretophylletum demersi** (Hild 1947) çarpmaktadır. Bu birliğin ardından tatlı su, tuzlu su kenarlarında, nehir boyunca, Gölarmara ve Gediz Deltası'nda yoğunlaşan su içerisinde, kıyısında veya bataklıklarda yer alan **Phragmitetum communis** (Schmale 1939) birliğı gelmektedir. Çalı vejetasyonuna geçtiğimizde ise, makinin tahribatı ile ortaya çıkan **Asphodelo – Sarcopoterietum spinosii** ass.nova birliğı ve bunun üzerinde ise klimaksı oluşturan ormanların tahrip edilmesi ile ortaya çıkan **Paliuro – Quercetum cocciferae** (Çetin 2003) birliğı gelmektedir. Tuzlu toprakta görülen ve çalışma alanında özellikle Gediz Deltası'nda karşımıza çıkan birlikler ise, **Arthrocnemo – Halocnemetum strobilacei** (Oberd 1957) ve **Tamaricetum symrnensi** (Seçmen&Leblebici 1994)'dir. En üst vejetasyon katını oluşturan ağaç toplulukları da iki gruba ayrılmıştır. Bunlar ağırlıklı olarak eğimli arazide ve sığ topraklarda yer alan **Lino-Pinetum brutiae** ass.nova ile daha az eğimli ve düz arazilerde bulunan derin kolüviyal topraklarda yaşamlarını sürdüren **Phlomo- Quercetum macrolepi** ass. nova birlikleridir.

## 6.ÖNERİLER

Aşağı Gediz Havzası yüzyıllardan beri bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu alanda bulunan çok sayıdaki antik şehirler de yaşayan insanlar yaklaşık 3000 yıldan beri alanın doğal yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bugün ise Aşağı Gediz Havzası'nda bulunan Akhisar, Salihli, Manisa ve Menemen ovaları, ülkemiz tarım alanları içinde önemli bir yere sahip olması nedeniyle, bu alanda yaşayan insan nüfusunu artmaktadır. Bu artışta doğal olarak alanı olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda alanda yaptığımız çalışmaya göre tespit ettiğimiz olumsuzluklar şunlardır.

1. Özellikle Manisa ve Menemen'de bitki yetişmesine uygun derin toprakların bulunduğu alanlara konut ve sanayi tesislerinin kurulması
2. Aşağı Gediz Havzası'nda biyolojik çeşitliğin en yüksek olduğu Gediz Deltası'nın korunamaması ve çeşitli şekillerde (doldurma, yapılaşma gibi.) tahrip edilmesi.
3. Salihli, Turgutlu, Gölmarmara çevresinde bulunan eğimli arazilerin doğal örtüsü yok edilerek tarım alanlarının açılması
4. Gediz Nehri'ne atık suların bırakılması nedeniyle, Gediz Nehri ve çevresinin kirlenmesi
5. Tarım alanlarında yüksek oranda pestisit kullanımı
6. Kuru tarım alanlarında görülen anız yakma ve sonuçları
7. Havzada yer alan koruluklarda kaçak ağaç (özellikle meşe türleri) kesimi
8. Tarım arazilerinin erozyonu arttıracak şekilde işlenmesi

Tespit edilen bu olumsuzluklar nedeniyle Aşağı Gediz Havzası'nın bir yandan doğal bitki örtüsü tahrip edilirken öte yandan mevcut tarım arazileri de zarar görmektedir. Tarım arazilerinin verimi düştükçe doğal alanlar tahrip edilerek yeni tarım alanları açılmaktadır. Bu nedenle havzada yer alan doğal bitki örtüsünü koruyabilmek için tarım arazilerinin korunması ve ıslah edilmesi gerekmektedir.

İkinci önemli nokta da Gediz Nehri'nde gözlenen kirliliktir. Yapılan kimyasal analizlere göre nehir suyunda beklenenden onlarca kat fazla ağır metal ve tarım alanlarında kullanılan kimyasal madde ve ilaçların atıkları bulunmaktadır. Bu nedenle de yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlara göre bugün Gediz Nehri'nin suyunun tarımsal amaçlı sulama suyu olarak bile kullanılması insan sağlığı açısından zararlıdır (Manisa Çevre İl Müdürlüğü Raporu 2002). Bu durumda acil olarak Gediz Nehri'nde görülen kirliliğin azaltılması gerekmektedir.

Son yıllarda havzada yer alan tarım arazileri üzerinde hızla artan bir yapılaşma görülmektedir. Bu alanlarda özellikle konut ve ikinci derecede sanayi kooperatifleri kurulmaktadır. Bu yapılaşma da mevcut tarım alanlarının yok edilmesi nedeniyle insanları doğal ortamları tahrip ederek yeni tarım arazileri açmaya zorlamaktadır. Bu nedenle bu tip konut ve sanayi kooperatiflerinin, bereketli düz alanlar yerine, doğal özelliklerini kaybetmiş atıl alanlara kurulması hem tarım arazilerini hem de doğal vejetasyonun korunmasını sağlayacaktır.

Araştırma alanında göze çarpan bir husus da zeytinliklerin çoğaltılmasıdır. Havzada yer alan ovalarda yakın zamana kadar yaygın olan tütün tarımı bugün geçerli tarım politikaları nedeniyle yerini zeytinciliğe bırakmıştır. Bu nedenle de mevcut kuru tarım alanları hızla zeytinliklere dönüştürülmekte ve bu bağlamda tarla kenarlarında bulunan eğimli arazilerin doğal örtüsü kaldırılarak onların da zeytinliklere dönüştürülmesi söz konusudur. Bu konu için de acilen gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.

Özellikle havzanın kenarlarında bulunan eğimli arazide ciddi bir erozyon görülmektedir. Ancak bu konu hakkında kayda değer bir çalışma yapılmamaktadır. Bunun için eğimli arazilerde erozyon mücadelesi yapılması gerekmektedir.

Son olarak, Aşağı Gediz Havzası'nın en fazla antropojenik etkilere maruz kalan kısmı Gediz Deltası'dır. Bu alan uluslar arası öneme sahip bir sulak alan olup RAMSAR Sözleşmesi kriterlerine göre koruması gerekmektedir. Delta sahip olduğu hem tuzcul bitki birlikleri ve hem de bu bölgede yaşayan kuş türleri bakımından dünya çapında bir öneme sahiptir. Bu alanda ülkemizde mevcut olan yaklaşık 350 kuş türünün 210'u görülebilmektedir. Tüm bu özelliklerine rağmen Gediz Deltası yapılaşma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bugüne kadar deltanın Karşıyaka – Bostanlı kısmında kalan güney kısmı önemli derecede doldurulmuştur. Bu bölgenin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin devamının sağlanabilmesi için acil olarak korunması gerekmektedir.

**KAYNAKÇA**

**AK, B.**, 1992 Kuş Cenneti Kuzeydoğusunun Genel Jeolojisi. D.E.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Lisans Tezi. İzmir. 1992

**Altan Y., Uğurlu E., Sevinç Ö.S.** 1999 Akçakertik Florası Manisa (Demirci) 1. International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehlami Karaçam 23-25 September , Kütahya, 1999

**Akman Y., Barbero M, Quézel P.**, 1978, en Contribution a de la Vegetation Forestiere d'Anatolia Mediterranee, Phytocoenologia 5 (1) 1-79, 1018, 1978

**Akman Y, Barbero M, Quézel P.** 1979, Contribution a L'etude de la vegetation forestiere d'Anatolia Mediterranee, Phytocoenologia 5 (3), 227-346, 1979

**Akman Y.**, 1982 Climats et Bioclimats Mediterranees En Turquie Ecologia Mediterranean 8 ½, sf,73-87, 1982

**Akman Y., Ketenoğlu O.**, 1992 Vejetasyon Ekolojisi ve Araştırma Metodları, A.Ü. Fen Fak. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 9 Ankara, 1992

**Akman Y.**,1993, Biyocoğrafya, Palme Yayınları Ankara 1993

**Akman Y.**,1995 Türkiye Orman Vejetasyonu, Ank. Üniv. Fen Fak. Botanik Anabilim Dalı kitapları, 1995

**Aksoy A.**, 1992 Mahmut Dağı Flora ve Vejetasyonu (Yüksek lisans tezi) E.Ü. Fen.Bil.Ens. Biyoloji Ana bilim dalı İzmir, 1992

**Atalay İ.**, 1987 Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. E.Ü. Edebiyat Fak. Yayın No: 9 İzmir, 1987

**Atalay İ.**, 1982 Toprak Coğrafyası E.Ü. Sosyal Bilimler Fak. Yayın No: 8 İzmir, 1982

**Atalay İ.**, 1983, Türkiye Vejetasyon Coğrafyasına Giriş, Ticaret Matbaacılık, İzmir 1983

**Barbero M, Bomn G., Quézel P.**, 1975, Le pelouses echorchees des montagnes Circium – Mediterranennes, Phytocoenologia 1(4), p. 427-459, Stuttgart- Lehre., 1975

**Barkman J.J., Movarec J., Raushert S.**, 1986, Code de Nomenclature Phytosociologique. Vegetatio, 67 : 174-195., 1986

**Baytop A ve Dökmeci C.**, 1978 A Contrubution To The Flora of Sultan Dağları, İst. Ecz. Fak.Mec. 13, sf: 62-97, 1978

**Behçet L.**, 1994, Van Gölü makrofitik vejetasyonunun fitososyolojik yönden araştırılması, Doğa Tr, J.of Botany Sayı:18, sf 229-312, 1994

**Bekat L.**, 1980 Karaburun Akdağ Çevresinin Flora ve Vejetasyonu, Yüksek Lisans Tezi E.Ü.Fen Fak.Botanik Bahçesi İzmir. ,1980

**Bekat L.**, 1990, Barla Dağı (Isparta) Flora ve Vejetasyonu, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü İzmir , 1990

**Bekat L.**, 1990, Bozdağ (Ödemiş) Vejetasyonu, X Ulusal Biyoloji kongresi Bildiriler Kitabı Cilt II, sf 257-270, Erzurum, 1990

**Boissier E.**, 1884 -1897 Flora Orientalis, Vol: IV-V, Basel, Genova, Lyon

**Braun – Blanquet J.**, 1932, Plant Sociology, ( Trans. Fuller.G.D. and Conard S.H., 1965) Hafner Publication, N.Y. London , 1932

**Buğday H.**, 1999, Menemen Ovası ve Yakın Çevresinin İklimi ve Arazi kullanımı, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Lisans Tezi, Bornova, 1999

**Chaput E& Hakkı İ.**, 1930 Recherches sur la structure geologique de la region de Smyrne. Publ. Ins. Georgia Univ. İstanbul No. 1, 1930

**Cirik S., Cirik S.**, 1999 Su Bitkileri (Deniz Bitkilerinin Biyolojisi, Ekolojisi, Yetiştirme Teknikleri), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 58, Bornova, 1999

**Cirik S., Cirik S., Conk-Dalay M.**, 2001 Su Bitkileri II, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 61, Bornova, 2001

**Çelik A.**, 1992 Karıncalı Dağı (Aydın) Flora ve vejetasyonu , E.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Bornova İzmir. 1992

**Çelik A.**, 1995 Aydın Dağlarının Flora ve vejetasyonu , E.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Doktora Tezi, Bornova İzmir. 1995

**Çetin E.**, 2003, Boncuk Dağları (Burdur) Flra ve Vejetasyonu, E.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Doktora Tezi, Bornova İzmir. 2003

**Çırpıcı A.**, 1979 New Floristic Records From Westren Anatolia (B2) İst.Üni. Fen Fak. Mec. 13,43 sf: 179-195, 1979

**Çukur H.**, 1992 Orta Gediz Havzasının Fiziki Coğrafyası, Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bilimler Ens. Coğrafya Öğretimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1992

**Davis, P.H.** 1965 Flora of Turkey and East Aegean Islands. Vol.1-10 Edinburg. 1988.

**Davis P.H.**, 1953 Notes on Summer Flora of The Aegean, Notes Roy. Bot. Garden Edinburgh 21(3) : 101-142, 1953

**Dikiciođlu N.G.**, 2005, Dumanlı Dađ (Menemen –İzmir) Florası, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Manisa 2005

**Duman H.**, 1985, Manisa Dađı (Spil) Milli Parkı'nın Flora ve Vejetasyonu üzerine bir alıřma. Gazi Üniversitesi Fen. Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi., 1985

**Durmuşkahya C.**, 1996 Seferihisar Teos (İzmir) Florası, Ege Üni. Biyoloji Bölümü Bitirme Tezi. 1996

**Durmuşkahya C.**, 2000 Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Biyoeřitliliđi Üzerine İncelemeler. , Ege Üni. Fen Bil. Ens.Biyoloji Bölümü Yüksek LisansTezi. 2000

**Efe R.**, 1996, Yuntdađ ve evresinde Dođal Bitki Örtüsünün Ekolojik Őartları, Türk Cođrafya Dergisi 1996, sayı 31, sf 55-77. 1996

**Efe R.**, 1998, Yukarı Gediz Havzasında İklimin Dođal Bitki Örtüsü Dađılıřına Etkisi, Türk Cođrafya Dergisi 1998, sayı 33, sf 79-100, 1998

**Ege Havzası Toprakları**, 1979, Toprak Su Genel Müdürlüđü Yayınları Raporlar Serisi No: 90, 1979

**Ekim T. V.d.**, 2000, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneđi, Ankara. 2000

**Emberger L.**, 1952, Sur le Quotient Pluviothermique, CR., Academy Sc. 234; 2508-2510.,1952

**Emberger L.**, 1955, Une Classification Des Climats Rec. Tav.Lab.Bot.Fac.Sc. Montpellier., 1955

**Eriñ S.** 1957, Tatbiki Klimatoloji ve Türkiye'nin İklimi Şartları. İstanbul Teknik Üniv. Hdrojeoloji Ens. Yayınları: 2, İstanbul. 1957

**Eriñ S.**, 1955 Gediz ve Büyük Menderes Deltalarının Morfolojisi. Dokuzuncu Coğrafya Meslek Haftası Tebliğler ve Konferanslar. Türk Coğrafya Kur. Yay. No: 2 33-66, İstanbul. 1955

**Gausson H.**, 1954, Theorie at Classification Biogeographique des Climats. Rec., Trav., Bot. Fac. Sc. Montpellier. 1954

**Gediz Ovası Toprakları**, 1971, Toprak Su Genel Müdürlüğü Yayınları Raporlar Serisi No: 8. 1971

**Gediz Havzası Toprakları**, 1974, Toprak Su Genel Müdürlüğü Yayınları Raporlar Serisi No: 84, 1974

**Gehu J.M, Uslu T., Costa M**, 1989, Aport a la connaissance phytosociologique du littoral sud de la Turquie Meditteraneenne, Colloques phytosociologiques XIX Cagliari, p 591-622, 1989

**Gemici Y.**, 1981 Yamanlar Dağı (İzmir) ve Çevresinin Flora ve Vejetasyonu E:Ü.Fen Fak. Biyoloji Bölümü İzmir. 1981

**Gemici Y.**, 1986, Çivril (Denizli) Sandıklı ve Dinar (Afyon) İlçeleri arasındaki Akdağ ve çevresinin flora ve vejetasyonu Doktora Tezi, Bornova İzmir. 1986

**Gemici Y.**, 1988 Batı Anadolu'da Bitki Örtüsünün Tahribi ve Doğurduğu Problemler, Çevre 88 Dördüncü Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi 5-9 Haziran 1988 İzmir. 1988



**Gemici Y.**, 1988 İzmir Çevresi'nin Florası, IX biyoloji Kongresi 21-23 Eylül 1988 Sivas. 1988

**Gemici Y, Seçmen Ö, Yılmaz Ç.**, 1990 Batı Anadolu Orman ve Maki Vegetasyonunun Ekolojik ve Sosyolojik Özellikleri , X. Biyoloji Kongresi 18-20 Temmuz 1990 Erzurum. 1990

**Gemici Y.**, 1992, Bolkar Dağları'nın (Orta Toroslar) Flora ve Vegetasyonu, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, İzmir. 1992

**Gemici Y.**, 1993, Tersiyer'den Günümüze Türkiye'nin Flora ve Vegetasyonu, Tübitak, Doğa –Tr, J. Of Botany, 17p.221-226, Ankara. 1993

**Gemici Y., İnandık H.**, 2005, Bitki Coğrafyası (Jeobotanik) Ders Notları, İzmir 2005

**Golub. V., Togliatti B., Losev G.A., Astrakhan and Mirkin B.M.**, 1991, Aquatic and Hydrophytic vegetation of the Lower Volga Valley, Phytocoenologia 20(1): 1-63, 1991

**Görk G.**, 1982 Eğrigöz Dağı Flora ve Vegetasyonu Ege. Üni.Fen Bil. Ens. Doktora Tezi İzmir. 1982

**Gücel S.**, 1999 Gürle (Manisa) Köyü Florası . Celal Bayar Üniv. Fen Bil.Ens.Yüksek Lisans Tezi . 1999

**Günel N.**, 1986 Gediz- Büyük Menderes Arasındaki Sahanın Bitki Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul,1986

**Günel N.**, 1996 Manisa, Akhisar, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir Ovaları ile Yakın Çevrelerinde Yıllık ve Aylık Yağış Değişimleri, Türk Coğrafya Dergisi 1996, sayı 31, sf 39-54. 1996

**Günel N.**, 1997, Türkiye'de Başlıca Ağaç Türlerinin Coğrafi Yayılışları, Ekolojik ve Floristik Özellikleri. 1997

**Günel N.**, 2003, Yukarı Gediz Havzası'nın Bitki Coğrafyası, Çantay Kitabevi İstanbul. 2003

**Güner A., Özhatay N., Ekim T., Başer K.H.C.**, 2000, Flora of Turkey and East Aegean Islands, 11 (Suppl.2) Edinburgh. 2000

**Güner H.**, 1985, Hidrobotanik, E. Ü. Fen Fak. Kitap Serisi No 91. 1985

**Güvensen A.**, 1992, Ege Bölgesi Kıyı Ekosistemlerinde Yer Alan Halofitlerin ve Psammofitlerin Genel Özellikleri ve Bu Ekosistemler Üzerinde Çevresel Baskılar. Ege Üni. Fen. Bil.Ens. Biyoloji Bölümü Yüksek Lisans Tezi. 1992

**İlhan H.**, 1992, Turgutlu Çevresinde Fiziki Coğrafya Araştırmaları, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Lisans Tezi, Bornova. 1992

**KAYA, O.**, 1979. Orta Doğu Ege Çöküntüsünün Neojen Stratigrafisi ve Teltoniği, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni Ankara. 1979

**Kayacık H.**, 1981 Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği, İst. Ü. Orman Fak. Yayın No: 2766/287, İstanbul. 1981

**Keyikçi N.**, 1992, İzmir Kuş Cenneti'nin Florası, Ege Ün. Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Tezi, Bornova, 1992

**Kılınç M.**, 2005, Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilimi), Palme Yayıncılık, Ankara 2005

**Küçükköçük M, Ketenoğlu O.**, 1996, Beyşehir Gölü'nün Makrofitik Vejetasyonu, Doğa Tr, Journal of Botany, Sayı 20, sf 189-198. 1996

**Koçman A.**, 1989, Uygulamalı Fiziki Coğrafya Çalışmaları ve İzmir-Bozdağlar Yöresi Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 49, Bornova 1989

**Koçman A.**, 1993, İnsan Faaliyetleri ve Çevre Üzerine Etkileri Açısından Ege Ovalarının İklimi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 73, Bornova 1993

**Leblebici E.**, 1987, Kuş Cenneti Milli Parkı Vejetasyon ve Florası, 2. Kuş Cenneti ve Kuş Gölü Sempozyumu Bildirileri kitabı sf 181-190. 1987

**Lovric A.Z., Uslu T.**, 1985, Dry Costal Ecosystems of Turkey, Manuscript completed November 1985

**Manisa Çevre İl Müdürlüğü**, 2002 Gediz Havzası Raporu. 2002

**Manisa İli 2004 yılı Tarım Raporu**, 2004, Manisa Tarım İl Müdürlüğü Raporu 2004

**Maden Teknik Arama Müdürlüğü**, 1964 Jeoloji Haritası İzmir a,b Paftası

**Odum E.P.**, 1959, Fundamentals of Ecology . W.B. Saunders Co., Philadelphia & London 574p. 1959

**Odum E.P.**, 1993, Ecology and Our Endangered Life-Support Systems, Second Edition, Sinauer Associates, USA, 1993

**Oluk S.**, 1994, Çal-Çatma Dağları ve Çevresinin Florası E.Ü.Fen Bil. Ens. Biyoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi İzmir. 1994

**Öner M.**, 1975, Bitki Süksesyonu. Ege Üniv. Fen Fak. Yay. No: 66 :14-22. 1975

**Öner M, Oflas S.& Oğuz G.**, 1973 izmir Civarında Bulunan Karagöl , Çamaltı, Bayraklı, Kalabak, Eğri Limanı, Belevi Gerisindeki Göl Mevkii, Pamucak ve Tusan Oteli Civarında Vejetasyon Gelişimi , Ege Üni. Fen.İlmi. Rap. 160:1-20. 1973

**Özçengel Ş.**, 2001 Manisa (Spil) Dağı Monokotil Bitkileri Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümü Manisa. 2001

**Özel N.**, 1998, Kaz Dağları Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik ve Fitoekolojik Araştırmalar, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Doktora Tezi, İzmir 1998

**Öztürk M, Durmuşkahya C.**, 2002., Yüksek Su Bitkileri Ders ve Uygulama Notları, Celal Bayar Üniversitesi. Fen.Ed. Fak. Biyoloji Bölümü Teksiri, Manisa 2002

**Öztürk M, Seçmen Ö.**, 1996, Bitki Ekolojisi (II. Baskı), Ege Ünivrsitesi Fen Fakültesi Yayınları No: 141 Bornova, İzmir. 1996

**Öztürk M, Seçmen Ö, Gemici Y, Görk G** 1990, Aegean Region Turkey Plants and Landscape. 1990

**Seçmen Ö.**, 1977 Nif Dağı'nın Vejetasyonu ve Florası Üzerine Bir İnceleme Doçentlik Tezi E.Ü. Fen Fak. Bornova , İzmir. 1977

**Seçmen Ö., Leblebici E.**, 1996 Marmara Bölgesi Sulak Alanların Bitki örtüsü, Journal of Botany,Sayı 20, sf 171-187. 1996

**Seçmen Ö., Leblebici E.**, 1991, Trakya'nın sucul ve bataklık bitki örtüsü, Doğa Tr. J. Of Botany, sayı 15, sf 142-165. 1991

**Seçmen Ö., Gemici Y., Bekat L., Görk G.**, 1986 İzmir Yöresi frigana Vejetasyonun Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması, Doğa Bilim Dergisi, Biyoloji D.C. 10 sayı 2 sf. 197-205. 1986

**Seçmen L.**, 2000, *Vejetasyon Bilgisi Ders Notları*, (III. Baskı), Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Tezsizler Serisi No: 103, Bornova 2000.

**Sezer L.**, 1987, *Manisa- Yamanlar Dağı ve Çevresinin Fiziki Coğrafyası*, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Fiziki Coğrafya Anabilimdalı Yüksek Lisans Tezi, Bornova 1987

**Sulak Alanların Yönetimi Projesi Gediz Deltası Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi**, 1999, T.C. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Final Raporu Proje No: 97K100020 (2 Cilt), Bornova. 1999

**Şenol G.S.**, 1996 *Seferihisar Teos (İzmir) Kıyı Kumul Florası* . Ege Üni. Biyoloji Bölümü Bitirme Tezi. 1996

**Şık L.**, 1992, *Yunt Dağı (Manisa) Flora ve Vejetasyonu*, Ege Üniv. Fen Bilimleri Ens. Biyoloji Anabilimdalı Yüksek Lisans Tezi Kod. 10.0600.0000.014. 1992

**Şık L.**, 1993 *La Flore De Yunt Dağı (Manisa)* Journal of Faculty of Sience Ege Univ. Series B, Vol.15,1 İzmir. 1993

**Schwarz O.**, 1935, *Die Vegetation Verhaltiesse West Anatolians*, Engler Bot. Jahrb., 67 : 297-436. 1935

**T.C. Çevre Bakanlığı**, 1999, *Gediz Havzası Kirlilik Raporu*. 1999

**Temuçin E.**, 1991, *Manisa-Akhisar ovalarında iklim ve ortam ilişkileri*, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Coğrafya Anabilimdalı Doktora Tezi, Bornova. 1991

**Türkiye'nin Sulak Alanları**, 1993 Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara, 1993

**Uğurlu E., Altan Y.**, 1997 Celal Bayar Üniversitesi (Manisa) Kampüs Alanı Florası CBÜ.Fen Edebiyat Dergisi 1: 34-42. 1997

**Uğurlu E.**, 2005, Orta Gediz Havzası'nın (Manisa) Flora ve Vejetasyonu, Ege.Üniv. Fen. Bilimleri Ens. Biyoloji Anabilimdalı Doktora Tezi Kod. 401.03.00. 2005

**Uslu T.**, 1981, Aydın'ın Batısında Küçük ve Büyük Menderes Nehirleri Arasında Kalan Bölge Vejetasyonunun Bitki Ekolojisi ve Sosyolojisi Yönünden Araştırılması, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Doçentlik Tezi 197 sf, Ankara. 1981

**Walter H.**, 1962, Anadolu'nun Vejetasyon Yapısı. Çeviren Uslu S., İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 944 İstanbul. 1962

**Yağmurlu F.**, 1980 Bornova (İzmir) Güneyi Fliş Topluluklarının Jeolojisi. TJK Bülteni 23(2): 141-151. 1980

**Yıldız Ş.**, 2002 Karakoca Köyü (Manisa) Florası, Celal Bayar Üniv. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü Bitirme Tezi. Manisa. 2002

**Yüce I.**, 1984, Manisa ve Çevresinin İklimi, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Lisans Tezi, Bornova. 1984

**Zohary M.**, 1973, Geobotanical Foundation of Middle East Vol. I-II, Gustav Fischer Verlag. Stuttgart. 1973

**Ek : Arařtırma Alanına Ait Genel Fotoğraflar**



**Fotoğraf 1:** Gediz boyundan genel bir görünüş



**Fotoğraf 2:** Ahmetli Regülatöründen Genel bir görünüş



**Fotoğraf 3:** İzmir Çamaltı Kuşçenneti'nden genel bir görünüş



**Fotoğraf 4 :** Çamaltı'nda tuz tavalarından genel bir görünüş





**Fotoğraf 5:** Turgutlu'da görülen birikinti konileri




**Fotoğraf 6:** Göl marmara'dan bir görünüş

**ÖZGEÇMİŞ**

Ad-Soyad : Cenk DURMUŞKAHYA  
Doğum Tarihi :1975  
Doğum Yeri :İzmir  
Medeni Durumu :Bekar  
Uyruđu :Türk  
Eđitim Durumu  
İlköđretim :Karşıyaka Aydođdu İlkokulu  
Ortaöđretim :Karşıyaka Ortaokulu  
Lise :Karşıyaka Gazi Lisesi  
Lisans :Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü  
Yüksek lisans :Ege Üniversitesi Fen Bil.Ens. Biyoloji Bölümü Botanik ABD  
Yabancı Dil :İngilizce-İtalyanca  
Görev Yaptığı Kuruluşlar :1997-1998 T.C. Orman Bakanlığı Milli Parklar Av-Yaban Hayatı  
Koruma Genel Müdürlüğü Aydın- Biyolog  
2001- Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji  
Bölümü Arş.Gör.


### Aşağı Gediz Havzası Jeoloji Haritası




(MTA 1/500.000 ölçekli İzmir a,b paftalarından düzenlenerek alınmıştır. )

Harita 4 : Jeoloji Haritası

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>M</b> Kahverengi orman          | <b>L</b> Regosol              |
| <b>C</b> Kestanerengi              | <b>K</b> Kolüviyal            |
| <b>T</b> Kırmızı Akdeniz           | <b>A</b> Alüviyal             |
| <b>U</b> Kireçsiz Kahverengi       | <b>Ç</b> Tuzlu - Alkali       |
| <b>R</b> Redzina                   | <b>S</b> Su                   |
| <b>N</b> Kireçsiz Kahverengi Orman | <b>M</b> Moloz-Çıplak kayalar |



Harita 5 : Toprak Haritası



Harita 6: Aşağı Gediz Havzası Bitki Örtü